



醫自軒岐道興。而靈素以下。代有名人著述。盧扁以後。亦仲景著傷寒。直啟靈蘭秘洩。玉版之文。若河間東垣丹溪。亦迥出凡流。與仲景並稱四大家。傷寒證雜證之治療備矣。世咸寶之。但仲景之書。辭義左奧。雖經諸名家疏注。亦未能盡晰其理。近代以來。薛立齋張景岳喻嘉言等。皆存之云。靈素或作或述。其餘諸證。比有發明。迨慈谿柯韻伯。注傷寒曰來菴四卷。並疏著附翼二卷。能獨闢生面。而為兩世之宗也。予軒岐之學。於傷寒者。時刻夢之。今閱約伯之注。而疏透徹詳明。

而為精而不亂。予深得其味。今評批十餘條。以備
閱者玩。時丙戌仲秋日。吳景葉桂題記。

凡註批并記於右

桂枝湯下第七條批

痘濕暑症第二條批

痘濕暑症木陽病批

桂枝附子湯批

真武湯症批

吳茱萸湯証批

吳茱萸湯方批

厥陽脉症批

烏梅丸症批

白頭翁症批

諸寒熱症批

餘條并附翼血子鈔筆評論也又記

附翼總目

上冊共三十捌方

太陽方總論

桂枝湯

麻黃湯

葛根

大青龍湯

小青龍湯

五苓散

十棗湯

麻黃甘膏湯

麻翹赤豆湯

文蛤湯

桂枝麻黃湯

桂麻合半湯

桂枝二越湯

桂枝加附湯

芍藥甘附湯

桂枝甘草湯

桂枝大東湯

桂枝人參湯

去桂茯苓湯

桂枝去芍湯

桂枝杏仁湯

桂枝加芍湯

桂枝甘草湯

桂枝加桂湯

桂芍龍骨湯

桂枝龍骨湯

附子去桂湯

甘草附子湯

大陷胸湯

小陷胸湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半烏瀉心湯

附子瀉心湯

旋覆代赭湯

甘姜苓參湯

赤石脂湯

抵當湯丸

下冊共四十三方

陽明總論

梔子湯

瓜蒂湯

甘草乾姜湯

白虎參湯

竹茹石膏湯

茵陳蒿湯

大承氣湯

蜜煎豬胆汁

少陽方總論

小柴胡湯論

大柴胡湯

柴桂乾姜湯

柴胡桂枝湯

柴胡牡蠣湯

黃連黃芩湯

太陰方總論

理中丸

四逆湯

枳姜半夏湯

三物白散

麻仁湯

少陰方總論

麻黃細辛湯

附子湯

真武湯

白通湯

通脈四逆湯

茯苓四逆湯

吳茱萸湯

黃連阿膠湯

猪苓湯

四逆散

猪膚湯

甘草若酒湯

厥陰方總論

烏梅丸

當歸四逆湯

小建中湯

茯苓甘草湯

炙甘草湯

燒裊散

六經方餘論

麻黃升麻湯

牡蠣澤瀉散

傷寒附翼卷之上

慈谿 柯琴 韻伯編

崑山 馬中驊 北較

太陽方總論

太陽主表。故立方以發表爲主。而發表中更兼治裏。故種種不同。麻黃湯於發表中降氣。桂枝湯於發表中滋陰。乾葛湯於發表中生津。大青龍湯與麻杏甘膏湯。麻翹赤豆湯。於發表中清火。小青龍湯與五苓散。於發表中利水。清火中復有輕重。利水中各有淺深也。若白虎

之清火。十棗之利水。又解表後之證治。其陷胸瀉心抵
當調胃四逆真武等劑。又隨症救逆之法矣。大抵太陽
之表。不離桂枝麻黃二湯加減。以心爲太陽之裏也。今
將諸方詳論。表章仲景治法。令後人放胆用之。則麻黃
湯治傷寒而不治中風。桂枝湯治中風而不治傷寒等
說。其可少息乎。

〇〇桂枝湯

枝桂

藥芍

草甘

姜生

棗大

此爲仲景羣方之魁。乃滋陰和陽。調和營衛。解肌發汗之總方也。凡頭痛發熱。惡風惡寒。其脈浮而弱。汗自出者。不拘何經。不論中風傷寒。雜病。咸得用此發汗。若妄汗妄下。而表不解者。仍當用此解肌。如所言頭痛發熱。惡寒惡風。鼻鳴乾嘔等病。但見一症。卽是不必悉具。惟以脈弱自汗爲主耳。桂枝赤色通心。溫經能扶陽散寒。甘能益氣生血。辛能解散外邪。內輔君主。發心液而爲汗。故麻黃乾葛青龍輩。凡發汗禦寒者。咸用之。惟桂枝湯不可用麻黃。麻黃湯不可無桂枝也。本方皆辛甘發

散。惟芍藥微苦微寒。能益陰斂血。內和營氣。先輩之無汗不得用桂枝湯者。以芍藥能止汗也。芍藥之功。本在止煩。煩止汗亦止。故反煩更煩。與心悸而煩者。咸賴之。若倍加芍藥。卽建中之劑。非復發汗之劑矣。是方也用桂枝發汗。卽用芍藥止汗。生姜之辛。佐桂以解肌。大棗之甘。佐芍以和裏。桂芍之相須。姜棗之相得。陰陽表裏並行而不悖。是剛柔相濟以爲和也。甘草甘平。有安內攘外之功。用以調和氣血者。卽以調和表裏。且以調和諸藥矣。而精義尤在啜稀熱粥以助藥力。蓋穀氣內充。外邪勿復入。熱粥以繼藥之後。則餘邪勿復留。複方之

麥用又如此。故用之發汗。則不至於亡陽。用之止汗。自不至於貽患。今人凡遇發熱。不論虛實。悉忌穀味。刊桂枝方者。俱削此法。是豈知仲景之心法乎。要知此方專治表虛。但能解肌。以發營中之汗。不能開皮毛之竅。以出衛分之邪。故汗不出者。是麻黃症。脈浮緊者。是麻黃脈。卽不得與桂枝湯矣。然初起無汗。當用麻黃發汗。如汗後復煩。卽脈浮數者。不得再與麻黃。而更用桂枝。如汗後不解。與下後脈仍浮。氣上冲。或下利止而身痛不休者。皆當用此解外。蓋此時表雖不解。腠理已疎。邪不在皮毛而在肌肉。故脈證雖同麻黃。而主治當屬桂枝。

也。粗工妄謂桂枝湯專治中風一證。卽定後人耳目而
所稱中風者。又與此方不合。故置之不用。愚常以此湯
石自汗盜汗。虛癱虛痢。隨手而愈。因知仲景方可遍治
百病。與後人分門證類。使無下手處者。可同年而語耶。

麻黃湯

麻黃

桂枝

杏仁

甘草

治風寒在表。頭痛項強。發熱。身痛腰痛。骨節煩疼。惡風。惡寒。無汗。胸滿而喘。其脉浮緊。浮數者。此爲開表逐邪。發汗之峻劑也。古人用藥用法象之義。麻黃中空外直。死如毛竅骨節。故能去骨節之風寒。從毛竅而出。爲衛分發散風寒之品。桂枝之條縱橫。宛如經脉系絡。能入心化液。通經絡而出汗。爲營分散解風寒之品。杏仁爲心果。溫能助心散寒。苦能清肺下氣。爲上焦逐邪定喘之品。甘草甘平。外拒風寒。內和氣血。爲中宮安內攘外之品。此湯入胃。行氣於立府。輪精於皮毛。斯毛脉合精。

而溱溱汗出。在表之邪。其盡去而不留。痛止喘平。寒熱
俱解。不煩。啜粥而藉汗於穀也。其不用薑棗者。以生薑
之性。橫散解肌。礙麻黃之上升。大棗之性。滯泥於膈。礙
杏仁之速降。此欲急於直達。稍緩則不迅。橫散則不峻
矣。若脉浮弱。汗自出者。或尺脉微遲者。是桂枝所主。非
此方所宜。蓋此乃純陽之劑。過於發散。如單刀直入之
將。投之恰當。一戰成功。不當則不戰而召禍。故用之發
表。可一而不可再。如汗後不解。便當以桂枝湯代之。若
汗出不透。邪氣留連於皮毛骨肉之間。又有麻桂合半。
與桂枝二麻黃一之妙用。若陽盛於內而無汗者。又有

麻黃杏仁石膏連翹赤小豆等劑。此皆仲景心法也。予治冷風嘔與風寒溼三氣成痺等證。用此輒效。非傷寒一證可拘也。○按麻桂二方治傷寒中風者。遇當用而不敢用。註疏傷寒家於不當用者。妄言其當用。如太陽衄血證。宜桂枝湯句。語意在當須發汗下。麻黃主之句。在當發其汗下。二句皆於結句補出。是倒序法也。仲景於論證時。細明其所以然。未及於方故耳。夫桂枝乃行血之品。仲景用桂枝發汗。不是用桂枝止衄。是用在未衄時。非用在已衄後。且奪血者無汗。此理甚明。麻黃乃上升之品。夫既云衄乃解。又云自衄者愈。若復用升提。

之藥。衄流不止可必矣。且衄家不可發汗。此禁甚明矣。
又如小青龍主之句。語意在服湯已上。豈有寒去欲解。
反用燥熱之劑。重亡津液。令渴不解乎。且云服藥已服
湯已者。是何藥何湯耶。觀仲景於所服藥不合法者。必
明斥之。如所云服瀉心湯復以他藥下之。利不止。又云
知醫以他藥下之。非其治也。粗工不知倒序等法。又弱
於風寒二字。而曰是雖熱甚。邪幽在經。以麻黃治衄。是
發散經中邪氣耳。請問邪氣寒乎熱乎。若寒邪則血凝
不流。焉得有衄。若熱邪則清降不遑。而敢升發耶。且云
點滴不成流者。必用服藥。若成流不止。將何法以善其

後乎。此悞于下蒼生之最盛者。余因表而出之。

修身圖
卷上

六

