

金匱要略淺注補正

金匱要略淺註補正目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一

痙濕暍病脈證第二 列方附

括萁桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第三 列方附

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括萁牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

瘧病脈證第四

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括蕞根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節病脈證第五 列方附

侯氏黑散

風引湯

防己地黄湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附今古錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

卷三

血痺虛勞證治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸方見婦人雜痛

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廕蟲丸

附千金翼艾甘草湯

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺艾甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金薑豉湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯方見前

卷四

奔豚氣病證治第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣脈證第九

栝實薤白白酒湯

栝實薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食脈證第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯方見上

瓜蒂散

五臟風寒積聚脈證第十一

旅覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽脈證第十二

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見上

小青龍湯方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

小半夏茯苓湯方見上

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸方見婦人

五苓散方見痰飲

文蛤散

括萹瞿麥丸

蒲反散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

卷六

水氣脈證第十四

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯

見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲反散

見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

附外臺黃耆防己湯

方見風濕

卷七

黃痺證治第十五

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

見痰飲

柴胡湯

見嘔吐

小建中湯

見虛勞

附瓜蒂湯

見暈病

附子金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄胃滿痰血脈證第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

赤豆當歸散

見狐惑

瀉心湯

卷八

嘔吐噦下利脈證第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

金匱要略淺註補正

目錄

四

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸浸淫脈證第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝虻蟲脈證第十九

藜蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷九

婦人妊娠證第二十

桂枝湯

桂枝茯苓丸

附子湯

利下

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後脈證第二十一

小柴胡湯見嘔吐

大承氣湯見痙病

當歸生薑羊肉湯見寒病

下瘀血湯

大承氣湯見痙病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病脈證第二十二附婦人陰挺論

小柴胡湯見嘔吐

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯見欬嗽

瀉心湯見驚悸

溫經湯

土瓜根散

旅覆花湯見五臟積聚

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

腎氣丸

膏髮煎見黃
痺

當歸芍藥散見
娠

蛇床子散

小兒疳蟲蝕齒方

小建中湯

狼牙湯

金匱要略淺註補正卷四

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男 蔚古愚 石校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航校

奔豚氣病證治第八

師曰。心者君主之官也。神病則非。有氣凌之。則為奔豚。有火邪。此四部病。皆從驚發得之。蓋以驚

心病。而肝之風木。乘少陰之熱氣。而煽動。則為驚怖。有於離火。而既濟。則為火邪。此四部病。皆從驚發得之。蓋以驚

凡心傷而致病者。皆是然。心既傷矣。固驚而謂之驚。可也。非驚亦謂之驚。無不可也。

此一節為奔豚證之開端。類及吐膿等症。四部同出一源。概以驚字括之。蓋言皆心病也。師不明言心病。而言驚發者。原為中人以上告語。後之註家。或附會其說。或闕疑以待。恐斯道

日晦。吾不得不急起而明之。

師曰。上既以奔豚合四部。而指其所從得矣。今請專言奔豚之病。奔豚病。其象如豚。從下少腹起。上衝咽喉。從腎發作。上乘於

欲死。氣衰。復還。止。皆從驚。心恐。傷腎。得之。傷於腎者。皆可作恐觀也。蓋以心腎之氣。本

自交通。一受傷。則無復限制矣。

金匱要略淺註補正

奔豚氣病

此言痛發於心腎為奔豚之本證也。

補曰從少腹起上衝咽喉將此二句詳悉其路道便可知病之原委矣蓋少腹指胞室而言胞乃膀胱之後一大夾室也男子為精室女子為血海精生於腎氣而下入網油以降至於精室之中為真陽入胞宮蒸動膀胱之水化而為氣還透入胞宮上循臍旁氣街以上至於胸膈由膈上胸由胸上肺氣至喉全從胞宮之膜以上連及於咽喉而胞中之衝脉亦隨之上行以夾於咽其發奔豚也腎陽不能化水寒水之氣隨衝脉上逆至胸至肺即入於心是為腎氣凌心之奔豚故下文有桂苓加桂二方所以治水也胞室又肝所司胞血會腎水乃化為精若胞宮肝血不靜肝火上逆則為奔豚上氣是為肝氣奔豚湯治肝氣所以治火蓋腎水肝火皆會於胞宮故有此水火二証

然腎處於下與肝相通所謂乙癸同源是也然肝腎之氣並善上逆今請言肝邪之發為奔豚其木氣之逆上而衝胸木邪剋土其腹必痛肝臟有邪

其氣通於少陽則為往來寒熱以奔豚湯主之

此言奔豚之由肝邪而發者當以奔豚湯暢肝氣而去客邪也為客邪立法若肝臟本病發作以烏梅丸為神劑此即金匱之正面處尋出底面也

奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸

黃芩

芍藥各二兩

半夏

生薑各四兩

生葛五兩

甘李根白皮一升

右九味。以水二斗。煮取五升。溫服一升。日二。夜一服。

按傷寒論奔豚云。厥陰之為病。氣上衝心。今奔豚而見往來寒熱腹痛。是肝臟有邪。而氣通於少陽也。

魏念庭云

上下升降。無論邪正之氣。未有不由少陽。少陽為陰陽之道。路也。陰陽相搏。則腹痛。氣升。則熱。氣降。則寒。隨奔豚之氣作患也。

徐忠可云

此方合桂枝小柴胡二湯。去柴胡。去桂枝。去大棗。以太陽少陽合病治法。解內外相合之客邪。肝氣不調。而加辛溫之芍歸熱氣上衝。加苦泄之生葛李根。不

治奔豚。正所以深於治也。尤在涇云。苓桂為奔豚主藥。而不

用者。病不由腎發也。按服此湯而未愈者。用烏梅丸神效。
奔豚證。有腎氣乘外寒而衝心者。試約其證。而出其方。發汗後。燒針。令其再汗。針處被寒。寒襲腠裏。火核起而赤者。必發

奔豚。氣從少腹上至心。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯主之。

此為既成奔豚。而出其正治之方也。尤在涇云。此腎氣乘外寒。而動發奔豚者。發汗後。燒

針復汗。陽氣重傷。於是外寒從針孔而入。通於腎。腎氣乘外寒而上衝於心。故須灸其核上

以杜再入之邪。而以桂枝湯外解寒邪。加桂內泄腎氣也。

桂枝加桂湯方

桂枝 五兩

芍藥

生薑 各三兩

甘草 三兩

大棗 十二枚

右五味。以水七升。微火煮取三升。去滓服一升。

元犀按 汗後又迫其汗。重傷心氣。心氣傷不能下貫元陽。則腎氣寒而水滯也。加以鍼處被寒。為兩寒相搏。必挾腎邪而凌心。故氣從少腹上至心。發為奔豚也。灸之者。杜其再

入之患。用桂枝湯補心氣。以解外邪。如桂者。通腎氣。煖水臟。而水邪化矣。

大棗湯主之。 奔豚證有腎侮心虛。而上逆者。試約其證。而出其方。 **發汗後。臍下悸者。** 以發汗傷其心液。心氣虛而腎氣亦動。 **欲作奔豚。** 以茯苓桂枝甘草

此為欲作奔豚。而出其正治之方也。

程氏曰。汗後臍下悸者。陽氣虛而腎邪上逆也。臍下

為腎氣發源之地。茯苓泄水以伐腎邪。桂枝行陽以散逆氣。甘草大棗助脾土以制腎水。煎用甘瀾水者。揚之無力。全無水性。取其不助腎邪也。

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤

甘草 二兩

大棗 十二枚

桂枝 四兩

右四味以甘瀾水一斗先煎茯苓減二升納諸藥煎取三升去滓溫服一升日三服甘

瀾水法取水二斗置大盆內以杓揚之上有珠子五六千顆相逐取用之也

此發汗後心氣不足而後腎氣乘之臍下悸即奔豚之兆也

孫男心典稟按

因驚而得似只宜以心為治也然自下而上動於腎氣激亂於厥陰而撤守

甘草大棗湯治汗後腎氣凌心即悟桂枝甘草湯又手胃心之治也更悟桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯火逆驚狂之治也因本豚湯治氣上衝胸即悟烏梅丸氣上衝心之治并四逆散加茯苓心下悸之治也因桂枝加桂湯治氣從少腹上衝心即悟理中湯去朮加桂臍下動氣之治也先祖云仲景書一言一字俱是活法難與不讀書者道亦難與讀書死者道也

於句下者道也

補 曰仲景書毫無偏倚而讀者注者每失之偏皆由詳畧之間未免疎忽也有如奔豚一

是火逆而立奔豚湯一是水逆而立桂苓二湯本是對舉之文乃因桂苓二方較詳人遂將

奔豚一湯畧過故有但知寒水之奔豚而不知火逆之奔豚者皆後人之誤也蓋即仲景文

詳細考之再者古人名義絕不含糊証名奔豚豚者江豚一作鮪又作狫江豚遇烈風則出

遇暴雨則出仲景以之名証蓋謂肝主風風為陽邪肝風生火而上逆則為火逆之奔豚也

如江豚因風而出是腎主水水為陰邪腎氣生寒而上逆則為水氣凌心之奔豚也如江豚

因而而出。是古人文字精鑿。學者當細究焉。

胸痺心痛短氣病脈證并治第九

師曰。病有最虛之處。即為容。邪之處。當辨之於脈。夫欲取脈當先其太過與不及。如關前之陽脈微。是陽氣虛。陰弦。是陰

邪實也。陰邪乘於陽位。即胸痺而心痛。所以然者。責其上焦。陽氣極虛也。極虛則無以為勝邪之本矣。然單虛不為痛。今陽脈微。是

知其病在上焦。其所以胸痺心痛者。以其陰之弦。乃陰中之寒邪。乘上焦之虛。而為痺。為痛。是

也。故

此言胸痺心痛之病。皆由氣虛容邪。從其脈象而探其病源。

其間亦有不從虛得者。當分別觀之。故另備一審因察病之法。如無病之平人。又無新邪而發寒熱。乃忽短氣不足以息者。當是痰飲食

之氣。而然此不實也。責其虛。當責其實也。

此乃出實證。與上節對勘而愈明也。

補曰。此條非胸脾証。而引此者。正以明此條短氣與胸脾之短氣不同也。仲景全書均是

借贅定主。旁見側出。令人互勘而辨其真實。讀者若死於句下。則多窒矣。

人之胸中。如天陽氣用事。陽氣一虛。諸陰寒得而乘之。則為胸痺之病。蓋諸陽受氣於胸。而轉行於背。氣

不行之。則阻其上下往來之路。而為痺。喘息欬唾。塞其前後。