

小兒疳積加桂附各五十餘分而安

柴胡 葛根 甘草 桂枝 防風 人參 白芍

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去查溫服不時

養衛化毒湯 人參 黃芩 桂枝 甘草 當歸 石水煎服

初虞世云惜寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用陳文中異功散

治見見形結 吳氏云當治痘瘡寒戰用白水膏歸加苓治之愈

袁氏獨附湯治寒戰 大附子 用水一盞燈草七根煎服

右方加入參貳錢肉桂伍分黃芩貳錢橘紅壹錢甘草伍分當歸

壹錢則為附子振陰湯 寒戰咬牙捷效方也但紫莖快黑者用

咬牙呵欠者肝虛也肝 員黃為相火火盜木之氣故肝

虛之證形焉陽引而上陰引 開而欠也陽上極而下陰下極

而上則合而齧也十全大補湯土之 如發熱之初值咬牙者此與

瘧痢吐瀉暈目弱者不同須審形證分治之若多久咬牙頓悶者肝

黃芩桂枝湯 養衛化毒湯 養血湯

藏熱也

痘發

目上竄咬牙者心藏熱也導赤散心不可妄

用陳氏辛熱之劑

上竄咬牙者心熱也諸瘡皆屬心火上竄者火

炎上之象也咬牙者火氣動也導赤散加酒炒黃連牛黃

主之

咬牙面赤作渴

宜地黃丸

薛一小兒痘瘡

咬牙面赤作渴此陽氣虛

用五味異功散加木香而愈後仍咬

牙面赤作渴至夜為甚此脾腎陰虛也用地黃丸大補湯而愈

小兒咬牙作渴面色忽白忽赤脉洪數按之無力左關尺為甚此屬

腎虛也用地黃丸補甲益氣湯尋愈後因驚風青目赤呵欠咬牙

尋衣領此肝經虛熱用加減八味丸料煎與密飲頓安又用補中益

氣湯而痊一小兒咬牙作渴飲冷大便微秘寒戰痘赤多在身側

此屬膽經虛熱也用小柴胡湯柴胡麥門散各一劑又用加味四物

湯而痊

清神化毒湯

治心肝火旺其牙相戛而鳴者

升麻

生地黃

幼科諸症

金匱玉函堂

門人南昌張緯校

痘瘡

寒戰咬牙

寒戰者森然若寒戰然搖動也咬牙者上下片牙相磨
 曰諸風振掉皆屬肝木之戰而振掉搖動風之象也火氣
 錢氏曰肝主風虛則咬牙多矣又上焦咬牙為熱也然寒戰
 牙心肝之氣虛也或氣虛咬牙為血虛或氣虛咬牙為
 謂津液不足者皆不知
 二證並見若瘡已壞加之
 調各轉動之間身體振掉者此
 破瘡所困不能動
 之不可更在寒戰妄投熱藥也
 有只咬牙者此

蓋肝虛咬牙心熱者亦咬牙勿便作不治論如

此邪氣將出外與正爭故振振搖動火之象也瘡

主之瘡已出或已成而邪氣未盡者表氣虛而不勝邪氣之盛也

衛化毒湯主之如瘡已出而邪氣未盡者表氣虛而不勝邪氣之盛也

可謂之瘡也瘡成而後收醫之時痂皮圓淨但或時戰慄

者此正氣將復不能自持之兆不必憂疑須臾自定有筋

者經絡之血為熱所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕惕然一全大

自跳跳然而動也不可謂之寒戰但養其氣血脈微細

湯汗主之瘡一全大自跳跳然而動也不可謂之寒戰但養其氣血脈微細

不及兩寸乃脾氣虛熱用五味異功散獨參湯十全大補湯肉

一婦人愈後寒戰脈浮大按之微細此血氣虛也用十

十餘劑而愈後因勞寒熱往來寒時手足如冰熱時

大重按則細此陽虛甚也朝用補中益氣湯加桂枝

不通

甘草

防風

麥門冬

右用水煎服

人參蠟蛻散治咬牙喘滿煩躁作渴

方見痘煩躁

錢氏百神丸治憂齒甚妙

如寒戰咬牙併作者則少陰專主之觀

其瘡本

如瘡本潰爛寒戰咬牙者此手少陰心火也經曰熱勝則

肉腐寒戰咬牙火氣動搖之象也

如瘡本焦黑寒戰咬牙者此足

少陰腎水也腎色黑為主蟄封藏之本乾黑者真藏色見

在變動為慄寒戰者腎本病也腎主骨牙為骨餘寒戰則鼓鑄而兩

牙相軋咬牙者腎寒所發也此二證者在心熱則清之在腎寒則溫

之其病已瘳治之何益

或曰陽氣虧損咬牙寒戰者獨參湯參附

湯甚効

若氣血不榮而不能磨其以調亂不寧卧則嘔氣泄瀉寒

戰咬牙者陳氏異功散

見形不伏

方香當歸以救之

錢氏法寒戰

咬牙黑暗者百祥丸下之

方黑陷

薛前證若手足並冷渴飲熱湯不

便泄瀉者陽氣虛寒也宜熱補之手足不冷大便不利渴飲溫湯者

脾氣虛熱也宜調補之手足不熱大便秘不利渴飲熱湯者脾胃虛弱也宜溫補之 一 小兒出痘寒戰咬牙四肢倦縮大便自利手足並冷喜飲熱湯此陽氣虛寒也 一 小兒出痘未異功散末二錢諸證頓退又用人參白朮散參耆四聖散而醫 一 小兒十四歲面色忽赤忽黑出痘寒戰咬牙作渴煩熱喜飲熱湯此陽氣虛寒也用十全大補湯散煩渴頓止乃以八珍倍加參耆至膿灌又作渴面赤此膿成而血氣虛也用當歸補血湯八珍湯而醫至月餘面赤煩渴或時昏憒痘痕如繖或時作癢脈法大按之如無此血脫也用大劑當歸補血湯而安 一 小兒膿未灌寒戰咬牙腹脹屬脾胃虛弱用四君子湯肉桂歸耆肉豆蔻又用參耆四聖散而痊後用托裏散四君子湯而膿一小兒膿場寒戰咬牙喜飲溫湯手足不熱屬陽氣虛弱也用參耆四聖散諸證已退用參耆托裏散其漿漸灌用十全大補湯其痂頓落 一 產婦出痘寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱此脾胃虛寒外

假熱也大補湯加桂附三四劑去附易乾薑二三劑仍用參耆四聖散并五味異功散加歸耆治之而痊 諸書多以寒戰咬牙併作為不治之證然能善治之多有生者蓋熱毒不能盡發內與正氣相搏則筋脉因之而動搖人之一身惟手足能運動口能開闔皆虛境也相搏之際故手足戰搖而口齒相憂矣

無憂散

治臨危痘證寒戰咬牙

人牙

自落者下別多少火煨存性淨入韭菜汁中大煮

次小牙二木研極細末

黃

珍珠

各五分

右俱研為末每服三五分

多則一錢用荔枝湯下

一方有牛黃五分

透骨解毒湯

治寒戰咬牙

紫草

甘草

當歸

防風

陳皮

赤芍藥

右各等分水煎服

催熱丹

痘踰八九朝膿漿

不

出胎條然寒戰咬牙以此治之

虎牙人牙各一枚

酥炙研細和人參丁香末乳酒和服

滴個金

石寒戰咬牙

狗頭去肉留腦髓酥炙脆細研為末

厥逆

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢者諸陽之本常宜

和煖如指頭微寒者陽氣衰也易氣起於十指之端足心冷者陰氣勝也陰氣集於

足下而起如瘡本條黑煩渴而逆者此陽毒內陷熱氣

逆伏手足爲之冷所謂熱深厥亦深火極似水者如瘡在灰白泄利

而厥逆者此元氣虛憊陰陽不相順接而手足爲之冷也瘡疹之候

頭常欲涼足常欲溫故頭溫足冷者不治厥逆乃瘡家惡證也如

因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯便閉主之瘡黑者百祥丸主

之但見如因利氣虛而厥者陳氏木香散爲與功散吐利

主之快但十指頭微寒者四君子湯不能理中湯吐利並加桂主

痘瘡發熱手足却宜和煖雖云足爲腎要涼涼非冷也只與常人

同遍身皆熱而此同常人故稱涼亦和煖之意非真冷也若手足冷

由其人曾多吐瀉脾藏虛怯脾主四肢所以冷冷爲惡候不可單用

發表反損脾胃宜和中發表兼用痘出以脾胃為主又宜急與木作湯以飲之不可因循空談發事也先以黃耆建中湯腹痛加防風羌活或四君子湯加黃耆桂枝防風以發之發後以四君子湯加黃耆白芍藥當歸桂心以補脾胃養氣血而助痘瘡之成就也如瘡始出手足便冷者其人先有吐利四肢者皆稟氣於胃脾胃氣弱不能至經理中湯加桂主之

參附湯 治痘疹陽氣虛寒咬牙寒戰手足竝冷或吐瀉不食飲沸湯不知熱用獨參湯加好真附炮如法者每劑先加一錢未應多加之更不應加至四五錢或等分亦無妨但用之以運其陽氣如已脫者不治

二神散 治傷寒體寒肢冷時知口氣冷難發難壯暫用 丁香

乾薑一錢

右為末每服五分白湯送下蓋被片時令脾胃

煖然陽回則痘變順矣量兒大小輕重用之

眼目

蓋目者心之使也神所寓焉發熱之初觀其兩目神倦不欲開者
也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心故候見於目也目赤者熱
甚也心惡熱急解之經曰肝通竅於目瘡疹發熱目連劄者肝有風
也風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也目
直視者肝有熱也熱入於目牽其筋脉兩眦俱緊不能轉眴故目直
也得心熱則搐者風火根搏也痘癰發搐此其常候但瀉心肝上之
火搐止則吉搐不止則凶鍼經曰五臟六腑之氣皆上注於目而
之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑睛血之精爲絡氣之
精爲白睛肉之精爲餉水裏擷痘瘡之毒發於五臟六腑毒之甚者
眼必受之古人留護眼之法其意深矣凡瘡出太甚兩眼常出淚者
肝熱也此時眼中無瘡但內服瀉肝火之藥蓋淚中之痘常在收靨
不齊之後有之如瘡入目成膚翳者切不可用點藥損睛破瞳成廢

眼

人矣痘瘡收後目不可開者肝熱則目澀不敢開明暗皆然心熱見
明則合暗處則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫去
目開者瘡已過期收靨不齊目閉不開者瘡壞欲變目上竄者心絕
也直視不轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞑者氣脫也血
貫瞳子者火勝水竭皆死候也 護眼法見見形證治 痘毒入眼
而虛弱者不宜涼劑俟靨後治之雖有目翳切不可用點藥只宜色
血解毒俟五臟和平翳當自去若誤用點藥則非徒無益而反害之
丹如痘傷眼必用山梔赤芍決明歸鬚連翹防風桔梗升麻小劑末
之調服如眼無光過百日後血氣完復則自明矣 張炳堉痘疹後
毒氣攻眼或生翳膜赤黑之類宜用四物湯加荊芥防風煎服兼用
黑豆皮藏精草海蛤甘草等分爲末用熟豬肝切片蘸服神妙治一
毒目翳用江西蛤粉黑豆皮 另痘後生翳數服効用葳靈仙油
等分洗淨不見火與日爲細末每服隨時宜第三次下

錢氏黃蘗膏痘初出塗面護眼方見證治大法調肝散治痘後失感

不入眼方見羊肝散即下蜜蒙散方見治大法蟬蛻散治痘入眼半年已

裏者一月取効猪羊蹄甲二兩入罐子內鹽泥固封燒存性蟬蛻去土取赤殼

右二味研人羚羊角細末二分拌勻每服一字百日見一二分

三歲三四分煎水或新水調下日三四夜一二食後下上者

治瘡疹入眼馬尾勃各半蛇皮各半皂莢子十四粒

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下三錢食後

治瘡疹入眼或翳栝棗根半兩蛇皮二錢右為細末用羊肝

一箇批開入藥末二錢麻線纏定水消煮熟頻與食之兒未能食

肝乳母多食之又方用蟬蛻末以水煮羊肝湯調服二三錢

海藏地黃散治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或白膜遮睛四

邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地黃 當歸各一 黃連 大黃煨 防風 羌活

生犀未蠟蛻 木賊穀精草 白礬藜 沙花葉

生地黄 木通 甘草各壹錢五分 玄參五分 右為細末每服壹字

或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調下日三夜一忌口將息大人亦治

東垣云治痘瘡風熱毒翳膜暈遮睛以瀉青丸治之大効初覺易治

雲岐用竹葉湯和炒糖水化下瀉青丸二丸漸至微利神効

癰人眼用决明撥雲蜜蒙花通聖蛤粉散之類然無出此海藏云黃若病

時隨經而取不使毒氣轉入眼中為尤妙然眼有五輪亦當求責此言為宋治者說也

决明散 治瘡痘入眼海藏云此少陽太陰之劑

决明子 瓜蒌仁各半 赤芍藥 甘草炙各一分

右為細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔調下臨臥服

撥雲散 治瘡痘入眼及生翳 用桑螵蛸真者一兩炙令焦細研

搗為末入麝香少許每服二錢米泔調下

蜜蒙花散 治小兒痘瘡入眼及無辜疔氣入眼 蜜蒙花三

青楸子 决明子 車前子 各壹兩 右末拌勻用羊肝一

薄批抄上濕紙裏煨熟量多少空心服之 錢氏海藏云即羊肝散

通聖散 治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花 如無甘菊代之然不如白菊好 萊豆皮 穀精草 去根各一兩

右爲細末每服一大錢柿乾一箇米泔水一盞同煎候米泔盡只

將柿乾去核食之不拘時日三枚日近者五七日遠者半月取効

蛤粉散 治小兒瘡子入眼 穀精草 蛤粉 各等分 右爲細末每

一錢七豬肝一兩許批開摻藥捲了用竹箬裹脉線縛定水一碗

煮令熟入收口筴煎熟眼候溫取食之曰作不過十日退

眼閉不開者肝經熱也用消毒救苦湯 痘大子母同服或先用柴胡

麥冬散 餘毒 次用四物湯 失血 加山梔亦可曰赤腫痛者亦柴胡麥

冬散并穀精散治之倪氏雄德啓微集治痘疹餘毒不解未滿二十

一日上攻眼目生翳淚淚俱多紅赤腫閉者亦用消毒救苦湯治効

促致令目睛上吊而露白非痘毒也時人謂風證謬甚但只露白而無他證急以保元湯加陳黃米主之七日之後有此十生六七七日之前有此百無一生無魂失志者不治不省人事者不治

洗肝明目散 當歸 川芎 防風 山梔仁 龍膽草 柴胡

木賊 羌活 蜜蒙花各等 右剉為末每服一錢茶沙調服

蟬殼明目散 治眼目風腫及生翳膜等疾 蟬殼去足 地骨皮

黃連宜州者 牡丹皮 白朮 蒼朮米泔浸 菊花各一兩

龍膽草五錢 研瓜子半升 右為細末每服一錢牛荊芥煎

湯調下食後臨臥各一服治時疾後餘毒上攻眼目甚効忌熱麵

炒豆醋等物

蟬蛻散 蟬蛻 蜜蒙花 黑豆殼 萊豆殼 明月砂各等分

共為細末每用一錢以豬羊肝一片批開入藥末在內麻托

力外症瘡

消熱熟頻與食肝飲湯

蜜蒙花散 治痘入目翳膜遮睛 蜜蒙花 菊花 石決明

白蒺藜 木賊 羌活 右為末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼 兔糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎湯頓服

亦可煉蜜為丸酒送下三五十九

兔糞丸 治痘入眼或生翳障 兔糞炒四 石決明煨 草決明

木賊 去節 白芍藥 防風 各一 黃歸 五錢 穀精草 錢

右為末蜜丸莖豆大每服三五十九荆芥湯送下

吹耳丹 輕粉 飛丹 為細末左眼翳吹右耳右眼翳吹左耳只

吹一二次 又方 加雄黃麝香少許 外用石燕子一對檳榔

一對三味磨水常服

洗肝散 大黃 梔子 防風 薄荷葉 當歸 川芎 羌活 各

右剉散每用三錢水一盞煎六分不得煎熟空肚服

當歸

川芎

防風

赤芍藥

防已

梔子

右各等分爲

細末每服二錢茶清調下作湯煎服亦可

加味四物湯

瘡毒入目血熱不散兩皆皆赤兼治瘡癰

當歸

川芎

白芍藥

防風

生地黃

荊芥

各等分

右剉散每服

五錢水一盞半煎一盞分作三次服

羌活防風散

日三服一切翳障皆可磨去

羌活

防風

川芎

甘草

木賊

桑豆皮

荊芥

各三錢

蟬蛻

穀精草

蛇蛻

雞子殼

用內薄皮各二分

右爲極細末茶清調下每服一錢食後服

秦皮散

治大人小兒風毒赤眼痛癢澀淚昏暗羞明

秦皮

滑石

黃連

各等分

右每用半錢湯泡乘熱洗

僊靈皮散

治痘疹入眼

僊靈脾

葳靈僊

各等分

右爲末每服

半錢米湯調食後下

力中虛寒

卷之六