

增補
加批

臨證指南醫案

臨證指南醫案卷六

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲全校

(耳)

風溫上鬱

某溫邪上鬱耳聾右脹薄荷馬勃桔梗此當外治連翹杏仁通草
某二先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百目不愈此體質陰虧觸入風溫未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

苦丁茶

鮮菊葉

金銀花

生萊豆皮

川貝母

鮮荷葉梗

益元散

某氏風溫發熱左耳後腫痛恐成外症

乾荷葉

苦丁茶

馬勃

連翹

杏仁

黑梔皮

畢三壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰據述苦降滋陰不效是不明虛實經絡矣內經以春病在頭膏梁之質厚味酒醴助土熾火固非治腎治肝可效每晚卧時服茶調散一錢

又鮮荷葉汁

羚羊角

石膏末

連翹

元參

鮮菊葉

牛蒡子

午服

又照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

葉

火風侵竅耳聾

連翹

薄荷

甘菊

淡黃芩

苦丁茶

黑山梔

顧二暑邪竅閉耳失聰

鮮荷葉

鮮菊花葉

苦丁茶

夏枯草

蔓荊子

連翹

淡黃芩

黑山梔

某八左耳聾痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱宜用辛涼輕藥

鮮菊葉

苦丁茶

黑山梔

飛滑石

連翹

淡竹葉

某二暑熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱杏仁連翹殼淡竹葉川貝白沙參六一散

頭重耳聾目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上焦

連翹

羚羊角

薄荷梗

丹皮

牛蒡子

桑葉

以上俱當外治

上膈火

暑

增補

臨證指南醫案

卷六

耳

上海華南田岫雲全校

可清方
喜和極

上膽心鬱
炎火腎傷

腎虛
氣閉

方批日言

某風木之鬱耳脈欲閉連翹 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶 夏枯草花 黑山梔皮 小生香附

倪計因大聲喊叫至右耳失聰想外觸驚氣內應肝膽膽脈絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻竅治在少陽

忌食腥濁 青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹 鮮荷葉汁 苦丁茶

汪耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅書云膽絡脈附耳先議清少陽鬱熱以左耳為其故

也桑葉 丹皮 連翹 黑山梔 青蒿汁 象貝母

丁腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故陰精走洩陽不內依是以耳鳴時閉但病在心腎其

原實由於鬱鬱則肝陽獨亢令膽火上炎清晨服丸藥以補心腎午服湯藥以清少陽以膽經亦絡於耳也

水煑熟地 兩 麥冬 兩 龜板 兩 牡蠣 兩 白芍 兩 北味 兩 建連 兩

磁石 兩 茯神 兩 沉香 錢 辰砂 錢 女貞子 錢 赤苓 錢 生甘草 錢

夏枯草 錢 丹皮 錢 生地 錢 山梔 錢 女貞子 錢 赤苓 錢 生甘草 錢

姚三氣閉耳鳴 宜外治通竅 鮮荷葉 杏仁 厚朴 廣皮 木通 連翹 苦丁茶 防己

金三下虛耳鳴失聰 磁石六味去黃加川斛龜甲遠志

王腎數開耳膽絡脈亦附於耳凡本虛失聰治在腎邪于竅閉治在膽乃定例也今年己六月脈形細數是

皆腎陰久虧肝陽內風上旋蒙竅五行有聲多動真氣火風然非苦寒直降可效填陰重鎮滋水制木佐以

鹹味入陰酸以和陽藥理當如是議

熟地 龜板 鎖陽 牛膝 遠志 茯神 磁石 秋石 萸肉 五味

某八十耳聾乃理之常蓋老人雖健下元已怯是下虛上實清竅不主流暢惟固補下焦使陰火得以潛伏

磁石六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳心亦寄竅於耳膽絡脈附於耳體虛失聰治在心腎邪于竅閉治在膽經蓋耳為清空之竅

清陽交會流行之所一受風熱火鬱之邪與水衰火實腎虛氣厥者皆能失聰故先生治法不越乎通陽

鎮陰益腎補心清膽等法使清靜靈明之氣上走空竅而聽斯聰矣如溫邪暑熱火風侵竅而為耳聾痛

風溫
燥熱

暑濕
鬱蒸

木火
上鬱

脹者用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花輕可去實之法輕清泄降為主如少陽相火上鬱耳聾脹者用鮮荷葉苦丁茶青菊葉夏枯草蔓荊子黑山梔羚羊角丹皮辛涼味薄之藥清少陽鬱熱兼清氣熱為主如心腎兩虧肝陽亢逆與內風上旋蒙竅而為耳鳴暴聾者用熟地磁石龜甲沉香二冬牛膝鎖陽秋石山萸白芍味厚質重之藥壯水制陽填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽為主因症施治從虛從實直如庖丁之道寢矣那時乘

耳聾之法二端然大段不過清上鎮下二條案中方極穩當至於外治之法及虛寒等症則不可不知也

某風溫上鬱目赤脈左弦當用辛以散之桑葉夏枯草連翹草決明赤芍

某三失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之

鮮菊葉冬桑葉生甘草赤苓皮萊豆皮櫓豆皮

鮑氏秋風化燥上焦受邪目赤珠痛

連翹薄荷黃芩山梔夏枯草青菊葉苦丁茶桑皮

席用淡滲漸安是暑入氣阻熱蒸淫鬱勿取大辛大苦之開泄微清邪中上治法

冬桑葉穀精草望月砂苡仁川通草萊豆皮茯苓

顧五頭額悶脹目赤羚羊角夏枯草草決明山梔皮連翹生香附

潘戒飲濁減十四略可加穀近日竟又無寐目珠赤痛陽升不交於陰暫停妙香散此症宜養血

桑葉丹皮夏枯草黑山川貝苡仁

陸姬鬱勃氣火翳遮目睛高年苦辛難退

夏枯草穀精草草決明望月砂生香附連翹山梔皮丹皮

某頭面風腫目起星是氣中熱

羚羊角夏枯草薄荷梗穀精草生香附小生地丹皮望月砂連翹山梔

脾肺 血絡 虛熱

陰虛 火鬱

腎虛 肝風

營陰 虛

肝陰 虛

汪 脈左弦。左目赤痛淚多。
桑葉 丹皮 草決明 小胡麻 夏枯草 穀精草 萊豆皮 黑櫨豆皮

汪 目痛偏左。翳膜紅絲。診脈左弦澹。由肝膽氣熱所致。
草決明 冬桑葉 夏枯草 小胡麻 丹皮 穀精草 宜用點藥

某 十肝火上鬱。目眶紅腫。連翹 赤芍 菊花葉 黑梔皮 苦丁茶 夏枯草

江 脈數右大。鬱久熱生。目障心痛。夏枯草花 小生香附 金石斛 半夏麴 茯苓 橘紅

某 八目胞浮腫不飢不運。桑皮 茯苓皮 大腹皮 廣皮 蔓皮 苡仁 通草 王 高年目暗已久。血絡空虛。氣熱乘其空。攻觸脈絡。液盡而痛。當夜而其乃熱氣由陰而上。想外科用酒調末藥。必係溫散攻堅。因此而痛。虛症可知。

葉 微寒。汗大出。下有痔漏。左眼眵疼痛。此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。
羚羊角 連翹心 夏枯草 青菊葉 全當歸 川桂枝 丹皮

某 六味去黃加芍。蔓荊子。丹皮重用。
右目多淚。昔脈心嘈雜。陽明空虛。肝陽上擾使然。當調補肝胃。

祝 嫩黃芪 當歸 白芍 茯苓 煨薑 南棗 祝 八當夏形懶。不耐大氣發泄。入冬兩目無光。精氣無收藏。凡五臟精華皆聚於目。失藏失聚。內乏生真。不獨一臟之損。當用養營湯。

某 脈澹細。左目痛。淚熱翳膜。此肝陰內虧。厥陽上越所致。冬桑葉 炒枸杞 小胡麻

某 望月砂 製首烏 石決明 黃菊花 稽豆皮 細生地 石決明 小胡麻 目痛無光。製首烏 枸杞子 柏子仁 用稽豆皮八兩。穀精珠二兩。煎濃汁。泛丸。每服五錢。

望月砂 刺蒺藜 冬桑葉 黃菊花 用稽豆皮八兩。穀精珠二兩。煎濃汁。泛丸。每服五錢。開水送。

某皆眼目昏心中嘈雜當治肝腎熟地兩六枸杞子兩三桑椹子兩二沙苑兩二石決明兩二

茯神兩二女貞子兩半青鹽兩一黃菊花兩一川斛兩四加蜜丸早上開水送四錢

某六脈滑皆痛右目當風多淚當治肝腎

製首烏 枸杞子 炒歸身 桑椹子 沙苑子 茯神 此當驅風

某五遺止心嘈目淚仍是陽氣過動當填陰和陽

熟地 杞子 天冬 黃肉 五味 生地 茯苓 菊花 山藥 蜜丸

某腫神散大左偏頭痛先損左目是焦煩鬱熱陽升化風劫傷血液使然法當兼補肝腎

熟地 杞子 山萸肉 五味 茯神 菊花 生神麴 穀精草 山藥

眼科一症古有五輪八廓七十二問之辨傳氏又分為一百零八症因名目太多徒滋惑亂至於見症楊

仁齋已備論具載景岳但陰陽虛實寒熱標本施治不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云

目者肝之竅也肝與膽為表裏肝液膽汁充足目乃能遠視故無論外感與內症皆與肝膽有關係焉夫

六淫之邪惟風火燥居多兼寒兼溼者亦間有內起之症肝膽心腎為多他臟亦間有之若夫論治則外

感之症必有頭痛寒熱鼻塞筋骨痠疼脈見緊數或浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之

殊實者肝膽之風熱盛也凡暴赤腫痛脹悶難開翳膜膠淚酸澀作癢斑瘡入睛皆實症也當除風散熱

虛者腎經之水火衰也凡久痛昏暗青盲雀目內障昏朦五色花翳迎風淚出皆虛候也治宜壯水益火

若陰血雖虧而風熱未盡則當審其緩急相參而治若久服寒涼虛陽轉盛則當補以甘溫從乎反佐至

於紅色淺淡而紫者為虛熱鮮澤而赤者為實熱瞳神內湧白睛帶赤者為熱症瞳神青綠白睛枯槁者

為寒症腫脹紅赤眼珠刺痛夜則尤甚目不能開而視物猶見者為邪火熾盛若白翳遮睛珠不甚痛或

全不痛目仍能開而視物不見者為真火不足當細察其形症色脈因症而用藥此內治之大法也若日

久失調致血氣凝滯火熱壅結而為赤腫腐爛翳膜遮蔽致成外障譬之鏡受污垢必當濯磨須用點藥

若但服藥必不能愈至於內障之症但宜服藥倘用點藥徒傷其氣血必無益而有損更當知目皆白珠

熱肺氣壅
鼻端熱壅

清邪
鬱肺氣
室塞

〔鼻〕

屬陽故書痛。點苦寒藥則可效。瞳子黑睛屬陰。故夜痛。點苦寒藥則反劇。是外治之治亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風。屬氣虛痛者。朝重暮輕。血虛痛者。朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。略兼治表。倘槩以風熱而論。專以表散。最易損目。更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。眉稜骨痛。不欲飯食。眼胞紅腫。睛珠刺痛。眵淚如膿。白睛如絮。目珠上竄不下。不得寤寐。甚至顛頂腦後。如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精白濁。腸風痔漏。下血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風。柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡遇活防風。川芎。細辛。藁本。升麻等藥。皆不可用。倘或失治。必致膏傷低陷。青黃牒出。致成痼疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼科專科。觀其案內諸法。真補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及概用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。

眼科自有專家。其現症各有主治之方。案中雖未必切中。然清涼和平。無苦寒溫補等弊。反勝于近日之名為眼科者。醫理苟明。則無不通矣。若欲深求眼科。則有專門之書在。

鮑七兩三年鼻塞不聞。清涕由口噙出。而氣室仍然。大凡頭面諸竅。皆清陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必霧露無質清邪。邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰。自少商穴起。施鍼刺以泄邪流氣。乃一法也。無方

徐十四頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形顏。內痺必鬱而成熱。有鼻柱軌衄矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。用輕可去實。

苦丁茶

乾荷葉邊

蔓荊子

連翹心

飛滑石

白芷

毛

四熱壅肺氣失降。鼻柱室痺。宜外治。

知母

水梨肉

川貝母

水煎膏

水煎膏

水煎膏

水煎膏

水煎膏

水煎膏

水煎膏

梅

鹹降滋填。鼻淵止。得寐。用虎潛法。減當歸陳皮。加天冬。淡菜膠。養筋丸。

沈氏

素有痰火。氣逆。春令地中陽升。木火化風。上引顛頂。腦熱由清竅以泄越。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝膽。

氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭而主治。羚羊角。黑山梔。苦丁茶。青菊葉。

另有治法

此等方皆有專治之方以清火保肺為理無不藥往救所貴博書也

精虛鼻淵

溫邪火

陰虛火

牙癰後絡痺

飛滑石 夏枯草花 又 照方去滑石加乾荷葉生石膏
性情燥急陽動太過氣火上升鬱於隧竅由春深加病失其調達之性輕言春氣病在頭也考五形六氣
迅速變化莫若火風腦熱暗池而為鼻淵隧道失和結成癭核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛
為法然藥乃片時之效得能久安以怡悅心志為要旨耳

連翹心 土貝母 海藻 昆布 黑山梔 川芎 小生香附 鬱金

羚羊角 夏枯草 乾荷葉邊 生研末青菊葉汁法丸苦丁茶煎湯送二錢五分

汪 形瘦尖長稟草木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下並不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛証顯然明白
醫者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈勞法是憂用天真丸

人參 黃芪 白朮 山藥 茯苓 當歸 天冬 羊肉

經云肺和則鼻能知香臭矣又云膽移熱於腦令人辛頰鼻淵傳為衄蟻瞑目是知初感風寒之邪久則
化熱熱鬱則氣痺而塞矣治法利於開上宣鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類先

生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之此外感宜辛散也內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊
山梔石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類苦辛涼散鬱之法也久則當用鹹降滋填如虎潛減辛再加

鎮攝之品其有精氣不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者此勞怯根萌以天真丸主之此就案中大概而
言之也然症候錯雜再當考前賢之法而治之 華玉堂

某 陰虧體質溫氣上蒸齒痛連及頭顱用玉女煎
火鬱顛頂屬厥陰上結核鰥腫

犀角 羚羊角 元參 知母 生甘草 連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

王 酒客牙宣衄血痰血形寒內熱食少陰藥過味姑緩
小 黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛 左牡蠣 澤瀉

風熱

徐二脈細數上出。體屬陰虛內熱牙癰後頰車穴閉。口不能張。其病在絡。藥餌難效。擬進宣通絡痺方。

羚羊角 僵蠶 川桂枝尖 煨明天麻 炒丹皮 黑山梔 鈎藤 當外治

汪 風熱上蒸。齧脹頭痛。當用清輕上焦。

活水蘆根 國圖滑石 西瓜翠衣 生萊豆皮 連翹 銀花

牙症不外乎風火虫虛。此但言其痛也。其他如牙宣。牙擗。牙疳。牙疔。牙癰。穿牙。毒骨槽。風走馬牙。疳之類。皆由於溼火熱毒蘊結牙床。須分上下二齒。辨明手足陽明。及少陰之異。又當察其專科而任之。華玉堂

〔咽喉〕

陸 風火上鬱。項腫。咽喉痛。薄荷 連翹 射干 牛蒡子 馬勃 萊豆皮

邵 風火上鬱。咽喉頭脹。宜用辛涼。西瓜翠衣 滑石 連翹 桑皮 射干 杏仁

汪三 左脈弦數。咽喉脛悶。陰虧體質。不耐辛溫。當以輕藥。暫清上焦。

桑葉 生萊豆皮 白沙參 川貝母 元參 川斛

王二 勞傷。恐有痰腐。進辛潤宣血。初服身痛。繼漸平復。但喉間緊痺。而呼吸飲食仍不覺其苦。眼白仍帶黃。議

清肺中氣熱治。百部 大沙參 鮮枇杷葉 活水蘆根 川貝 地骨皮 南花粉 苡仁

徐五 老勞咽疼。生雞子白散。糯稻根鬚。水洗 刮北沙參 錢 炒麥冬 錢 川石斛 錢 生甘草 分

楊 未病陰氣走泄為虛。穢濁上受則實。咽喉腫痺。上竅邪蒙。日暮昏煩。陰傷日熾。肌膚柔白。氣分不足。此醫

藥雖宜涼解清上。但不可犯及中下。

連翹 鬱金 馬勃 牛蒡子 竹葉心 黑山梔 杏仁 橘紅

艾 上焦之病。都是氣分。氣室則上下不通。而中宮遂脹。熱氣蒸灼。喉舌疳蝕。清氣之中。必佐解毒。皆受事藥

之累疾。

銀花 錢 川貝 錢 馬兜鈴 錢 連翹 錢 川通草 錢 白金汁 杯 活水蘆根 汁 枳梗

又 餘熱蒸痰。難去氣當脫膈。因咳而痛。議以潤降清肅。甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

熱氣分 毒 癰腫 穢濁 上受 喉痺 肺燥 熱 風火

陰虛火炎

孫四腎液不收肝陽上越顛脹流涕咽喉微痛六味加牛膝車前五味
伍六咽喉痛痺發時如有物阻隔甚至痛連心下每晚加劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑微
甘以緩其急耳此症必喉中有細瘰成不

細生地 天冬 阿膠 生雞子黃 元參心 糯稻根鬚

陳三陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆痛百脈皆損秋半天氣已降身中氣反逆越汗出喉痺陽
不入於陰致自為動搏耳夫咽喉之患久則喉痺喉宣妨阻受納最不易治從少陰咽痛例用猪膚湯旬日

喉痛得緩對症轉方寒中欲傷非服藥所能治
張三陰損三年不復入夏咽痛拒紅寒涼清咽反加泄瀉則知龍相上騰若雷光火灼雖傾盆暴雨不能撲滅
必身中陰陽協和方息此草木無情難效耳從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之

又陰涸於下陽熾於上為少陰喉痛乃損怯之末傳矣用猪膚甘涼益坎有情之屬而效今肉腠消燦殆盡
下焦易冷髓空極矣何暇以痰嗽為理議滑瀉之補味鹹入腎可也

牛骨髓兩四 羊骨髓兩四 猪骨髓兩四 麋角膠兩四 用建連肉五兩山藥五兩芡實二兩同搗丸

金四臟液不充陽氣虛風鼓動病起喉辣心震頻頻舉發多因勞怒用內經甘緩一法

人參 黃肉炭 白芍 炙甘草 茯神 小麥 又復脈湯去桂枝

都是暗講

內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火心之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也夫
二經之脈并絡於喉故氣熱則內結結甚則腫脹脹甚則痺痺其則不通而死矣即今之所謂喉癰喉風
喉蛾等類是也夫推原十二經惟足太陽別下項其餘皆湊咽喉然內經獨言一陰一陽結為喉痺者何
也蓋以君相二火獨勝則熱且痛也愚歷攷咽喉湯方皆用辛散鹹軟去風痰解毒為主如元參升麻
湯聖濟透關散及玉鑰匙如聖散普濟消毒飲子皆急於治標而緩於治本恐緩則傷人故以治標為急
耳又嘗考仲景傷寒論咽喉生瘡等症每用甘草桔梗半夏散及湯為主一為少陰水虧不能上濟君火
以致咽喉生瘡不能出聲故以半夏之辛滑佐雞子清利竅通聲使以苦酒入陰劫涎斂瘡桂枝解肌由

上海華僑記書局校印

經脈而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽痛。可無燥津涸液之患。一為陰火上結。而為咽痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急。而救陰液。佐以桔梗。開提足少陰之熱邪。如腎液下泄。不能上蒸於肺。致絡燥而為咽痛者。仲景又有猪膚一法。潤燥解熱。緩中。使其陰陽協和。而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱。陰虧脈數。而為咽痛者。先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痺。氣熱而為咽痛者。又有清肺中氣熱。一法。如情志鬱勃。相火上炎。而為咽痛者。則又有降氣開濁一法。如腎液不收。肝陽上越。而為咽痛者。宗錢氏六味湯。如陰陽交虛。龍相上灼。而為咽痛者。宗仲景猪膚湯法。邪滋九

〔瘡瘍〕

楊九瘡癰四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頰知味。所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。即熱傷元氣之

徵。當與甘藥養胃。陰以供肺。加金匱麥門冬湯。去半夏。加黃芪皮。

吳小脈不浮大。非關外風。初起右掌二指已不屈伸。頭面身半以上。常有瘡泡之形。此乃陽明脈絡內留淫熱。

若非癰氣吸入。定然食物中毒。始與宣解緩攻。

連翹

犀角

赤芍

酒煨大黃

荊芥

片薑黃

又能食。二便通調。臟腑無病。初因膿瘡。瘡愈有泡。自面及肢體。至於右指掌。屈伸皆痛。為脈絡留邪。以致隧

道為壅。前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脈絡壅熱。藉酒力以引導。通後營衛。亦一法也。

銀花

連翹

犀角

生大黃

荊芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚羊角

大豆黃卷

用無灰酒十觔浸

金血舍空。隙內風蠕動。外以熱湯泡洗。淫熱蒸襲肌竅。遂有裂膿流水。况周身漸加麻痺。陽脈亦衰。圖治之

法。清營以熄內風。疎利淫熱。以肅隧道。辛辣腥鮮勿進。尚可緩以計功。

製首烏 鮮生地 柏子仁 川斛 黑糖豆皮 虎骨 蠶沙 黃柏 萆薢 熬膏

吳 瘡癰之後。溼熱未去。壅阻隧道。水穀下咽。亦化為痰。中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服

藥四十劑。純是破氣消痞。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。牛夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又 瘡癰大發。營衛行動於脈中。脈外。可免腹滿之累矣。第穀食尚未安適。猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍

以通調利溼主之。 半夏 苡仁 金石 茯苓 澤瀉

秦 久熱。瘡癰五六年。環口燥裂。溺瀦莖痛。 鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 羌蔚子 銀花 地丁 紫草 共熬膏

王 血熱風動。皮膚癢。荊芥 防風 地膚子 赤芍 銀花 小生地 木通 甘草

張 初因嘔吐。是肝胃不和致病。故辛香剛燥愈劇。然久病必入血絡。熱則久瘡不愈矣。夫木火皆令燥。液易

飢易飽。間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥味皆非對症。

三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金 佩蘭葉 茯苓 苡仁 熬自然膏

楊 身瘦久瘡。血分有熱。精通之年。最宜妥養。脈象非有病。生首烏 三角胡麻 一兩五錢 搗碎水洗

王 脈來滯浮。久瘡變幻未罷。是衛陽疎豁。不耐寒暄。初受客邪不解。混處氣血。浸淫僅在陽分。肌腠之患。議

升舉一法。氣壯斯風溼盡驅。

人參 生黃芪 川芎 當歸 防風 殭蠶 蟬蛻 炙草 生薑 大棗

蔣 鼻瘡口瘡。尿黃膚熱。冬瓜皮 苡仁 不去病

鄒 痰因於溼。久而變熱。癰於經隧。變現瘡疾疥癬。已釀風溼之毒。混在氣血之中。邪正混處。搜逐難驅。四肢

為甚。姑從陽明升降法。連翹 赤芍 白殭蠶 白蘚皮 防風 升麻 滑石 酒浸大黃

汪 風熱既久未解。化成瘡癰。當以和血驅風。當歸 赤芍 川芎 夏枯草花 牛蒡子 製殭蠶

金 頭顱熱癰。未能泄邪。此身熱皆成膿之象。辛涼兼理氣血可愈。

加批臣言才口學志

癰

風熱
項腫

疔

癰疽 疔毒

癰疽

乳

景

風熱毒閉項後腫。

竹葉
滑石
蘆根
牛蒡
馬勃
薄荷葉
黑山梔
連翹
川貝
生甘草

王
疔毒咯血失血都是暑入陰陽

竹葉心
元參心
鮮生地
黑穠豆皮
麥冬
知母
當用解毒
護心丹丸

屠^三秋痢半年未愈瘰癧堅硬痛瘍膿鬱久成熱腑經病可冀其愈

夏枯草
香附
茯苓
苡仁
川貝
丹皮

糜氏頸項結核腹膨足腫肝木犯中痰氣凝滯夏枯草兩三牡蠣兩二澤瀉兩半茯苓兩二

半夏二兩
炒〇
厚樸兩半
橘紅兩一
神麴兩半
生香附一兩
水磨汁泛丸

某氣鬱痰核夏枯草生香附丹皮山梔連翹鬱金赤芍橘紅

王^{四十}脈左數右長頸項結癭時^血生^{地三}丹^{皮兩}犀^{角兩}生^夏枯^{草兩}生^半鉤^{藤兩}藤^半

黑山梔兩二
土貝母兩一
生薄荷錢五

陳躁急喜怒氣火結癭燥筋為痛熱鬱化風氣阻痺寒則腹鳴脘脹苟非開懷歡暢不能向安

土貝母 山梔 瓜蒌皮 鬱金 白芥子 海藻 夏枯草 昆布

沈氏
肝氣鬱遏宿痞乳癰

川楝子 夏枯草 薄荷梗 黑山梔 瓜蒌實 青橘葉 香附汁 丹皮

劉氏乳房為少陽脈絡經行之所。此經血氣皆少。由情懷失暢而氣血鬱癰有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。

竟成沈痼。非癰膿之症。以脈不浮數。在寒熱辨之。

柴胡不去病之方 夏枯草 歸身 白芍 川貝 茯苓 甘草

某氏乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄攻之非易。恐產育有年。釀為瘍症耳。

不中病
青蒿
香附
橘葉
青菊葉
丹皮
澤蘭
鬱金
當歸鬚

流注

孫因噴念失血以來致頸項左右筋腫痛連背部此屬鬱傷氣血經脈流行失司已經百日不痊竟有流注潰膿延綿之憂治在少陽陽明

暑瘍

陳小生香 夏枯草 鮮菊葉 薄荷梗 黑山柅 鉤藤 丹皮 鬱金 脈左數實血絡有熱暑風淫氣外加遂發疹塊壅腫搔癢是屬暑瘍

杏仁 連翹 滑石 寒水石 銀花 晚蠶沙 黃柏 防己

程瘍毒熱症與參芪不效即當清解為是消導亦是未合今者身熱正晡神識欲昏便溏溺赤煩渴是暑氣攻入內侵肺胃有痙厥之變昨用宣肺解毒雖與暑邪無益然亦無害若如黃芪又屬相反大凡熱氣蒙閉

清竅都令神昏當以牛黃清心丸清痰氣之阻使其竅開況暑門中大有是法與解毒勿悞矣

李初病淫熱在經久則瘀熱入絡膿瘍日多未已漸至筋骨熱痛金匱云經熱則瘵絡熱則痲數年宿病勿

事速攻

瘍

犀角 連翹心 元參 丹參 野赤豆皮 細生地 薑黃 桑枝 午服 夜服葵藜丸

某三瘡瘍服涼藥陽傷氣阻脫悶不運腹脹最怕瘍毒內閉急宜通陽

厚樸 廣皮 薑皮 茯苓皮 連皮杏仁 桂枝木 澤瀉 大腹皮

某服瘍科寒凝之藥以致氣冲作脹喘急不卧無非濁陰上攻議來復丹

顧五脈微小潰瘍半月餘腫未消膿水清稀浮腫汗出嘔惡惡食此胃陽垂敗癰毒內攻欲脫夫陽失照則陰

液不承元氣撒則毒愈瀰漫清解苦寒究竟斲伐生陽議甘溫胃受培植其本其陷者復振余非瘍醫按色

脈以推其理耳 加桂理中湯 非瘍科方大謬

姚姬潰瘍久不斂氣血耗盡中宮營液枯涸氣不旋轉得湯飲則痰涎上湧勢如噴鼻况久恙若是藥餌難挽

勉擬方 人參 炒麥冬 代赭石 化橘紅

胡納食主胃運化主脾癰瘍痛潰卧床不得舒展臟腑氣機呆鈍何疑外科守定成方芪朮歸地不能補托

氣血反壅滯於裏出納之權交失且是症乃水穀淫氣下垂而致結於足厥陰手陽明之界若淫熱不為盡

也之瘍此切不但極議
故科非以甚方正論

增補 上海華僑圖書局校印

驅藉補托以冀生機養賊貽害焉能濟事

金石斛錢五 槐米半錢 金銀花錢三 茯苓半錢 晚蠶沙錢二 寒水石錢二

徐 營傷心辣納食無味此傷痛大虛當調其中

人參 歸身 炒白芍 木瓜 熟術 廣皮 茯神 炙草

某 膿血去多痛猶未息胃傷不嗜穀口無味左關尺細弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身 丹參 茯神 棗仁 遠志

某 瘍潰膿血去多元真大耗脈無力不嗜食惡心中州不振寐則驚惕神不守也以養營法

人參 熟術 廣皮 茯神 炙草 歸身 白芍 五味 棗仁

某 歲瘍損能食身熱六味湯加青蒿節

曹 旺因瘍漏過進寒涼遂患腰痛牽引脊脊今晨起周身不得自如乃經脈絡脈之中氣血流行失暢久病諒

非攻逐議兩和方法 羚羊角 當歸 黃芪 白蒺藜

顧 潰瘍不合成漏脂液滲去必腸絡空隙內風暗動攻胃則嘔逆吞酸腹痛泄瀉不食津液不升舌焦黑不

渴飲內外兼病難治之症

人參錢一 炒烏梅肉分五 炒黑川椒分三 茯苓錢三 生淡薑分五 炒廣皮錢一 白芍錢半

顧 久損漏瘍胃減腹痛議用戊己湯意 人參 茯神 白芍 炙草 炒菟絲子

王 痛久屈伸不得自如經脈絡脈呆鈍氣痺血瘀鬱蒸上熱旬日頻頻大便必有血下復喘促煩燥不飢不

食並無寒熱汗出全是鋼結在裏欲作內癰之象部位臍左之上內應乎肝癰者壅也血結必入於絡吐痰

口氣皆臭內癰已見一班矣 此是腸癰

炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁 紫苑 冬瓜子 金銀花

某 臍旁紫黑先厥後熱小腹痛如刀刮二便皆澀兩足筋縮有腸癰之慮

老韭白 兩頭尖 小茴香 當歸鬚 炙山甲

腸癰

肝癰

瘍漏

瘡瘍愈後必當補血營毒兼清火為度中平純正因非專家則終無把握

痔

某 古焦黃小腹堅滿小便不利 利兩足皆痿熱結聚六腑不通有腸癰之慮

川棟子 小茴 丹 皮 黑桅 通草 青葱

某 壯熱旬日 周身筋脉壅擊少腹堅硬 便淋漓忽冷忽熱 欲釀膿血 乃腸癰為病 倣孫真人牡丹皮大黃湯主之

戴九痔瘡下血 溼熱居多 今色衰微 顯是虛寒 無速效法 則當補脾胃 因痔瘡猶痛 腫勢高存 佐以淡滲通腑

生於朮 生菟絲粉 生象牙末 生白蠟 何以見得

外症本有專科 先生並非瘍醫 然觀其憑理立方 已勝專科什伯矣 惜其案無多 法亦未備 余不叙述 大凡瘍症 雖發於表 而病根則在於裏 能明陰陽虛實寒熱 經絡俞穴 大症化小 小症化無 善於消散者 此為上工 其次能審明五善七惡 循理用藥 其刀鍼破割 手法靈活 敷貼薰洗 悉遵古方 雖潰易斂 此為中工 更有不察症之陰陽虛實 及因鬱則營衛不和 致氣血凝滯 釀成瘍症 但知概用苦寒攻逐 名為清火 消毒 實任敗胃戕生 迨至胃氣一敗 則變症蜂起矣 又有藉稱以毒攻毒 秘方類取毒藥 合就丹丸 隨症亂投 希冀取效 於目前 不顧貽禍於後日 及問其經絡部位 症之順逆 概屬茫然 此殆下工之不如也 至於外治之法 瘍科尤當究心 若其人好學深思 博聞廣記 隨在留心 一有所聞 即筆之於書 更能廣博醫籍 搜採古法 海上實有單方家傳 豈無神效 其所製敷貼丹膏 但臨症應試 百治百驗 能隨手應效者 即上工遇之 亦當為之遜一籌矣 華玉堂

張二九 經先期色變 膚腠刺痛無定所 晨泄不爽利 從來不生育 由情懷少歡悅 多愁悶 鬱則周行之氣血不通

而脈絡間亦致間斷 蒙瘕 例以通劑

川芎 當歸 肉桂 生艾 小茴 茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

姚二 久嗽背寒 晨汗 右卧咳甚 經事日遲 脈如數而虛 穀減不欲食 此情志鬱傷 延成損怯 非清寒肺藥所宜

增補萬登告南醫案 卷六 調經 上海華福記書局校印

脈者數用桂枝湯建中為脈而仲明有文
婦人全血以治為主當亦為血事

血絡熱
鬱氣痛
腹奇寒
虛帶

肝鬱傷脾
胃肝犯

黃芪 桂枝 白芍 炙草 南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火也虛則不可以清寒況穀減不欲食中氣之餒已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣而桂枝白芍非斂陰和血之妙品乎

秦

二氣衝心痛嘔涎氣墜少腹為為經來後期其色或淡或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

華

三鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必佐益氣之屬方為合法歸脾湯

又

向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動極之徵為肝用太過宜制其用前此茯苓木守補不可用矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢

脈濇脘悶減食經水未遲腹痛墜柴胡 芍白芍 黃芩 鬱金 香附 茯苓 蘇梗 神麴

又

諸恙未減腹但痛不墜逍遙散白朮甘草加鬱金香附神麴

許

八經閉寒熱便澀腹痛加味逍遙散去山梔

其

血虛內熱經不至加味逍遙散去朮

某

經遲腹痛風疹絡血不竅久鬱成熱法當通利涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫

九奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治法歸建中湯

又

久嗽過勞寒熱歸芪建中去薑

謝

三能食不運痼泄經事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脉奇經交病

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡菴蓉

淡骨脂

南桂

當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸

益母膏丸