

東醫寶鑑雜病篇卷之三上

東醫忠勤貞亮匾

聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許

奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。傷寒煩渴。凡得病反能飲水。此欲愈也。傷寒煩渴。凡得病反能飲水。此欲愈也。

燥脈洪大人參白虎湯主之。凡得病五六日。燥脈洪大人參白虎湯主之。凡得病五六日。燥脈洪大人參白虎湯主之。凡得病五六日。

而渴欲飲水不能多者不當與之何者以腹中熱。而渴欲飲水不能多者不當與之何者以腹中熱。而渴欲飲水不能多者不當與之何者以腹中熱。

尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少。尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少。尚少不能消故也至七八日大渴欲飲水惟當少。

與之常令不足勿極意也言能飲一斗只與五升。與之常令不足勿極意也言能飲一斗只與五升。與之常令不足勿極意也言能飲一斗只與五升。

若腹滿小便不利之喘若噦者不可與之若小渴。若腹滿小便不利之喘若噦者不可與之若小渴。若腹滿小便不利之喘若噦者不可與之若小渴。

咽乾者少少與之。咽乾者少少與之。咽乾者少少與之。咽乾者少少與之。

水水入即吐者少少與之。水水入即吐者少少與之。水水入即吐者少少與之。水水入即吐者少少與之。

渴欲飲水者少少與之。渴欲飲水者少少與之。渴欲飲水者少少與之。渴欲飲水者少少與之。

人裏則渴耗奪津液而然也然有渴必有煩者腎
主水熱深則水竭而小便少者謂之消渴渴欲水
陰六七日飲水而小便少者謂之消渴渴欲水
爲欲愈者傳經已盡也脈浮而渴屬太陽宜白虎
湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬
少陰宜猪苓湯凡渴欲飲水常令不足爲善
經云若還不飲其治強飲須發別病生鬻。渴
欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒也神。
陰盛隔陽之症口燥渴而漱水不
嚥蓄血之證亦漱水不欲嚥神

五苓散

治太陽證內裏煩渴而小便不利澤瀉二錢
半赤茯苓白朮猪苓各一錢半肉桂五分右
爲末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服。傷
寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛
躁或飲水不散而反吐出爲水逆證或水雖多而
小便不利者皆裏熱未實不能消水故耳五苓散

的藥也

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四兩人參二錢

麥門冬一錢半夏一錢甘草七分右剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入姜汁二匙服

傷寒潮熱

潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發

者是謂發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家熱也胃實則譫語。潮熱者似潮水之有信一日一發謂之潮必日晡而作陽明也於未中故耳諸承氣湯選用下或潮於寅卯者屬少陽或於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之。吐下後不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脉弦者生脉澁者死

傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌乘衣

而走踰垣上屋不食不臥非大吐下不止表裏俱

熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂

言譫語宜辰砂五苓散呷。如狂者但睡中忽起

行錯言妄語非若發狂莫能制也呷。陽毒發狂

宜陽毒升麻湯陽毒梔子湯。發狂宜用妙

香丸。炳燭三白飲活龍散破棺湯水漬法火劫法

。喜忘如狂蓄血證也。凡發狂見陽證

陽脉者順見陰證陰脉舌捲囊縮者死呷。

三白飲

治傷寒熱病熱極狂走雞子清一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處凉水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗取汁人姜汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水

徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則

加片腦尤妙名曰地龍水

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事入屎乾者燒存性水漬飲汁一二盞卽甦或

細研如麴新汲水調下三錢亦可俗名野人乾水鞋

水漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水噴面

亦可

傷寒譫語鄭聲

實則譫語虛則鄭聲譫語者爲亂語無次第數數更端也鄭聲者爲鄭重

頻煩也只將

一句舊言重疊頻言之也

病胃實則譫語

大小便利手足冷脉微細者

必鄭聲宜用白通湯

大便和小便赤手足温脉洪

數者必譫語

宜用調胃承氣湯

虛實則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之
虛者腸胃自利也難治。傷寒大熱呻吟錯語
不得眠黃連解毒湯主之。晝則明了夜則譫語
如見鬼乃婦人熱入血室證也。傷寒發熱譫

語宜柴胡

連翹湯

黃連解毒湯

治傷寒大熱煩燥不得眠或差後飲酒
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

子各一錢二分半右

剉作一貼水煎服

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得柴胡
黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子仁

連翹黃連黃柏甘草各八分右

剉作一貼入姜三片水煎服

傷寒發熱而反下之必結胃。病發於

未解醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下滿而便痛此爲結胃宜大陷胃湯
痛手不可近燥渴譫語大便實脉沉實有力爲大結胃急以大陷胃湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者死鑑
宜小陷胃湯鑑○寒實結胃無熱證者宜三物白散小陷胃湯鑑○熱實結胃及寒熱結胃活人書不拘寒熱但用陷胃湯不差用枳實理中丸應手而愈細
頭汗出名曰水結胃小半夏湯加茯苓主之飢
○熱實結胃宜用大陷胃丸睺結胃宜用灸法熨法未經下而胃滿非結胃也只以小柴胡合小陷胃加枳殼桔梗
一服如神鑑

大陷胃湯

治大結胃大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分右剉分二貼每取一貼先煎大黃至六

分納硝再煎一二沸去滓納甘
遂未攪服得快利止後服

神

小陷胃湯

治小結胃半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌

瓜蒌至一盞

乃八分半夏黃連煎至半去滓溫服

未利再服

利下黃涎便安。一方加枳實黃芩

桔梗尤效

。瓜蒌惟剉其殼

勿剉其子

剉其子者非也

神

三物白散

治寒實結胃桔梗貝母各三錢巴豆去皮

半錢

弱人減半或吐或利不利進

熱粥一碗

利不止進冷粥一碗

大陷胃湯

治熱實結胃大黃五錢葶藶子炒杏仁炒

丸彈子大

每大丸水一盞

煎六分溫服未利再服

灸法

胃部詳見

熨法

胃部詳見

傷寒藏結

病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胃也何為藏結答曰如

結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉細小沉

緊名曰藏結舌上白胎滑者難治難。病人胃中

素有痞連在臍傍引大小腹入陰筋者此名藏結

死。歌曰飲食如常時下利更加舌上白胎時

連臍痛引陰筋者藏結元來死不。狀如結胃

飲食如故時時下利而舌上白胎。病時素有

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不

通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡。生薑以和

表灸關元以回陽解陰結危哉。藏結與結胃

相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胃者為結

傷寒痞氣

病發於陰而反下之因作痞。傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此為痞半夏瀉心

湯主之胃虛氣逆者亦主之。心下痞硬按之

濡其脈關上浮者三黃瀉心湯主之凡結胃與痞

關脈須沉若關脈浮者宜此湯。心下痞而復

惡寒汗出者附子瀉心湯主之。後下利日數

十行設不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結

熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之

○汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷

鳴下利者生姜瀉心湯主之。太陽病外證未

除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解持

技人參湯主之。痞氣用黃連更難易

胃與陽相結結在藏者為藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或單寒不熱其人反靜飲食如常時時下利舌上白胎助臍腹引大陰筋俱痛者丹田有熱胃中有寒所以難治

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半
乾姜一錢黃連五分右剉作一貼人姜

三片棗二枚

水煎服

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一
貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮一錢
別煮作汁右取白沸湯一盞入二味漬

之良久去滓納附
子汁分溫再服

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩干姜各一錢半半夏製
人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚

水煎服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參干姜各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚

水煎服

桂枝人參湯

桂枝另剉甘草炙各一錢八分白朮人參干姜各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二劑

傷寒筋惕肉瞤

動氣在左而發汗則筋惕肉瞤。傷寒筋惕身瞤發汗太過所致也古人以

真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤瞤煮動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸俱爲之瞤動宜以四物湯去地黃加人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂爲佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主生血生血乃所以收汗也

傷寒除中證

厥而下利反能食者曰陰中不治。厥而利反能食曰除中其死也可立待之。

邪在表則能食也邪在裏則不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再服。厥利當不能食今反能食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也。

傷寒血證

太陽病六七日表證因在脉微而沉反不結

自利者下血乃愈。當湯主之。太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯。傷寒小腹滿應小便不利今反利者為血也當下之宜抵當丸。太陽病不解熱結膀胱其人似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯。衄忌發汗者為無脈或脉微故也。

若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯
桂枝湯助之。若脉微不可汗則犀角地黄湯主
之。功。少陰病強發汗血出九竅是名下
厥上竭不治。太陽病脉浮緊發熱無汗而
者自愈也。傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午
後昏沉耳聾脇痛俗名下血汗病也犀角地黄湯
合小柴胡湯主之。

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒虫
炒去足翅桃仁畱尖各十枚大黃蒸三錢

右剉作一貼

水煎服

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證
但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭

虫各七個桃仁六箇大黃三錢右爲末蜜和分
作二丸水一盞煎一丸至七分頓服未效再服

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑譫語漱水宜此攻之大黃三錢桂心芒硝各二錢

甘草二錢桃仁畱尖十枚右剉作一貼水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度

傷寒自利

傷寒陰證身痛脈沉大便秘自利或嘔或咳宜立武湯坊見。傷寒陽症身熱脈數煩渴引

飲大便利宜柴苓湯研。益元散最住勸。太陰證自利宜理中湯

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉一錢三分白朮猪苓赤茯苓各七分半半夏

七分黃芩人參甘草各六分桂心三分右剉作一貼入姜三片水煎溫服

傷寒胃腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也。臍腹痛少陰也。小腹痛厥陰也。心胃硬痛手不可近

為結胃若未經下者非結胃也乃邪氣填塞胃中只以小柴胡加枳椇治之如未效小柴胡合小陷

胃加枳椇一服如神。若心脹滿而不痛者，乃痞氣也。宜瀉心湯加枳椇。若小腹痛硬，小便利，則為蓄血之證。桃仁承氣湯下之。若小便不利，則為尿澀之證。五苓散利之。若小腹遶臍硬痛，小便澀，大便實者，有燥屎也。大承氣湯下之。

傷寒吐蛔

傷寒有吐蛔者，雖有大熱，忌下涼藥。犯之必死。蓋胃中有寒，則蛔不安其所，而上隔大肉。

之兆也。急用理中湯。坊間加烏梅二箇、紅椒十粒煎服，待蛔定，却以小柴胡湯退熱。傷寒吐蛔者，手足冷，胃虛空也。

陰陽交證

黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾，不為汗衰，狂言不能食，病名為何？岐伯曰：病

名陰陽交者，死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於於穀。穀生於於精。今邪氣交爭於骨