

卫生宝鉴

一
函八册

衛生寶鑑卷十九

名方類集

元羅天益謙甫著

三原李錫齡孟熙校刊

小兒門

時氣溫疫外傷風寒

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻

甘草

白芍藥

各十兩

葛根

十五兩

右四味剉碎每服三錢水一觔半煎八分稍熱服不以時日二三服

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡

咳嗽喘粗鼻塞清涕

人參

細辛

括蕓根

茯苓

白朮

甘草

桔梗

各一兩半

右七味爲末每服一錢水一小觔入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣入生薑煎服不以時○一法加防風川芎各一分同煎

人參生犀散解小兒時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿心忪驚悸臟腑或祕或瀉調胃進食又主一切風熱服尋常涼藥卽瀉而減食者

錢氏方

前胡錢七

杏仁去皮尖 麩炒

桔梗各五錢

人參錢三

甘草炙二錢

右爲粗末每服二錢水一錢煎至六分去粗溫服食後

大青膏治傷風吐瀉身溫涼熱

七謂匙也應服藥多少逐方說不盡並臨時以意加

減之錢氏方

天麻一分末

白附生末一錢半

青黛研一錢

蠍尾去毒半錢

天竺黃一字

烏梢蛇肉酒浸焙末半錢

麝香一字七

硃砂一字

右再研細和勻生蜜和成膏每服半阜角子大至一阜子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之

五歲以上同甘露散服之

天麻防風丸治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣
痰涎不利及風溫邪熱

乾蠍炒

白殭蠶炒各半兩

天麻

防風

人參各一兩

硃砂

雄黃各二錢半

麝香一錢

甘草二錢半

牛黃一錢

右十味爲末蜜丸梧子大每服一九至二九薄荷湯化

下不以時

塗頤法治傷寒錢氏方

麝香

研一字

牛黃

末一字

青黛

末一字七

蜈蚣

末半字

蠍尾

去毒炒末半字

薄荷

半字七

右同研勻熟棗肉劑成膏新絲上塗勻貼頤上四方可

出一指許火上炙手熱頻熨百日裏內外兒可用此塗

浴體法

錢氏方

青黛

三錢

天麻

末二錢

烏梢肉

酒浸焙末三錢

蠍尾

去毒炒

硃砂

研各半錢

白礬

三錢

麝香

一字

右七味同研勻入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗

桃枝一握并葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上

紫霜丸治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心或大便酸臭乳食不消

代赭石

醋淬細研

赤石脂

各一兩

杏仁

去皮尖炒別研五十枚

巴豆

去皮心出油炒研三十粒

右爲末和勻湯浸蒸餅丸如黃米大兒生三十日外可

服一丸一歲至三歲可服二丸至三丸阜角子煎湯送

下米飲亦得微利爲度未利再服更量虛實加減

消積丸

錢氏方

砂仁

十二箇

丁香

九箇

烏梅

三箇

巴豆

二箇去心膜出油

右爲末糊丸如黍米大三歲以上三五丸以下二三丸

溫水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不能克化而生

腹脹四肢瘦弱或病色無常

蒼朮炒三錢

神麴炒五分

大麥蘖炒五分

橘皮去白

半夏湯洗

枳實炒各三分

人參

厚朴薑製

青皮各二分

右爲末糊丸如麻子大每服二十九丸溫水送下食前忌

飽食

五臟熱及肌熱

瀉青丸治肝熱生風一名瀉肝丸若斑後眼有翳膜亦可

服湯使同微利爲度

錢氏方

當歸

川芎

草龍膽

羌活

山梔仁

川大黃

濕紙裏煨

防風

各等分

右爲末煉蜜丸如雞頭大每服一九至二九煎竹葉湯同砂糖化下

錢氏導赤散治大人小兒小便赤澀臍下滿痛

木通

生甘草

生乾地黃

各等分

右咬咀每服三錢水一觔竹葉少許煎至六分溫服不

以時

瀉黃散治脾熱目黃口不吮乳

一名瀉脾散錢氏方

甘草

炙三兩

石膏

兩半

山梔仁

一兩

防風

四兩

藿香

七錢

右剉用蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一觔

煎至五分溫服清汁無時

瀉白散治肺熱盛

一名瀉肺散錢氏方桑白皮地骨皮各一兩

桑白皮

炒黃三兩

地骨皮

一兩

甘草

炙半兩

右爲末每服二錢水一中觔粳米百粒煎至六分食後

溫服之

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

錢氏方

人參

知母

赤茯苓

去皮

柴胡

甘草

炙

地骨皮

半夏

湯泡七次各等分

右七味爲末每服二錢水一饑生薑三片煎至六分去

粗溫服食後量大小加減

生犀散治小兒骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晚潮熱夜有

盜汗五心煩熱

錢氏方

生犀

鎊末二錢

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛

各一兩

甘草

炙半兩

右爲粗末每服一二錢水一觥煎至七分去粗食後溫服大小加減

雲岐子論宣風瀉白散

雲岐子云錢氏用宣風散三味俱無治風之藥惟有治風之名合加防風一味譬如用軍先鋒辨證以大便飧泄爲熱大便秘散中有結以宣風散下太過爲寒各認其寒熱而再詳合用藥耳瀉白散三味亦無瀉肺之理合加黃連一味爲瀉肺是也內經云肺苦氣上逆急食苦以瀉之由是錢氏自言兼煎入臟君臣藥是包藏其法而言之也

喘促胸痺

奪命散治肺脹喘滿胸高氣急兩脇扇動陷下作坑兩鼻
竅張悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮塞若不急治死在旦
夕

川大黃

白牽牛

黑牽牛

各一兩半
生半熟

大檳榔

一箇

右爲末三歲兒服二錢冷漿水調下涎多加膩粉少許
利下涎爲度出楊氏極濟方

無價散治風熱喘促悶亂不安

辰砂

二錢半

輕粉

半錢

甘遂

錢半麴
裏微煮焙

右爲末每服一字溫水少許滴下小油一點抄藥在上

沈下去腳以漿水灌之立效如神

閻孝忠辨急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰陰陽痢所謂急慢驚者後世名之耳正如赤白痢之類是也陽動而速故陽病曰急驚陰靜而緩故陰病曰慢驚此陰陽虛實寒熱之別治之不可誤也急驚由有熱熱卽生風又或因驚而發則目爲連掣潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起卽了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須臾以藥下其痰熱利下痰熱心神安寧卽愈慢驚得於大病之餘吐瀉之後或誤取轉致

脾胃虛損風邪乘之似搐而不甚搐此名瘈瘲似睡而精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

潔古老人辨急慢驚風

急驚陽證小兒咳嗽痰熱積於胸膈屬少陽諸腑受病也謂熱即生風或因聞大驚而作謂東方震卦得火氣而發搐火本不動燄須風而動當用利驚丸與導赤散瀉青丸地黃丸搐止服安神丸

慢驚陰證小兒吐瀉病久脾胃虛損大便下痢當去脾胃間風先以宣風散導之後用史君子丸益黃散其痢即止

若不早治卽成慢驚癎瘳者似搐而不甚搐脾胃虛損致被肝木所乘屬諸臟受病也用溫補羌活膏主之

急驚

利驚丸

錢氏方

天竺黃

錢二

青黛

輕粉

各一錢

黑牽牛

生頭末半分
一方用半錢

右同研勻煉蜜丸如豌豆大一歲兒一丸薄荷溫水化

下食後服

地黃丸治腎虛

錢氏方

熟地黃

八錢

山藥

山茱萸

各四錢

白茯苓

去皮

澤瀉

牡丹皮

各三錢

右六味爲末煉蜜丸如桐子大三歲已下一二九或三九溫水化下食前服

安神丸治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚啼

錢氏方

山藥

麥門冬

去心

馬牙硝

甘草

白茯苓

去皮

寒水石

研各半兩

硃砂

一兩研

龍腦

一字七

右爲末煉蜜丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下不拘

時

妙香丸治小兒驚癇