

徐氏醫學十六種

陽明病提綱

陽明之為病胃家實也

陽明屬胃胃實為陽明病根有實於未病之先者有實於得病之後者有風寒外束熱不得越而實者有妄汗吐下重亡津液而實者有本經熱盛而實者有他經轉屬而實者此只舉病根胃實外證

陽明病外證身熱汗自出不惡寒反惡熱也

胃家實外證身蒸蒸然裡熱熾而達於外汗濺濺然從內溢而無止息表寒已散故不惡寒裡熱閉結故反惡熱只因胃家實之病根即見身熱自汗之外證不惡寒反惡熱之病情非即可下之證必識語潮熱煩躁痛脹纔可下耳

陽明病證脈

陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時脈浮者必盜汗出

潮熱有時脈浮而緊是浮為熱熾緊非為寒盜汗為營虛熱迫故脈必浮而不兼他象

傷寒三日陽明脈大

脈大者兩陽合明內外皆陽之象陽明初受表邪脈但浮而未大與太陽同三日來熱自裡發熱勢太盛故脈亦應而洪大也

脈浮而大心下反硬有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令溲數溲數則大便硬汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻陽明主津液所生病津液乾則胃家實故禁汗與溲夫脈之浮緊浮緩浮數浮遲皆不可攻而可汗此浮而大反不可汗而可攻者以此為陽明三日之脈當知大為病進不可拘浮為

在表也。心下者胃口。心下硬已見胃實一斑。以表脈不當見裡證。故曰反硬。有熱屬藏。是指心肺有熱。攻之謂攻其熱。不令者禁止之辭。屬府指膀胱。膀胱熱故洩數。不令處見當滋陰之義。汗出多亡津液。而大便硬。即汗出少亦未免大便硬而難出。其利於急攻可知。若脈遲則便非藏熱而浮大皆為虛脈。矣。正以發明心下硬一證有無熱屬藏為妄攻其熱者禁耳。

不可下證

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。

嘔多者是水氣在上。焦而津液未乾也。胃家雖實慎不可攻。攻之恐利遂不止。腹滿嘔吐是太陰陽明相闕證。胃實胃虛是陽明太陰分別處。要知胃家實雖變證百出不失為生陽下利不止參附不能挽回。便是死陰也。

誤汗使難證

陽明病自汗出。若發汗小便自利。此為津液內竭。大便雖硬不可攻之。當須自欲大便時宜蜜煎導而通之。若土瓜根及大豬膽汁皆可為導。

汗出瀉利而更發其汗。乃胃中津液兩竭。必大便硬而難出。是內燥而非內熱也。只須外潤不可內攻。於自欲大便時因勢蜜煎導而通之。挾熱者土瓜根大豬胆汁皆可為導。

蜜煎導

治陽明無熱胃虛使閉脈沈者。

白蜜七合

銅器內煎熬如飴。攪之勿令焦着。可丸捻作撻頭。銳如指大長二寸許。乘熱納穀道。欲大便

去之

胃虛腸結燥閉不通。故宜甘以緩之。潤以通之。是陽明無熱而胃虛使閉者。法當需此通導。則腸結解。

而胃氣無傷也

大猪胆一枚 瀉汁少許入醋納穀道中食頃當大便

腸結有火胃家有實故宜猪胆之苦以泄之寒以瀉之是胃本無火腸結挾熱者需此外導以通泄之則腸熱化而胃不寒也土下根導亦不出苦寒通導腸結之義

陽明傷寒證

病有得之一日不發熱而惡寒者雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

陽明自受寒邪一日惡寒與太陽同至二日寒化熱熾即自汗出而惡熱也若從他經轉屬必常在六七日而不在一二日間

陽明病機

陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

陽明受寒始雖惡寒二日自止蓋胃為戊土位處中央表裏寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而為實實則無所復傳所以為陽明之病根也

太陽轉屬證

太陽病若發汗若下若利小便亡津液胃中乾燥因轉屬陽明胃實大便難此為陽明也

此太陽轉屬陽明之病因有亡津液之病機故成此胃家實之病根也

本經成實證

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽明也

胃實之病機在汗出多病情在不能食初因寒邪外束故發熱無汗繼而胃陽中發故反汗多而嘔不

能食是病在陽明而成實也

太陰轉屬證

傷寒脈浮緩手足自溫者。繫在太陰。太陰者身當發黃。若小便自利者不能發黃。至七八日大便硬者為陽明病也。

太陰轉屬陽明者。病機在小便。小便不利是津液不行而濕土受病。病仍在太陰。身當發黃。若小便自利則津液越出而轉屬陽明。為燥土受病。故大便當硬也。

陽結陰結證

其脈浮而數能食不能便者。此為實。名曰陽結也。期十七日當劇。其脈沈而遲不能食身體重。大便反硬。名曰陰結也。期十四日當劇。

脈浮數為陽盛。陽盛於胃者。名陽結。脈沈遲為陰盛。陰盛於胃者。名陰結。陽結能食不大便。陰結不能食能大便。陽結期十七日劇。陽主進合乎陽數之奇。陰結期十四日劇。陰主退合乎陰數之偶。能食者過期不能食者不及期。蓋陽結即是胃實。陰結無表證。當屬之少陰。不可以身重不能食為陽明而不敢溫補也。

陽明桂枝證

陽明病脈遲汗出多微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。

營虛受邪。腠理不密。故汗出多而微惡寒。純是表氣虛寒。汗出惡寒同太陽桂枝證。以脈遲乃知病在陽明也。惡寒微則發熱亦微。宜桂枝湯啜熱稀粥。法和營散邪。則汗更出而營氣和邪自解矣。

陽明麻黃證

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

表有風寒脈必浮盛有力無汗而喘者邪感外束氣鬱不伸也麻黃湯發汗則汗出而邪外解陽氣和喘自平而脈自斂矣脈證全同太陽而曰陽明者不頭痛項強故耳

麻黃湯見傷寒

小青龍湯合吳茱萸湯證

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

小便利者裡無熱反無汗者表有汗頭痛厥逆必因嘔欬是表裡虛寒胃陽不伸而迫肺上干也小青龍合吳茱萸湯兩解表裡之邪則嘔欬而厥逆頭痛自平矣

小青龍湯見傷寒

吳茱萸湯見少陰

衄血證

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明氣血俱多主津液所生病津液內竭故口燥欲漱水但熱迫血分而不在胃中故不欲嚥水而衄血可必是病陽明之經絡也宜犀角地黃湯清降之

犀角地黃湯見濕溫

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

鼻燥發熱為熱傷陽明之經能食口乾是熱迫陽明之胃表裡受熱脈必浮盛有力而血結於胃血為

熱迫故衄血也。桃仁承氣湯散而逐之。

桃仁承氣湯見太陽畜血

傷寒四五日。脈沈而喘滿。沈為在裏。而反發其汗。津液越出。大便為難。表虛裡實。久則譫語。

喘而胸滿。必脈浮者。病在表。可發汗。今脈沈為在裡。則喘滿皆屬於裡。傷寒四五日。正陽明將陷之候。

反發其汗。而津液越出。則轉屬陽明。而成胃實。便難。譫語所由來。調胃承氣少和之。條中久則譫語。當

作實。則譫語。此傳寫之誤。

調胃承氣湯見陽明中風

發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語脈短者死。脈自和者不死。

陰汗太多。津液越出。則離中之陰大虛。而陽亦外亡。故神明失指。而亦作譫語也。脈短為元陰將脫。不

勝收攝。故死。脈自和為脈有胃氣。是知不死。安神救逆。即可生全。酸棗仁湯滋養心液。以安神明也。

酸棗仁湯 治亡陽譫語。脈緩微數者。

酸棗仁三錢 懷生地五錢 麥冬三錢 肉桂三錢 甘草五錢 白茯苓二錢 白芍藥二錢 北五味三錢 真阿膠三錢

炒生牡蠣三錢 炙甘草五錢

水煎去渣溫服。汗發多。則心液虛。心陽外亡。故譫語也。亡陰而曰亡陽者。以心之液為陽之汗。棗仁

養心。茯神安心。所以奠神明之主。阿膠益血。白芍斂陰。所以振神明之用。生地麥冬。滋既亡之陰。牡蠣

五味。收浮越之陽。炙草緩中。益氣。竹瀝養液。化痰。俾陰液內充。則虛陽自斂。而神明自安。譫語自寧矣。

譫語直視喘滿者死。下利者亦死。

臟語用終陽。不是死證。若譫語直視。目不轉睛。是藏府之精氣將絕。即喘而不休。肺氣已絕。滿而不運。

天實則識語虛則鄭聲鄭聲重語也

邪氣盛則實實則識語言雖誕妄與發狂不同自有一種莊嚴之狀正氣奪則虛虛則鄭聲語言婉轉與識語不同自有一種必欲有求之狀故仲景以重語釋之乃見有鄭重其事而不忽其言也

熱入血室證

陽明病下血識語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之濺然汗出則愈

熱鬱陽明陷入血室血下則陽熱上浮而神明被擾故神識無主語言識妄也但頭汗出刺期門期門乃肝之募瀉其熱而通其經則汗得遍身而畜熱外泄下血自止而識語無不自已黑膏施歧法亦可

以已
施子歧湯 治陽明挾熱脈弦長者

施子歧錢淡歧

水煎去渣溫服 胃熱乘肝陷入血室故下血識語為邪熱入於血室也施子除內煩淡歧泄外熱君以黑膏則陽明之血熱自解而識語自止矣

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇苦滿如結胸狀識語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之

中風經至發熱惡寒當先解其外至七八日熱除身涼反胸脇滿而非結胸發識語而非胃實脈遲為在藏是血結於肝而堵塞神明也此為熱入血室刺期門以瀉結除滿則結血化而識語自已小柴胡加赤芍生地亦已

小柴胡湯見少陽

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上下焦必自愈
傷寒發熱見婦人中風傷寒皆有熱入血室證發熱不惡寒是病在陽明譫語不因胃實是肝虛魂不安而妄見故如見鬼狀病在血分故晝則明了夜則誕妄也不得妄下以傷中焦之胃氣亦不得妄汗以傷上焦之清陽刺之出血以傷下焦之真陰當養血清魂而譫語自已黑道遙合舉輕古拜散主之
黑道遙散 治熱入血室脈數弦虛者

懷生地

錢五

軟柴胡

分五

芍藥

錢半

當歸身

錢三

冬白朮

錢半

白雲神

錢二

木粉甘草

分五

炒荷葉

錢三

水煎去渣溫服

血熱加梔丹

傷寒經至血虛邪熱陷於血室故晝則明了夜則譫語見鬼亦為熱

入血室歸芍斂陰養血尤草健中生血柴胡升陽散熱肝木得遂條達之性茯神滲熱安神心氣亦致

和平之德生地黃滋陰益血腎水有既濟之功炒荷葉升陽和血肝陰有轉舒之妙俾水潤木榮心脾得滋養之力更合黑荆則血室清而魂自藏外熱解而譫語自已又益梔丹以平血中之熱何患邪有解熱猶陷入血室乎

舉輕古拜散

治崩漏吐衄脈浮者

荆芥穗

炒黑

三兩

為末水調三錢亦可入煎劑

經受外邪過熱迫血故血從諸竅溢出宜隨上下以酌湯治之荆芥理

血疎風炒黑端入血分力能和血止血以疎血中之邪端止吐衄崩漏挾邪之血因方製劑無不獲效

陽明中風證

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

傷寒惡寒則浮而重同太陽麻黃證口苦咽乾又似太陽少陽合病更兼腹滿又似太陽太陰合病以名為陽明中風耶以無頭項強痛則不屬太陽不耳聾目赤則不屬少陽不腹痛自利則不屬太陰是知口為胃竅咽為胃門腹為胃室喘為胃病無疑今雖惡寒二日自止脈之浮緊亦陽明潮熱有時之候此陽明初病在裏之表若以腹滿為胃實而下之則腹更滿而小便難大便反易矣當以小柴胡合枳朮湯主之

小柴胡湯見少陽

枳朮湯見前熱入血室證

陽明中風脈弦浮大而短氣腹部滿脇下至心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身疼面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈弦浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

中風二字使藏表熱在內刺之是刺足陽明隨其實而瀉之脈弦浮者向之浮大減小而弦尚存故可與小柴胡以解外脈但浮而不弦大則非陽明少陽脈無餘證則諸證悉罷惟太陽之表未散故可與麻黃湯以解外若不尿腹滿加噦此是內不解小便難者竟至不尿是化源已絕也腹部滿者竟不減脾氣敗而不運也時時噦者更加噦而胃氣敗絕均不可治也此陽明中風之劇者兼太陽少陽兩經證

小柴胡湯見少陽

麻黃湯見太陽

陽明中寒證

陽明病若能食名中風不能食名中寒

風為陽邪故能食寒為陰邪故不能食以能食不能食別風寒亦以見陽明之虛實也此陽明初受表邪先辨胃家虛實為診家着眼處

陽明病若中寒不能食小便不利手足澹然汗出此欲作固瘕必大便初硬後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

胃陽盛則中熱而消穀胃陽虛則中寒而不能食固瘕即初硬後溏之謂肚閉雖固結而腸中不全乾也溏即水穀不別之故胃中寒不能化液故小便不利胃中虛不能攝液故手足澹然汗出耳理中湯加烏梅以溫理之

理中湯見太陰

陽明病脈遲腹滿食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也

食難用飽因於腹滿腹滿因於小便難頭眩又因於食飽耳此胃虛寒濕遏濕於中故食入則胃氣不化而煩清陽下升而眩濁陰不降而腹滿小便難也身體盡黃名曰穀疸不用五苓合枳實理中而反以茵陳湯下之則脈遲為在藏脾氣愈傷故腹滿不減而如故

五苓散見太陰

枳實理中湯治穀疸腹滿脈遲者

於潛丸煖半小枳實炒八分炮姜炭分白茯苓三錢甘草灰伍分

水煎去渣溫服胃虛寒伏遏濕於中則中氣不化而腹滿小便難故身體淡黃名曰穀疸於木健脾

枳實破滯炮姜散寒厚灰溫中氣以化濕祛寒茯苓佐草灰滲脾濕以安中除滿也必偶之以五苓則清

茵陳湯

即茵陳蒿湯見寒熱發黃

除中證

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲為寒今與黃芩湯復徹其熱腹中應冷當不能食今反能食此為除中必死

傷寒是熱發於表脈遲為寒伏於中與黃芩湯復徹在表之內熱則熱去而寒起胃陽不支假穀氣以自救反能食者名除中必死不能食者為寒中宜桂枝人參湯溫之

桂枝人參湯見太陽

梔子豉湯證

陽明病脈浮而緊咽躁口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而讞語若加燒針心忪惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

此陽明半表裡證邪已入腹不在營衛之間故妄汗則腎液虛而發躁心液亡而憤憤且胃亡津液則無以榮潤腸腑而大便秘硬讞語身重若溫針則心恐懼而忪惕煩躁不得眠也下之則胃中空虛客氣動膈故心中懊懣不安脈雖浮緊舌有胎是心中畜熱不散宜梔子豉湯兩解表裡之邪外而自汗惡熱身重可除內而喘滿咽乾口苦自解矣

梔子豉湯見熱入血室

白虎加人參湯

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

燠渴欲飲水是熱已入胃用白虎加人參湯瀉胃火而扶元氣

白虎加人參湯 治燠渴飲水舌燥口乾脈洪大者

石羔五錢人參八錢甘草五錢知母三錢粳米一握

水煎去渣溫服 胃熱熾盛津液頓亡故脈洪大大煩大渴欲飲水數升也生石羔大寒瀉胃火而津液生肥知母辛寒泄肺火以潤腎燥甘草緩寒藥之性用為舟楫而沈降之性始得留戀於胃粳米實安中宮培形氣而生津液使陰寒之品庶無傷損脾胃之虞更加人參者以氣為水母於大寒劑中扶元氣生津血也此湯入胃輸脾歸肺則津液四布而胃熱頓除大煩大渴可解脈之洪大亦無不飲矣

猪苓湯證

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

脈浮渴飲是熱已傷陰發熱小便不利乃濕熱漬於水府也用猪苓湯益陰化氣則熱渴解而小便自利矣

猪苓湯 治發熱口渴小便不利脈浮者

猪苓三錢茯苓三錢澤瀉三錢滑石三錢阿膠五錢

水煎去渣納膠溶和服 發熱渴飲小便不利是濕熱內淫陰津虧少不能上奉以退蒸也猪苓茯苓滲濕化氣理水之源澤瀉滑石滲濕利水清水之用阿膠乃血氣之屬是精不足者補之以味以此滋陰利水則水升火降而小便無不利熱渴無不除矣

施子鼓湯證

施子甘草湯證

施子生薑豉湯證

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣施子豉湯主之若少氣者施子甘草豉湯主之若嘔者施子生薑豉湯主之

虛煩是陽明之壞病懊懣一證以概憤懣怵惕是虛煩之象反覆顛倒切肖不得眠之狀心居胃上即陽明之表此心病皆為陽明表邪故製施豉湯因而越之若少氣加甘草以益氣若嘔加生薑以散邪是從虛煩中細細別出

施子豉湯見熱入血室

施子甘草豉湯 治虛煩少氣脈浮數者

施子穢淡豉穢甘草穢

水煎去渣溫服 虛煩是熱乘心膈少氣是熱傷氣化此病在胸中乃陽明裏之表證施子苦能泄熱寒能勝熱其形象心色赤通心故主治心中上下一切證豆形象腎色黑通腎製而為豉輕浮上行能使心腹之濁邪上出於口外散於肌肉也一吐而心腹得舒則表裏之煩熱悉除熱傷氣者少氣加甘草以益氣而氣自調耳

施子生薑豉湯 治虛煩多嘔脈數弦浮者

施子穢淡豉穢生薑分

水煎去渣溫服 虛熱相搏者胃氣不順而多嘔加生薑以散逆止嘔而虛熱自平胃氣自調嘔無不除矣

施子乾姜湯證

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之

攻裏不遠寒用寒藥大下之寒氣留中可知心微煩而身熱不去裏寒格熱之象也梔子乾姜湯主治之

梔子乾薑湯 治身熱微煩脉沈者

梔子錢半 乾薑二錢

水煎去渣溫服 裏寒格熱故心中煩而身熱不去乃誤下之變也用梔子以解內煩倍乾薑以逐裡寒而表熱自散

梔子厚朴湯證

傷寒下後心煩悸滿起臥不安者梔子厚朴湯主之

心煩則難臥腹滿則難起起卧不安是心熱移胃與反腹顛倒之虛煩不同梔子厚朴湯主治之

梔子厚朴湯 治心煩腹滿起卧不安脉弦者

梔子三錢 厚朴錢半 枳實錢半

水煎去渣溫服 邪熱內乘中氣不化故心煩腹滿起卧不安是太陰陽明相關證也梔子以治煩枳實以泄滿此兩解心腹之劑小承氣之先着歟

梔子柏皮湯證

傷寒身熱發黃者梔子柏皮湯主之

寒傷於表湯氣拂鬱則汗不得出熱不得越而發黃者是胃火蒸騰於經絡黃色外見於皮膚也斯時

施子錢柏皮錢甘草五分

水煎去渣溫服。內熱蒸騰表氣拂鬱則熱瘀經絡而汗不得出熱不得越故發黃也。施子以治內煩柏皮以泄外熱甘草和中則熱解氣調而黃自退矣。

凡用施子湯病人舊微瘧者不可與服之。

向來胃氣不實雖施子亦當禁用。

瓜蒂散證

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞硬氣上冲咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散。

病如桂枝證但頭不痛項不強便非太陽中風證未經汗下而胸中痞硬更非結胸瀉心是邪中於面則入陽明故寸脈微浮鼻鳴發熱汗出惡風者似病在表之表乃病在胸中氣上冲不得息而又邪中於膺亦入陽明是病在裡之表則胸寒結而不散胃陽鬱而不伸故用瓜蒂散因而越之胃陽得升寒邪自散得裡之表和而表之表亦解矣。

瓜蒂散 治胸中痞硬寸脈微浮者

赤小豆兩甜瓜蒂一兩

別搗篩合治之以三錢用豉一兩煮稀糜去渣取汁和散溫服得吐乃止亡血虛家不可與邪結陽明心氣不降故胸中痞硬氣上冲咽喉不得息也瓜蒂色青象東方甲木之化得春升生發之機能提胃中陽氣除胸中實邪為吐劑中第一品其性走而不守必得穀氣以和之赤小豆象心甘酸可以保心

氣黑豆象腎製而為鼓能令腎家之精氣上交於心胸中之濁氣外出於口快吐而不致傷神奏功之捷勝於汗下也

四逆湯證

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之宜四逆湯

飲食入口即吐原非少陰虛寒心下溫溫欲吐溫上則復不能吐此寒結胸中熱蓄心下宜瓜蒂散因其高而越之則邪從吐解矣若膈上有寒飲與心下溫不同反乾嘔與飲食即吐不同宜四逆湯溫之可知手足寒脈弦遲有心溫膈寒二證治分天壤診家須着眼

四逆湯見少陰

太陽病當發熱惡寒今自汗出不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也此為小逆一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥飲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也

太陽病當發汗而反吐之則膈氣內傷自汗反出關上脈細數也惡寒發熱雖除頭項強痛仍在猶未至不能飲食尚為小逆一二日熱正在表誤吐而邪未盡陷飢不能食三四日熱發於裡誤吐而胃陽已亡不喜穀食反喜瓜果是為除中朝食暮吐此為大逆

白虎湯證

傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

脈浮發熱無汗是傷寒之表未解故不可清火若外熱已解是無表證渴欲飲水熱已內攻當用白虎加人參是瀉火而益元氣也俾火熱自化則煩渴自除矣