

卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病主治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五 附癰疽諸症瘡名十律

卷之四

腦疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

瘰癧論十九

鬢疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癭瘤論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六 附乳岩

附骨疽論二十七 附鶴膝風

腸癰論二十八

臟毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

懸癰論三十四

臀癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

疔發四十一

癰疽四十二

小腹癰四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

翻花瘡四十九

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癩風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

瘡癖六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合谷毒六十七

鼻出血六十八

牙縫出血六十九

血箭血痣七十之

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

癩瘡七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘰癧瘡八十八

卷之十一

疔瘰八十九

痰包九十

癩風九十一

咬傷九十三

女人面生鰲鱗斑九十五

枯筋箭九十七

手足破裂九十九

黑子一百一

體氣一百三

奶癬一百五

小兒遺毒爛斑斑一百七

小兒痘風瘡一百九

走馬疳一百十一

胎瘤一百十三

溼腫九十二

風犬瘡九十四

鈕叩風九十六

婦人腳丫作癢九十八

眼丹一百

眼胞菌毒一百二

白禿癢一百四

蟾拱頭一百六

蠮螋串一百八

小兒赤遊丹一百十

重舌一百十二

鵝口瘡一百十四

痘癰一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躐一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

腹痛一百二十三

陰虱一百二十四

葡萄疫一百二十五

百蟲入耳一百二十六

惡蟲可咬一百二十七

人面瘡一百二十八

誤吞針鐵骨哽咽喉一百二十九

中砒毒一百三十

落下頰拿法一百三十一

救自刎斷喉法一百三十二

陰毒一百三十三

失榮症一百三十四

試知百病死生法一百三十五

造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論一百三十七

拾遺症一百三十八

唇風一百三十九

縑縛背瘡一百四十

癰疽內肉不合一百四十一

煉元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金頂砒法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法一百四十八

製寒食麵法一百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

屍神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼喉針形一百五十六
汗研方一百五十七

乳癰論第二十六

夫乳病者乳房陽明胃經所司乳頭厥陰肝經所屬乳子之母不能
調養以致胃汁濁而壅滯爲膿又有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫初
起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛甚宜牛蒡子湯主之厚味飲食
暴怒肝火妄動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝思慮傷脾積
想在心所願不遂者致經絡痞澁聚結成核初如豆大漸若圍
碁子半年一冬二載三載不疼不癢漸漸而大始生疼痛痛則無
解日後腫如堆粟或如覆碗紫色氣穢漸漸潰爛深者如岩穴凸
者若泛蓮疼痛連心出血則臭其時五臟俱衰四大不救名曰乳
岩見犯此者百人百死如此症知覺若早只可清肝解鬱湯或
益氣養榮湯患者再加清心靜養無罣無碍服藥調理只可苟延

歲月若中年已後無夫之婦得此死更尤速故曰夫乃婦之天也
惟初生核時急用艾灸核頂待次日起泡挑破用披針針入四分
用水蠅散條插入核內糊紙封蓋至十三日其核自落用玉紅膏
生肌斂口再當保養不發又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男
損肝腎蓋怒火房慾過度以此肝虛血燥腎虛精怯血脈不得上
行肝筋無以榮養遂結腫痛治當八珍湯加山梔牡丹皮口乾作
渴者加減八味丸腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補湯
懷孕之婦乳疾曰內吹因胎氣旺而上冲致陽明乳房作腫宜石
膏散清之亦可消散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流
出其口難完有此者純用補托生肌其口亦易完矣

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱 頭眩無口乾微疼者順已成掀腫發熱

疼痛有時一囊結腫不侵別囊者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止
四邊作癢生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合
者順初起一乳通腫木痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不熱
不紅堅硬如石口乾不眠胸痞食少者逆已潰無膿正頃腐爛腫勢
愈高痛勢愈盛流血者死潰後肉色紫黑痛苦連心凝氣日深形體
日削者死

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脈浮數邪在表宜散之發熱無寒惡心
嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬
微痛者宜疎肝行氣已成掀腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜托裏
消毒膿已成而脹痛者宜急開之又脾胃虛弱更兼補托潰而不斂
膿水清稀腫痛不消疼痛不止大補氣血結核不知疼痛久而漸大

破後惟流污水養血清肝

乳癰治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作以人參敗毒散一劑表症已退又以牛蒡子湯二服腫消漸漸而安

一婦人憂思過度久鬱成癆左乳結核如桃年年似痛非痛咳嗽生痰身發潮熱診之脈微數而無力此真氣雖弱而邪火尚未有餘如用藥合理亦堪調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而咳嗽漸止寒熱間作又以八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠志十餘服身熱去其八九又以益氣養榮湯加青皮木香兩月餘其胸膈得利暖氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化瘡膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼痛腫如覆碗診之脈數有力此有餘症欲作膿也以

托裏消毒散數服而脹痛卽針之出膿碗許又以十全大補湯加香附十餘服而安

一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲二服疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑腫痛反作形體日弱予診之脈浮數而無力此屬真氣虛而邪氣實也非補不可以益氣養榮湯四五服其腫始高寒熱亦退又十餘服而膿清兼以十全大補湯兩月而瘡此非純補之功其疾豈能得愈

一男子年過五旬因妻喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脈弦數先以小柴胡湯加青皮山梔遠志貝母數服而肝脈稍平又以八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐爲膿更服益氣養榮湯庶保收斂彼爲內醫所惑謂鬱怒傷肝肝經有火不必用補更服降火流氣寬中等劑致食少便秘發熱作渴復請予治肝

脉復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而為燥為熱已上俱內損症也辭不治後月餘果死

一婦人左乳結核三年方生腫痛診之脉緊數而有力此陽有餘而陰不足也况結腫如石皮肉紫色不澤此乳岩症也辭不治又一婦左乳結腫或小或大或軟或硬俱不為痛已半年餘方發腫如覆碗堅硬木痛近乳頭壘壘遍生疔瘡時痛時癢診之脉弦而數腫反慘黑不澤此氣血已死辭不可治又一婦已潰腫如泛蓮流血不禁辭後果俱死

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯瓜蒞仁黃芩連翹柴花粉

銀花山梔甘草陳青皮牛子角針平

治乳癰乳疽結腫疼痛母論新久但未成膿服

陳皮 牛蒡子 山梔 金銀花 甘草 瓜蒞仁

苦蕒

天花粉

連翹

角針錢

此木胡

青皮

水二鍾煎入酒一杯和勻食遠服

橘葉散

橘葉散內有柴胡
石膏黃芩連翹等

川芎山梔青皮迎
甘草加之効有靈

治婦人有孕胎熱為內吹有兒嚙乳名外吹致乳結成腫痛寒熱
交作甚者惡心嘔吐並服之

柴胡

陳皮

川芎

山梔

青皮

石膏

黃芩

連翹名一錢

甘草五分

橘葉二十片

水二鍾煎八分食遠服

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯陳芎
青皮生附併蘇葉

桔半芎歸貝茯神
通草山梔遠志詳

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久激作疼或胸膈不利肢
體倦怠面色痿黃飲食減少

陳皮

白芎

川芎

當歸

生地

半夏

香附各八分

青皮

遠志

茯神

貝母

蘇葉

桔梗各六分

甘草

山梔

木通各四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

鹿角散

鹿角散効獨稱雄
每服三錢酒調下

消乳專於建大功
能殺腫痛永無踪

治乳癰新起結腫疼痛增寒發熱但未成俱効鹿角尖三寸用炭火內煨稍紅存性碾末每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再

一服必消

回乳四物湯

四乳四物湯最靈
加上麥芽能散乳

芎歸白芍熟地星
更消腫脹得和平

治產婦無兒啜乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

川芎

當歸

白芍

熟地

各二錢

麥芽

二兩炒
為麤末

水三鍾煎八分食遠服用腳布束緊兩乳以手按揉其腫自然消

散甚者再用一服