

外科樞要卷三四

薛氏醫酉按

外科樞要卷之三

薛氏醫按

吳郡薛已著

新都吳玄有校

腎癰男婦全用

腎膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖
太陽多血氣運難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾
胃毋損氣血但當固根本爲主若癰硬作痛者形氣虛而邪氣
實也用托裏消毒散主之微癰微痛者形氣病氣俱虛也用托
裏散補之欲作膿用托裏羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢
既退亦用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君
子加芍歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便淋者六味丸加五
味子若陽虛不能潰或膿清不能斂者用補中益氣湯氣血俱

虛者十全大補湯若瘡硬未成膿者用隔蒜灸活命飲潰後豆
豉餅補中益氣十全大補二湯若灸後大勢已退餘毒未消頻
用葱熨以補其氣以消餘毒爲善

治驗

巡撫陳和峯脾胃不健常服消導之劑左腿股及臀患瘡余曰
此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於
衆論云白朮能潰膿乃專以散瘡消毒爲主而瘡益甚體益倦
余用白朮一味煎飲而消

儒者楊啓元左臀患此敷貼涼藥腫徹內股服連翹消毒散左
體皆痛余以爲足三陰虧損用補中益氣湯以補脾肺用六味
丸加五味以補肝腎股內消而臀間潰又用十全大補湯而瘡
口斂

一儒者腫焮痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未能復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之藥頓加惡寒發熱自汗等症余用十全大補湯數劑腫起色赤仍外針內補而愈

崑庠吳輔之父患此內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

南濠沈克章子年三十脈如屋漏雀啄腫硬色夭膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也余用六君加歸芪附子一錢二劑腫潰色赤又減附子五分數劑元氣復而愈

一男子硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而平湖袁上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於臀膿水清稀脈洪大而數寒熱作渴余辭不治後果歿此足三陰虧損之症失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

囊癰二

謂陰囊患癰

囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若小便瀯滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消若濕熱退而仍癰痛宜補陰托裏以速其膿膿熅而便秘者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄之膿去卽解若膿去而癰痛不減者熱毒未解也用清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸內熱晡熱者肝經血虛也四物加參朮體倦食少者脾氣虛熱也補中益氣湯

膜水清稀者氣血俱虛也十全大補湯此症雖大潰而舉九懸
露治得其法旬日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道益虛則瘡者
不能潰潰者不能斂少壯者多成痼疾老弱者多致不起亦有
患痔漏久而串及於囊者當兼治其痔切忌寒藥剋伐虧損胃氣

治驗

給事陸貞山瘡赤脹痛小便瀉滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱
下注也當清肝火除濕毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當
歸銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘草節一劑瘡痛漸退少加
防風木通川芎茯苓作飲下滋腎丸以補陰其熱瘡俱退但內
有一條筋不消此肝經血氣虛損也當滋腎水用六味丸料去
茯苓加五味二劑再用補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓
消而愈

京兆朱二峰陰囊脹痛彼以爲疝余診其脉數而滑此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服活命飲一劑而潰更用補陰托裏而斂

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸軟足心熱至腿膝六脉洪數兩尺爲甚余以足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊癰脹用治疝之藥癰脹益甚形氣愈虛服溫補之劑癰痛上攻小便不利兩尺脉洪滑按之虛甚余曰此囊癰也因氣血虛而不能潰凡用補中益氣湯加山藥山茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前子牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補

五十餘劑而痊

儒者陳時用考試不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊腫脹焮痛遣人求治余以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及歸服翌早報云夜來陰囊悉府王莖下面貼囊者亦腐此肝火挾酒毒而濕熱熾盛也仍以前藥加參芪歸木四劑腐肉盡脫翌九懸掛用大補氣血并塗當歸膏囊莖全復而愈

一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍膽瀉肝湯加黃柏知母黃連牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前症復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞發熱自用四物黃柏知母之類虛症悉具瘡口開大余謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補

全愈

府庠李達卿素腎虛發熱久服黃柏知母之類形體漸瘦遺精
白濁晡熱唾痰余曰此腎水虧損虛火內熾用補中益氣之類
加五味麥門前症將愈又別用清熱涼血之劑飲食少思唾痰
不止余以爲脾肺復虛不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏
而愈後入房頭暈吐痰腰骨作痛大小便道牽痛余曰此精已
耗而復竭所致危殆之症也遂朝用前湯加麥門五味夕用六
味丸料加五味子革薺五十餘貼諸症頓退後又入房陰囊陰
莖作痛別用淡滲之劑陰囊內潰余用補陰托裏之劑出膿甚
多喜瘡消痛止竟不善調養以致大便不通小便如淋痰涎上
湧余曰腎虛之症復作矣誠爲可慮有保其可生者用礞石滾
痰丸牛黃清心丸之類吐痰愈加余曰非惟無以保其生而反

促其危矣固辭不治後果歿

一男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸症頓退再加五味麥門二劑而愈却以補中益氣加麥門五味調理而康若用淡滲後損真陰決致不

懸癰三

懸癰謂瘡生於玉莖之後穀道之前屬足三陰虧損之症輕則爲漏瀝盡氣血而亡重則內潰而卽殞若初起濕熱壅滯未成膿而作痛或小便澀滯用龍膽瀉肝湯癰焮痛甚仙方活命飲並製甘草佐之如此雖患亦輕雖積亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍湯補之若膿已成者急針之欲其生肌收斂腎虛者六味地黃丸血虛者四物加參朮氣虛者四君加芎歸脾

虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯并十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣

治驗

尚寶鮑希傳足發熱服四物黃柏知母之類年餘患囊癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此是三陰虧損水泛爲痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂先用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載乃愈

趙州守患此症瘧多作痛五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脉浮數而無力此是三陰氣血虧損用補中益氣加製甘草五味麥門三十餘劑食進勢緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡斂後因膿作痛少食脇痛發熱仍用前藥賴其稟實頓疾而愈

通府張敬之患前症久不愈曰晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃柏知母之類前症益甚肢體倦少食大便不實小便頻數謂余曰何也余曰此脾虛之症前藥復傷而然余遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進前症漸愈更加麥門五味調理乃痊經云脾屬太陰爲陰土而生血故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等症用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認爲腎虛輒用四物黃柏知母之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣况黃柏知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

一儒者患此服坎離丸及四物黃柏知母之類不應脉浮洪按之細微余以爲足三陰虛用托裏散及補陰托裏散漸愈又用六味丸補中益氣易調補化源半載而痊大凡瘡瘍等症若賢

經陽氣亢盛致陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸
取其若寒能瀉水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致
陰水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生
火中之水使陽氣旺則陰自生況此症屬腎經精氣虧損而患
者十有八九屬腎經陽氣亢盛而患者十無一二然江南之人
患之多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽
氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真水者宜用六味丸補腎
經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎
水經云陰虛者脾虛也但多誤以爲腎經火症用黃柏知母之
類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

上舍劉克新潰後作痛發熱口乾小便赤濇自用清熱消毒之
藥不應左尺洪數余以爲陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加

黃柏知母等諸劑瀉其陽氣使陰自生服數劑諸症漸愈後用補中益氣湯六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈

一儒者小便赤澀勞則足軟痠痛發熱口乾舌燥食少體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山藥倍用製甘草數劑諸症悉退但患處痠痛此膿內炊也又五劑膿自湧出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴痠痛膿多用補中益氣湯加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥門五味百餘劑痠痛悉去喜其慎起居節飲食常服補劑而安但勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕必其收斂致患處大潰幾至不起仍補而愈

便癰

四

一名便毒
一名疔瘡

便癰屬厥陰肝經內熱外寒或勞倦過度或房慾不節或慾心

不遂或強固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散
勞倦過度者補中益氣湯房慾不節者六味丸料慾心不遂者
先用五苓散加大黃疎其精滯後用地黃丸以補其肝腎強固
其精或濕熱壅滯者宜用龍膽瀉肝湯疎肝導滯夫便癰血疝
也屬厥陰肝經之絡脉衝任督脈之隧道故婦人患此多在兩
初瘡痛或腹中結塊小便澀滯苟治者得法患者又能調攝何
難歛之有若槩用大黃等劑以求其內消或令膿隨便下損其
氣血及不慎起居飲食者皆爲不治

治驗

府庠沈尼文年二十左拘患之余以肝腎陰虛先用托裏藥潰
而將愈因入房發熱作渴右邊亦作痛膿水清稀虛症悉至脉
洪大而無力勢甚可畏用十全大補加附子一錢脉症頓退再

劑全退後用大補湯三十劑而愈

一儒者癰痛便澀用八正散二劑清肝火導濕熱而癰痛愈再
以小柴胡加芎歸澤瀉山梔二劑清肝火補脾血而小便利

一男子潰而癰痛不止此餘毒未解用活命飲一劑而痛止再
劑而癰消

一男子痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神効瓜蒌散加山梔
柴胡二劑而消

一男子癰而不潰余謂此因陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元
氣用白芷皂角刺柴胡甘草節以排膿清肝數劑而潰以八珍
加柴胡補其氣血數劑而愈

一男子已潰而痛不止小便秘澀此肝火未解也與小柴胡湯
加黃柏知母芎歸痛止便利更以托裏當歸湯而瘡斂若毒未

解而痛不止者須用活命飲

一婦人素清苦因鬱怒患前症或用敗毒寒涼之藥反晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸症皆愈

一婦人小腹內如有所梗兩扪并人門俱癰小便淋澀經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如鷄卵而漸大脉洪數而虛左關尤甚屬肝脾鬱結之症也用加味歸脾湯肝火退而脾土健間以逍遙散下蘆薈丸而愈

一婦人兩扪癰痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利余以爲肝脾氣滯以四君加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作却兼胸脇脹滿盜汗此肝木甚而傷脾土用加味歸脾湯下蘆薈丸而愈