

御纂醫宗金鑑外科

上海昌文書局
印行

R26

2-1

卷一 編輯外科心法要訣

人身經絡圖歌

脈訣歌

十二經氣血多少歌

癰疽總論歌

癰疽陽證歌

癰疽陰證歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善歌

癰疽七惡歌

癰疽順症歌

癰疽逆證歌

癰疽辨腫歌

癰疽辨痛歌

癰疽辨膿歌

癰疽辨瘰歌

癰疽辨瘰歌

癰疽總論治法歌

內消治法歌

內托治法歌

虛實治法歌

癰疽鍼灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

癰疽灸法歌

桑柴火烘法歌

牛膠蒸法歌

藥筒拔法歌

癰疽烙法歌

卷二 編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

內疎黃連湯

仙方法命飲

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟礬丸

回陽三建湯

透膿散

託裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

護心散

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

復元通氣散

雙解貴金丸

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

復元通氣散

腫瘍敷貼類方

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

如意金黃散

白錠子

科蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

中和膏

雜宮錠子

烏龍膏

科蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

中和膏

鐵桶膏

烏龍膏

科蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

中和膏

潰瘍主治類方

四物湯

八珍湯

十全大補湯

八參養榮湯

八參養榮湯

四君子湯

異功散

理中湯

六君子湯

香砂六君子湯

香砂六君子湯

內補黃耆湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

知藥四物飲

知藥四物飲

托裏定痛湯

補中益氣湯

八參黃耆飲

獨參湯

溫胃飲

溫胃飲

三黃四物湯

補中益氣湯

八參黃耆飲

獨參湯

溫胃飲

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

參朮膏

八仙膏

洗滌類方

慈路瀉腫湯

艾草敷法

豬蹄湯

膏藥類方

萬應膏

紺珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味太乙膏

白膏藥

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

環麻散

整骨麻藥

外敷麻藥

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

薑蓉散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

卷三

編輯外科心法要訣

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

額疽

重疽

鬚疽

天疽銳毒

耳後疽

耳發

耳根毒

玉枕疽

腦後發

腦鑠

油風

白屑風

禿瘡

蝶蛄癬

髮際瘡

面部

顱瘍

顱疽

顱疔

面發毒

面遊風

疔腮

頰瘍

骨槽風

發頤

時毒

風眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

燕窩瘡

雀斑

黑痣

紫黑肝黯

頂部

編輯外科心法要訣

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結核癰

夾核癰

少陽陰囊瘻

背
部
太陽經濕癰 馬刀瘻 陽明經癰 重臺瘰癧 上石疽 朱紫瘰 鈕扣風

上中下發背 上搭手 中搭手 下搭手 蓮子發 蜂窩發 陰陽二氣疽 黃水瘡

腰
部
串疽 酒毒發 連珠發 丹毒發 禽疽 痰注發

腎俞發 中石疽 纏腰火丹

卷五 編輯外科心法要訣

眼
部
眼胞蘭毒 眼丹 鍼眼 眼胞痰核 椒瘡 粟瘡 皮細瘡

漏眼睛瘡 目中芤肉

鼻
部
鼻疽 鼻疔 鼻淵 鼻蠟瘡 鼻瘡 鼻痔 肺風粉刺 酒皸鼻

耳
部
黑疔 耳疳 耳衄 耳痔 耳聾 耳聾 旋耳瘡

口
部
大人口破 鵝口瘡 口瘡

唇
部
反唇疔 鎖口疔 唇疽 齙唇 唇風

齒
部
牙疳 牙宣 鎖牙疽 牙疔 牙癰 走馬牙疳 齒蠟 齒齕

卷六 編輯外科心法要訣

舌
部
紫舌脹 痰包 舌衄 重舌 痰核 重舌 舌疔 舌疳 附癰癧

猴
部

緊喉風

附喉蛾

慢喉風

喉閉

附喉蛾

啞痺喉風

弄舌喉風

喉疳

喉癰

上唇癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

腫中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

靈疽

瘰癧疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳旁

乳岩

卷七

編輯外科心法要訣

腹部

幽癰

中脘疽

淋癰

銜疽

臍癰

附臍中出水

少腹疽

腹皮癰

緩疽

腋部

腋癰

腋疽

脇疔

肋部

肋疽

淵疽

肉發丹毒

脇癰

附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

卷八

編輯外科心法要訣

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

膠疽

肩風毒

樂疽

臑部

臑癰

附臑包

魚肚發

石榴疽

肘癰

臂部

臂癰

附五

腕癰

兌疽

穿骨疽

骨縫疽

螺站串

手部

子癰

掌心毒

虎口疽

附合名

病蝦

手發

調疽

蛇頭疔

天記毒

蛇眼疔 蛇背疔 蛙節疔 蛇腹疔 泥鰍疽 代指 蜈蚣蛇 癰瘡

狐尿刺 鵝掌風

卷九 編輯外科心法要訣

下部

惡癰 穿襠發 跨馬癰 便毒 疳瘡 陰虱瘡 腎囊癰 腎囊風

婦人陰瘡

臀部

鵝口疽 坐馬癰 臀癰 上馬癰 下馬癰 湧泉疽 臟毒 痔瘡

坐板瘡

卷十 編輯外科心法要訣

股部

附骨疽 咬骨疽 股陰疽 橫痃疽 陰疽 伏兔疽 股陽疽 環跳疽

肚門癰 箕門癰 腿遊風 青腿牙疳

膝部

膝癰 疔疽 膝眼風 鶴膝風 下石疽 緩疽 委中毒 上水魚

八面瘡

卷十一 編輯外科心法要訣

脛部

三里發 腓腸發 黃鰍癰 青蛇毒 接骨瘡 附陰疽 內踝疽 外踝疽

穿踝疽 濕毒流注附以膝經 腎氣遊風 膝瘡 鱗漏 四彎風 風疽

足部

足發背 湧泉疽 脫疽 敦疽 甲疽 足跟疽 厲癰 四淫

臭田螺 牛程蟻 土栗 冷疔 腳氣瘡 田螺胞 肉刺

卷十二 編輯外科心法要訣

發無定處上

疔瘡

流注

癰瘡

多骨疽

結核

癰發

瘰癧

烏白癩

卷十三

編輯外科心法要訣

發無定處中

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

紫白癩風

白駁風

癰瘍風

丹毒

粟瘡作痒

枯筋箭

卷十四

編輯外科心法要訣

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令傷毒

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡無圖

血風瘡

瘡瘡

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨癰瘡

風疔無圖

血疔

白疔

漆瘡

血瘡無圖

脫痛無圖

瘡口誤入毒水無圖

諸瘡生蠅蛆無圖

卷十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鉄鍼入肉

鉄鍼誤入喉

誤吞銅錢

骨髕咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人咬傷

熊虎狼傷

馬咬傷

瘋犬咬傷

馬汗驢涎入

蛇咬傷

蜈蚣咬傷

蝎蟄

蜂咬

射工傷

蛇刺傷

天蛇瘡

蠅螫傷

百蟲入耳

卷十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎瘤

紅絲瘤

胎癰瘡

痘癰

葡萄疫

胎驚丹毒

滯熱丹毒

嬰兒瘡瘍

垂癰

胎風

臍瘡

臍突

陰腫

脫肛

肛門作瘡

遺毒

痘裏火癰

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日八神所在不宜鍼灸歌

十二時八神歌

十二支日八神所在歌

十日不宜用鍼犯之病多反覆

九宮房神圖

九宮房神歌

升行靈藥針口法

煉金頂砒法

製寒食散法

百會穴在頂中央自馬髎觀之正對耳尖



百會疽

頭部

百會疽○百會疽在顛頂結經屬督脈百會穴初如粟米漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平燭陽盛溫補快腫連耳項動痰聲七日不潰命必絕此百會疽又名王頂發生在顛頂正中屬督脈經百會穴由膏梁太過火毒凝結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬

如鐵高尖紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩燥脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒散以清毒火外敷沖和膏若漫腫平塌紫暗堅硬聲痛根散惡寒便瀉脈見細數者此屬陽虛以十全大補湯以溫補之外敷回陽玉龍膏若面赤過煩口乾不渴唇潤者屬陽虛浮泛宜服桂附地黃丸引火歸源再用生附子餅置兩足心湧泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰移黃靈藥太乙膏蓋貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏者命必絕矣

黃連消毒散 蘇木二分 甘草三分 陳皮二分 桔梗五分 黃芩五分 黃蘗五分 人參三分 藁本五分 防己五分 防風四分 羌活四分 獨活四分 連翹四分 黃連一錢 生地黃四分 黃耆二錢 澤瀉二分 當歸尾四分 水煎食遠溫服

方黃連消毒毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮桔梗參人參黨二防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

沖和膏○回陽玉龍膏 見腫 生肌散○十全大補湯○黃靈藥○太乙膏 見腫 桂附地黃丸○附子餅 見前 琥珀膏 見後



透腦疽

透腦疽○透腦疽生百會前形如雞子痛而堅軟漫腫稀虛壅陷紅硬膿稠實腫去此證生於百會穴之前額門之際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡頂壅陷而腳跟漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實連潰者順遲潰透腦髓者逆其膿潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽○侵腦疽生透腦傍濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫逆要當詳此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬氣血而虛逆而難治初起宜服利防敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將潰服託裏透膿湯外貼琥珀膏圍敷沖和膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門託裏透膿湯 人參 白朮 穿山甲 白芷 升麻 甘草 皂角 生黃耆 青皮 水三

鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內兌酒半鍾熱服託裏透膿治癰疽已成未

清服之宜參在甲升并麻草當歸黃耆刺青皮

判防敗毒散

見項部

內疎黃連湯

和膏

託裏排膿湯

見項部

琥珀膏

見發際

佛頂瘡在頭頂之前上星穴

佛頂瘡



旁額瘡

額瘡



旁額瘡

判防敗毒散

見項部

仙方活命飲

見腫

旁瘡生在眼角後五分童子瘡穴又名太陽穴

勇瘡



仙方活命飲

內疎黃連湯

二味拔毒散

見腫

瘡



旁瘡生在左右鬢角

圖

赤月青干馬

赤月

生也

各一錢

當常二錢

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

赤月

粉甘蔓節 防風散 小一鐘煎八分食遠服 歌柴胡清肝治怒證宜血疎通解毒良四物生用柴翹等黃芩梔粉草節防

託裏消毒散 二味拔毒散 見腫

天疽 銳毒 毒圖



銳毒生右耳後一寸三分高骨後

天疽生左耳後一寸三分高骨後

黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜託裏消毒散虛者十全大補湯託補之外俱數烏龍膏具

餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

柴胡清肝湯 見前

託裏消毒散 烏龍膏 俱見腫

耳後疽 耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

耳後疽生耳上稍之髮際際間也

天疽 銳毒 天疽居左銳毒右經屬膽腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救此二證

左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之大銳者如鋒刃之銳利言

毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增名雖

各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉薄氣多血少終屬險

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內薰肝肺惡證悉添不致不救若紅腫速潰者順堅硬

方法命飲消之膿成者服透膿散症者服託裏透膿湯外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡換搽生肌玉紅膏生肌飲口若過盛者膿水清稀或瘡口
欽遵即服香貝養榮湯補之自欽

仙方法命飲
見腫○荊防敗毒散
見項部
香貝養榮湯
石疽
透膿散
見腫○託裏透膿湯
見前紅靈藥○生肌玉紅膏○太乙膏
俱見清瘍門



王枕疽○王枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高枕為順紫陷山此證由督脈
經積熱外受風邪凝結而成生在王枕骨穴微上腦戶穴初起如粟麻痺相兼寒熱往來口渴便秘
漸增堅硬大者如如小如鵝蛋紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌潰出血水者屬凶

險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服託裏消毒散外敷神和膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

神授衛生湯○託裏消毒散○神和膏
俱見腫



腦後發○腦後發生在督經結熱風邪乘腫疼紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水山此證屬督脈
經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米欲腫作疼痛引頭項角項氣粗鼻塞漸
大如盤如盤紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時流血水者逆初起內外治法俱按王枕疽其餘內
治法俱按癰疽腫潰瘍門



腦鑱○腦鑱項後如橫木精固毒火上炎升黑如竈烟牛唇硬木痛未腐水流清急施藥灸法至痛
火燎刺痛屬陽經速服仙方活命飲若見七惡定然凶此證先於督脈經風府穴由陰精枯固毒
火乘之而生初起形如椒粒堅硬紫暗漸腫如橫木甚則上至顛頂下至大椎色如炒烟硬若牛唇
未膿皮先腐爛時流清水肌肉冰冷輕者未痛重者毒氣將陷全不知痛宜急施藥灸法或用艾
壯灸法以痛為度速服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯

救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽證速服黃連消毒散外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之

證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法○艾壯灸法
俱見○仙方活命飲
見腫○十全大補湯
見前○黃連消毒散
會腫○回陽玉龍膏
見腫

油風○油風毛髮乾焦脫皮紅光其癢難堪毛孔風襲致傷血養真海艾乾血痊此證毛髮乾焦
成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼刺頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養



毛髮乾焦脫皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼刺頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養
毛髮乾焦脫皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼刺頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養

紫血毛髮無可復生

神應養真湯 羌活 木瓜 天麻 赤芍 當歸 羌活子 熟地 酒蒸 川芎 等分為末。入地黃膏。加蜜丸。桐子大。每服百丸。溫煮酒

或鹽湯任下。方神應養真治油風養血消風髮復生羌歸木瓜天麻羌活熟地與川芎

海艾湯 海艾 菊花 藜本 蔓荊子 防風 薄荷 荆穗 藿香 甘松 各二 水五六盞。同藥煎數滾。連湯共入。飯口鉢內。先將熟

氣薰面候湯少溫用布蘸洗。日洗二三次。洗後避風忌食腥發物。方海艾湯治油風痒先薰後洗善消風前藥蔓荊風薄荷藿香海艾與

甘松

白屑風



白屑風。○白屑風生。頭與面。燥痒日久。白屑見。肌熱風。侵成。燥化。換肌。潤肌。醫此患。注此證初生髮

祛風換肌丸 大胡麻 蒼朮 牛膝 酒洗 石菖蒲 苦參 何首烏 生 花粉 威靈仙 各二 當歸身 川芎 甘草 各一 右為

細末。陳酒煮。跌丸。菜豆大。每服二錢。白滾水送下。忌食腥發物。火酒。方換肌丸治白屑風燥痒日增若蟲行風燥血分失潤養登起白屑

落復生。歸身 胡麻 蒼朮 膝 葛蒲 花 粉 草 威靈 苦參 何首烏 高末 煮酒 跌丸 菜豆 形。

潤肌膏 香油 四兩 奶酥油 二兩 當歸 五錢 紫草 一錢 將當歸紫草入二油內。浸二日。文火燂焦。去渣。加黃蠟五錢。溶化。盡用布濾

傾盤內。不時用柳枝攪冷。成膏。每用少許。日擦二次。方潤肌膏擦白屑風肌膚燥痒用更靈蘇香二油歸紫草燂焦加蠟濃攪凝

禿瘡。○禿瘡。風熱化生。蟲蟻痒難堪。却不疼。白如如錢。生髮內。宜服通聖。擦靈。注此證頭生白如

小者如豆。大者如錢。俗名錢癬。又名肥瘡。多生小兒頭上。騷痒難堪。却不疼。日久延蔓。成片。髮焦

脫落。即成禿瘡。又名癩頭瘡。由胃經積熱。生風而成。宜用防風通聖散。料。醇酒浸焙。為細末。每服一

錢。或二錢。量其壯弱。用之。食後白滾湯調下。服至頭上多汗。為驗。初起肥瘡。宜搽肥油膏。用久則效

已成禿瘡者。先宜艾葉。錫。煎湯洗淨瘡。再用猪肉湯洗之。隨擦。躑躅花油。以殺蟲。散風。蟲死。則痒止。風散。則髮生。血潮。則肌膚潤。久擦

防風通聖散 防風 當歸 白芍 酒炒 芒硝 太黃 連翹 桔梗 川芎 石膏 煨 黃芩 薄荷 麻黃 滑石 各一兩 荆芥

白朮 土炒 山梔子 各二錢 甘草 二兩 生 共為末。方防風通聖治禿瘡胃經積熱致風傷連翹梔子麻黃桔白朮歸芍滑石防黃芩

甘草 石膏 煨 薄荷 荆芥 并硝黃 共末。酒拌。晒乾。碾白湯調服。發汗良。

肥油膏 番木鱉 六錢 當歸 藜蘆 各五 黃蘗 苦參 杏仁 狼毒 白附子 各三 鯉魚膽 二個 用香油十兩。將前藥入油內。熬

至黃。色。去渣。加黃蠟一兩。二錢。溶化。盡用布濾過。罐收。每用少許。用藍布裹於手指。蘸油擦搽。方肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強

黃葉參白附子番薯根毒杏仁良黎盧當歸鯉魚膽煤焦入蠟實奇方

躑躅花油方 躑躅花根四兩搗爛用菜油一盆煤枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次乾帽戴之勿令見風

瘡癰驅蟲止痒擦之良藥躑躅花根研極爛菜油煤枯入蠟強

圖 瘡 姑 蟻



蟻姑瘡○蟻姑瘡即蟻拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多衣膜暑熱形大功易收此證多生小兒頭上俗名貉貓未破如曲蟻拱頭破後形似蟻姑瘡穴有因胎中受毒者其瘡腫勢雖小而根則堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收斂越時復發本毒未罷他處又生甚為纏綿難飲宜用三品一條槍搗於孔內化盡堅硬衣膜擦散生肌散貼玉紅膏以收斂之不敢再發也亦有暑熱成毒者大如梅李相聯三五枚潰破膿出其口不斂日久頭皮串空亦如蟻姑瘡穴之狀宜貼絳珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾散生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作痒抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條槍 白砒五錢 明礬三兩 地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搓成線條陰乾瘡有孔者搽入孔內無孔者先用鍼連孔數早晚搽藥二條搽至三日後孔大者每搽十餘條搽至七日孔內無條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日前後其堅硬衣膜及疔核癰癤痔漏諸瘡自然落下隨用湯洗搽玉紅膏虛者兼服健脾補劑自然收斂

乳白砒礬生用研末煅煉搓條良 敗銅散 化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能滲濕祛毒瘡口易斂

油調敷參濕良 紺珠膏○萬應膏○生肌散○玉紅膏 俱見清

髮際瘡○髮際瘡生髮際邊形如黍豆痒疼堅頂白肉赤初易治胖人肌厚致纏綿此證生頂後髮際形如黍豆頂白肉赤堅硬痛如錐刺痒如火燎破津膿水亦有浸淫髮內者此由內鬱濕熱外乘受風相搏而成也初宜紺珠丹汗之次用酒製防風通聖散清解之外搽黃連膏效惟胖人頂後髮際肉厚而多損紋其髮反刺瘡內因循日久不瘳又兼受風寒凝結形如瓜破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

圖 瘡 際 髮



髮際瘡生頂後髮際內將入多生此瘡

琥珀膏 定粉一兩 血餘八錢 輕粉四錢 銀朱七錢 花柳十四錢 黃蠟四錢 琥珀五分 蘇由十二錢 將血餘花柳由葉佳勢下

蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁碗內預將定粉銀末輕粉琥珀四味各研極細共合一處除餘下入油內用柳枝不時攪之以冷為度結成脂攤貼紅綿紙攤貼亦可。
歌方琥珀膏能治諸瘡活於解毒化腐良定血輕末椒蠟珀麻油熬膏亦瘡瘍

細珠丹 即錫靈丹 ○防風通聖散 見前羌活 ○黃連膏 見鼻部鼻毒

頭風傷目 ○頭風引目眉稜痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後被風侵 注此證畏風惡寒其痛走注不定得煖少減者風痛也

寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣逆不渴小水白者寒痛也身重肢痠胸煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證

舊有古方羌活中和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉稜痠痛眼皮跳動新攻睛珠起藍雲遮睛多致損目如若

只眉稜痠痛以碧雲散常吸之甚效

羌活中和湯 防風 白芷 錢各一 細辛 甘草 各五分 生地 蒼朮 黃芩 各一錢 羌活 五錢 川芎 二錢 引加蔥頭三根生薑一片紅

棗肉二枚水煎食遠服 痛由頂後起屬膀胱經倍加藁本 痛由耳後起屬膽經倍加柴胡 痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷加

葛根煨石膏 頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮 頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減黃芩 頭痛兼有嘔涎

沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸 頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏 便秘者加生大黃 頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏 歌方

沖和頭風風傷目風火寒痰四因生日久眉稜痠痛跳連睛損目此能清防風白芷細辛草生地蒼朮羌活等詳在隨加引經藥慈蓋紅素

水煎成

碧雲散 川芎 鵝不食草 各一兩 細辛 辛夷 各二錢 青黛 一錢 共為細末患者口噙涼水令人以簾筒吹入左右鼻孔內取嚏為效

每用少許鼻常吸之其效緩 歌方碧雲散去頭風證眉稜痠痛更堪驚鵝不食草辛夷鵝不食草細同研吸不時

貼兩太陽穴法 治頭痛如破 雀腦川芎 白附子 各等 研末葱汁調紙攤貼左右太陽穴效 產後風寒侵腦頭痛不可發汗宜用

四物湯倍川芎加荆芥穗服之其效緩 楊梅每入腦髓以致頭痛者治在本門

四物湯 見清陽門

面部

顱瘍顱疽 ○顱瘍顱疽漸榴形風熱積熱小腸經瘍起焮紅浮腫痛疽紫漫硬木麻疼 注此二證發

於顱骨尖處屬小腸經不論左右初小漸大如榴發陽分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日

即潰名為顱瘍毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三七大潰名為顱

疽毒甚根深難愈焉證初宜仙方法命飲初宜內疎黃連湯或麥靈丹其餘內 外治法俱按

仙方法命飲 ○內疎黃連湯 ○麥靈丹 俱見腫

仙方活命飲 ○內疎黃連湯 ○麥靈丹 俱見腫

仙方活命飲 ○內疎黃連湯 ○麥靈丹 俱見腫

仙方活命飲 ○內疎黃連湯 ○麥靈丹 俱見腫



顱瘍宜服色赤左右同

顏疔



顏疔色赤堅硬形小根深左右相同

蟾酥丸

見疔 〇麥靈丹 見腫 〇黃連消毒飲 見頭部 百會疽

面發毒



面發毒形如五粒色紅堅硬

涼膈散

黃芩 薄荷 梔子 連翹 石膏 芒硝 甘草 芒硝 大黃 水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂蜜三匙和服

面遊風



面遊風面生皮肉形如細蟲

痛楚難堪

由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而成痒甚者宜服黃連消毒飲外敷厚風膏緩取效

厚風膏

麻黃 五錢 羌活 一兩 白檀香 一兩 升麻 二錢 白芨 一錢 防風 二錢 當歸身 一錢 用香油五兩將藥浸五日文火烘乾

消風散

見頭部 〇黃連消毒飲 見頭部 百會疽

疔腮

疔腮〇疔腮胃熱是其端初起微疼熱復寒高腫焮紅風與熱手腫色淡熱濕原註此證一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不着骨之處

腮

疔腮



顏疔〇顏疔初起粟米形證由陽明大毒生堅硬頂凹根深固寒熱交作麻痒疼註此發生在顙骨之間屬陽明胃經不論左右初如粟米黃色小泡次如赤豆頂凹堅硬按似疔頭麻痒疼多因過食炙煇藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次服黃連消毒飲清之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺即當急治遲則毒火攻心令人昏潰謔語惡證悉多致不救

面發毒〇面發毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬焮痛津黃水證屬風熱客陽明註此發生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服制防敗毒散汗之若胃火盛則唇焦口渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼之即愈

面遊風〇面遊風燥熱濕成面目浮腫痒蟲行膚起白屑而痒極破津黃水津血痰註此發生於面上初發面目浮腫痒若蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極痒抓破濕熱感者津黃水風燥感者津血

無論左右總發端於陽明胃熱也初起焮痛寒熱往來若高腫色紅焮熱者係胃經風熱所發若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宜四順清涼飲解之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者針之體虛者宜平補之其餘治法俱按腫疽潰瘍門此證初起若過服涼藥令毒攻喉者險

藥山慈姑 黃藥 各等分共研細末雞子清和蜜水調敷 〇清涼消毒去風熱發乳雄黃花粉 麝馬糞慈姑黃藥研雞清蜜調毒即滅〇制防敗毒散 〇乳香 雄黃 天花粉 麝香 烏

八分不拘服
歌樂胡葛根發表證非腮腫痛或平形石膏化粉黃公草牛旁連翹桔梗升
四順清涼飲 防風 梔子研生 連翹心 甘草生 當歸 赤芍 羌活錢一 大黃二錢 水二鍾燈心五十寸煎八分食遠服

方四順清涼攻裏強口乾便秘非腮瘡防風梔子連翹草歸芍燈心羌大黃一託裏消毒散見腫痛門

類癰



類癰○類癰胃經積熱生初如紅粟漸榴形膿出腫消易斂
類癰骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過數寒藥以致肌冷凝結堅硬不消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰宜託裏消毒散膿熟鍼之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急不開或旁腫不消膿水清稀固而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉餅灸灸艾壯初用九壯以如熱痒為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹擦入瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯 犀角二錢 升麻五錢 黃芩八分 白附子八分 炮姜二錢 生甘草五分 白芷八分 川芎八分 羌活一錢二分 防風八分 水三鍾煎一鍾食遠服
方犀角升麻湯類癰色紅初起服之良善白附生甘草白芷川芎羌活防風

升陽散火湯 撫芎六分 蔓荊子 白芍酒炒 防風 羌活 獨活 甘草半生 人參錢各一 柴胡 香附各一錢 葛根一升麻錢 薑五錢 生薑一片紅棗肉一枚水三鍾煎一鍾食遠服
方升陽散火過數寒牙牙拘急木痛堅撫蔓芎防羌獨草參柴香附葛升薑

骨槽風 骨槽風火三焦實耳前腮頰隱隱疼痛清筋骨仍硬痛牙關拘急失邪風注此證一名牙 託裏消毒散見腫痛門 豆豉餅見灸法 紅升丹 萬應膏俱見腫痛門

骨槽風



骨槽風○骨槽風乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰又發一名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋骨仍然浮腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消清後瘡口雖合多致不斂初起熱不盛者內宜服清陽散火湯外以清胃散擦牙真若妙貼敷數貼如初起發表之後人壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷種蠶下之後減大黃加生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜用中和湯託之已潰按癰疽潰瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非獲靈不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片灸灸頰穴六七壯其穴在耳垂下五分隔中庭每日灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血牙關即開若寒熱不退形焦體削痰涎不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散 姜黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處方清胃散擦牙腫痛姜黃白芷細辛各一錢 湯後擦此藥有奇功○中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆各一錢 蒼朮五分 肉桂五分 甘草 白朮五分 川芎 當歸 白芍各一錢

湯後擦此藥有奇功○中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆各一錢 蒼朮五分 肉桂五分 甘草 白朮五分 川芎 當歸 白芍各一錢

發頤圖



麥門冬五分 水二鍾姜三片棗二枚煎八分加酒一杯食遠服
 不消欲瀉服正樓參者霍桂草尤為神效麥門冬
 理中湯見瀉病門 真若妙貼散見腫瘍門 升陽散火湯見腫瘍門

發於頤鎖之間

發於頤鎖之間屬足陽明胃經初起身發寒熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李夜痛倍增由傷寒發汗未盡或疹形未透蘊積而成初起宜刺防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必潰膿宜服託裏透膿湯潰後按癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼剋伐之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣喘湯水難咽者送

時毒圖



時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感四時不正氣治分壯弱疎解痊此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠疼或兼咽痛一二日間發於項間腫頤作腫無頭漸漸放亦疼痛或似結核有根漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後之頭毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實治法須宜疎解不可驟用寒涼致毒不外發而內攻咽喉者險矣初服荊防敗毒散汗之其腫不消者宜服連翹敗毒飲腫仍不消膿勢將成壯者宜服透膿散弱者宜服託裏透膿湯外敷二味拔毒散膿熟

鉞之潰按癰疽潰瘍門治法

荊防敗毒散見頭部 腦疽 連翹消毒散見背部 酒毒發 透膿散見腫瘍門 託裏透膿湯見頭部 侵腦疽 二味拔毒散見腫瘍門

眉疽圖



鳳眉疽 鳳眉疽生而眉稜形長如瓜漫腫紅勝脫小腸肝膽熱煩悶嘔逆不食山此疽亦名眉發生於眉稜無論左右俱屬足太陽膀胱手太陽小腸足厥陰肝足少陽膽四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合腫堅硬色赤按之有根六日內刺之得膿則吉無膿則險甚則十四日不潰煩

悶嘔逆不食者

仙方活命飲見腫瘍門 託裏透膿湯見頭部 侵腦疽

眉心疽圖



眉心疽 眉心疽生在印堂硬腫為疽浮腫癢皆經風熱氣凝滯根堅木痛當行防此證生於兩眉中間疽名曰印堂疽毒初起色暗根平腫硬痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆癰名曰面風毒癰毒初起色赤浮腫癢痛易治七日潰膿若色黑木痛麻痺太過根硬如鐵釘之狀寒熱並作即眉心