

卷
四

傅氏眼科審視瑤函卷之四

御集目錄

實熱生瘡症

加味四物湯

芎歸湯

搭藥二方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風清脾飲

脾生痰核症

防風散結湯

清胃湯

疳症

羚羊角飲子

平肝清火湯

火疔症

洗心散

土疔症

清脾散

敷藥方

金疔症

瀉肺湯

水疔症

蠲毒飲

大背漏症

燥濕湯

五花丸

小背漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小牛黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

緊皮膏

五灰膏

起睫膏

夾眼法

又急緊小症

神効黃芪湯

聚垣撥雲湯

增翻粘臉症

排風散

龍膽丸

脾輪振跳症

當歸活血飲

脾虛如毬症

調皮清毒飲

兼胎症

保胎清火湯

簡易知母飲

天門冬飲子
消風散

芎蘇散
天冬飲子

爲產症

熟地黃湯

四物補肝湯

四製香附丸

濁害清和症

穀精草湯

退翳散

望月丸

陳風湯

通竅散

胎元丸
清解散

補元散

加味地黃丸

退雲散

固本丸

附治小兒癰疹疔傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消毒化癰湯

九味蘆薈丸

生熟地黃丸

鷄肝散

龍膽蘆薈丸

消疳散

天麻丸

寶鑑灸雀目疳眼法

升麻乾葛湯

摩前子散

養肝丸

輻輳轉關症

釣藤飲子

雙目睛逼症

牛黃丸

附小兒目閉不開瞋目直視目仰視目睛瞤動目劓諸症
驗方

人參湯

生地黃散

瀉清丸

和太師牛黃丸

碧霞丹

九龍控涎散

四味肥兒丸

柴胡清肝飲

傅氏眼科審視瑤函卷之四目錄終

傅氏眼科審視瑤函卷之四

株陵傅仁宇允科纂輯

廣陵林長生聲震較補

甥張秀徵珩訂正

大梁周靖公亮節較梓

運氣原證

增張文凱廷獻泰閱

男傅維藩國棟編集

公猷 掄 全次

體仁 顓

按內經運氣曰眚瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三之氣

大火行寒氣時至民病目赤眚瘍治以寒劑是也二曰燥經

云氣金太過民病目赤眚瘍又云陽明司天燥淫所勝民病

目眚眚瘍治以溫劑是也

目瘍

內經曰諸瘍瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有斯疾蓋

心主平血血熱生風鬱內甚遞相傳襲故火能生土血

注陽明主肌肉風熱與血熱相搏發見皮膚其各不一

有黃濃而自者土生金母歸子也始生微癢而熱輕腫

痛爛為熱極血凝炙水氣滯成膿甚至寒熱作而飲食
減尤為慮宜宜泄風毒涼心經解胃熱按目瘡疣皆因
君火司令燥火熱邪所致
宜溫宜冷隨症施治可也

實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有經汨如湯樣注澀急曰蓋明脾或弦多
潰胞中椒栗成瘡生於背上心火熾盈盈臉外脾家燥唇邊方
土形肺腦形於鼻週身旺六經耳邊尤腎燥滿面六陽莖三焦
炎頂上下部六陰乘先治應須變援睛目次明

此症謂目病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則有推積高
厚紫血濃爛而腥臭者乃血氣不和火實之邪血分之熱尤
重如瘀滯之症膏混水濁每每流於脾背成瘡瘡血散而瘡
自除勤勞濕熱之人每患脾背成瘡別無腫痛症者亦輕而
無妨若火盛瘡生惟重帶腫痛者又當急治恐濁氣沿於目

而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他症凡見瘡生
富驗部分以別內之何源而來因其輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

天花粉

連翹

赤芍藥

防風

當歸

荆芥穗各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎

當歸

赤芍藥

防風

羌活

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓頻洗則血活風亦去矣

搭藥方

治眼皮外滿臉生瘡潰爛痛疼

血竭

乳香

沒藥

輕粉

佗僧各等

右研爲細末厭之瘡處

又方

治眼胞上下或臉生瘡破流血水陰開者

青黛

一錢二分

黃柏末

潮腦

輕粉

各一錢

松香

半錢

右爲細末用舊青布捲藥在內麻油濕透燒取灰油灰滴於茶鍾內蒸搽

椒瘡症

血滯脾家火胞上起熱瘡泪多並赤腫沙搽最難當或疼兼又癢甚不便開張可惡愚頑者全憑出血良目睛惟仗血血損目無光輕時頂善逐重開過則傷脾間紅癰癰風熱是椒瘡

此症生於脾內紅而堅者是有則沙搽難開多泪而痛久皆稱粟瘡悞矣夫粟瘡亦生在脾但色黃軟而易散此是堅而難散者俗皆以龍鬚燈心等物出血取効殊不知目以血爲

血損而光華有衰弱之患輕者只宜善治至於癰瘰連片
跣路高低不平及血瘀滯者不得已而導之中病即止不可
大過過則血損恐傷真水時養神膏大概用平熨之法退而
復來乃內有淤滯方可量病漸導若初治不可輕為開導過
治恐有損也不如謹始為妙宜服

歸芍紅花散

治服胞腫硬
內生疾瘡

當歸

大黃

梔子仁

黃芩

紅花

以土俱酒
洗漱炒

甘草

白芷

赤芍藥

防風

生地黄

連翹

各等分

右為細末每服三錢食遠白水煎服

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲粟瘡胞內起粒粒似金珠似膿膿不

出沙搽痛無時脾急開張澀瀆防病變之病來如軟急散亦不多時

此症生於兩脾之內細顆黃而軟者是今人皆稱椒瘡爲粟瘡者悞矣大椒瘡紅而堅有則硬睛沙澀不便未至於急若粟瘡一見目疼頭痛者必有變症粟瘡是濕熱鬱於上分極重但椒瘡以風熱爲重二症雖皆生於脾內屬於血分椒瘡紅堅易散粟瘡黃軟不易散故治於不同豈可概論哉宜服除風清脾飲

廣陳皮

連翹

防風

知母

黃芩

玄明粉

玄參

黃連

大黃

桔梗

荆芥穗

生地

各等分

右剉劑白水二鍾煎八分去滓食遠服

目疳

此症或眼皮上下生出一小核是也乃脾胃痰氣所聚

而愈若堅白不破久則如歪如拳而成瘤矣若初起小核時即先用細艾如粟米壯放患上令患目者臥榻紫明目隔蒜片灸三四壯外將一膏藥貼之用紫背天葵子連葉二兩煮酒醉一壺半皂角子二三粒炮熱研細

飲酒時樓

脾生痰核症

若問脾生痰核痰火結滯所成脾如覺腫如豆脾內堅實有形
或有不治自愈或有壅結為癭甚則流膿出血治之各不同名
此火土之燥母向外求情若能知却治頃刻便清平

此症乃脾內皮外生顆如豆堅而不疼火重於痰者其色紅
紫乃痰因火滯而結此生於上脾者多屢有不治自愈有恣
辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變為癭漏重疾者治亦不同
若初起知却治之法則刻頃而平復矣宜服

防風散結湯

玄參

一錢 前胡

赤芍藥

黃芩

桔梗

防風

蒼米朮

土貝母

白芷

陳皮

天花粉

各八分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後熱服

清胃湯

治眼胞紅硬此陽明經積熱平皆飲酒過多而好食辛辣炙煇之味所致也

山梔仁

炒黑 枳殼

蘇子

各六分 石膏

煨 陳皮

川黃連

炒

連翹

歸尾

黃芩

荆芥穗

防風

各八分

甘草

生三

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓熱服

木疳症

木疳上有九風輪碧綠青監似豆形如是昏沉應不痛若然泪

白多疼莫教變症侵眸子不散瞳神便破睛

此症生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二症虛者大而昏花實者小而痛澀非此蟹睛因破而出乃自然生出者大小不一亦隨其症或變尖長也宜服

羚羊角飲子

羚羊角

銚細末

細辛

大黃

知母

五味子

芒硝

各一兩

防風

二兩

右剉劑以上六味各一錢防風二錢白水二鍾煎至八分去滓食遠服為末每服五錢煎服亦可

平肝清火湯

治黑睛脹大虛者服

車前子

連翹

各一錢

枸杞子

柴胡

夏枯草

生地黃

白芍

當歸

各半錢

右爲一劑白水三鍾煎至八分去滓溫服

火疳症

火疳生如紅豆形熱毒應知患不輕兩眦目家猶可緩氣輪犯
尅急難停重則破淚成血滿輕時亦有十分疼清涼調治無疑
感免致終身目不明

此症生於脾腎氣輪也在氣輪爲害尤急蓋火之實邪今在
金部火尅金鬼賊相侵故害最急初起如粟瘡樞子一顆小
而圓或帶橫長而圓狀如豆次後漸大痛者多不痛者少不
可誤認爲輪上一顆如赤豆症因瘀積在外易消之比此則
從內而生也宜服

洗心散

大黃

赤芍藥

桔梗

玄參

黃連