

04084



1940



瘍科捷徑一書 先伯父靜山公著刻於
道光二十五年讀其書者咸不脛而走咸
同間原板燬於兵燹邇年求其書者日益
衆家兄嵇香能世其業爰與余重謀付梓
細加校訂閱一年而成並將家兄手輯瘍
瘍全圖四幅纂入是書悉遵

御製醫宗金鑑並東海陳氏諸書採輯成歌最
為精當故字句之間不嫌鄙俚有心醫理
者能朝夕研究熟復於心則於瘍科一道
思過半矣苟貪多務得雖日泛覽載籍無
益也質之高明諒不以余言為河漢云
光緒乙酉端月中浣姪時鳳標謹跋

醫科捷徑卷下目錄

發無定處

疔瘡

流注

癰瘤

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

赤白癩風

丹毒

粟瘡

枯筋箭

疥瘡

癬

黃水瘡

翻花瘡

血風瘡

瘡瘍

天炮瘡

爛皮風

漆瘡

血箭

血痣

雜症

跌撲

金瘡

鍊鉞悞入咽喉

悞吞銅錢

骨哽咽喉

杖瘡

破傷風

發瘻

湯火瘡

凍瘡

人咬傷

馬咬傷

瘋犬傷

蛇咬

蜈蚣咬

蝎蟹

虹蚓傷

百蟲入耳

小兒雜症

赤遊丹

鴟口瘡

胎癩

胎癩

葡萄痰

臍風

脣突

陰腫

小兒脫肛

肛門作癢

遺毒

痘裡夾癰

痘疔

捲簾疔

火珠疔

忘汲疔

拳虎疔

燕窩疔

注命疔

透腸疔

驪龍疔

痘毒

痘裏疔毒

痘爛

痘風瘡

河鮀毒

補遺

砒毒

落卜頰

自刎斷喉

虛實緩急治法辨治驗二則

暑瘍非瘍辨

疔瘍治法

今古不同辨

獸骨硬用狗倒掛取涎一如前法令骨自化

噴痛腫爛柳青散吹之 見口破

杖瘡

杖瘡須要看其形輕重還須細認明拈痛清涼膏破用能消腫痛肉肌生血瘀未破須當砭湯劑還宜用大成再上玉紅膏去腐擦之新肉自然生

清涼拈痛湯

清涼拈痛用金黃樟腦三錢是妙方同細研之磁罐貯臨敷須用石灰湯

如意散 壱兩 樟冰 叁錢 和勻又用石灰三四觔以水

卷一
化開水高石灰三四指露一宿將石灰面浮起油水
結爲雲片者輕輕帶水起入碗內有水一鐘對入香
油一鐘竹快攪百轉調勻成膏入前藥稀稠得所不
用湯洗徧敷患處一日一換葱湯洗净

大成湯 見跌撲 玉紅膏 見腫瘍

破傷風

皮肉損破外傷風初覺牙關緊不鬆甚則角弓反張狀
吐涎抽搐不時攻

玉真散

玉真散內用南星白芷防風羌活靈白附天麻相並用

破傷風症服之馨

南星 白芷 防風 差活 白附子 天麻
各等分爲末每服貳錢熟酒一杯調送更敷傷處最妙

鎮風散

鎮風散用焙鱠膠杭粉硃砂礬末調每服二錢和熟酒
破傷風症最逍遙

鱠膠 壓兩 杭粉 壓兩 皂礬 壓兩 硃砂 壓錢

其爲細末每服二錢酒下

發癰

潰瘍發癰復傷風有汗爲輕無汗凶膿血出多成此患
祛邪扶正建奇功

十全大補湯 加鈎藤天麻等

湯火傷

火燒湯潰爛皮疼起炮宜挑使毒輕四順清涼能去熱
若然煩燥毒攻傾

鷺粟膏

鷺粟膏療湯火燒香油鷺粟共煎熬白占相共真輕粉
患上搽塗痛自消

鷺粟花十五朵無花以殼代之香油四兩將鷺粟煎

枯瀝去渣入白蠟三錢溶化傾入碗內待將凝之時
下輕粉二錢攬勻燉水中令冷取出臨用時抿脚排
膏手心中搽化搽於患處綿紙蓋之日換二次其痛
自止

清涼湯 見杖瘡 黃連膏 見白屑風

四順清涼飲 見痄癧

凍瘡

凍瘡一症是寒凝肌肉頑彊癢痛渾涼水揉和覺熱散
勿宜烘火勿宜溫

獨勝膏

獨勝膏來最散寒凍風凍耳一般看每當六月逢三六
蒜搗搽之卽自安

六月初六十六二十六用獨蒜搗膏日中晒熟在於
患處搽之忌用湯洗一日三次

神仙碧玉膏潰爛者用

神仙碧玉用樟冰乳沒輕占杭粉珍更入脂油熬好貯
凍瘡潰爛效堪神

輕粉壹兩杭粉貳兩白占五錢乳香叁錢沒藥叁錢

樟冰貳錢

用公猪淨油五兩同白占熬化傾入碗內入上藥和

勻隔水燉溫調搽油紙蓋之

人齒傷

人齒原來牙毒傷異常腫痛臭難當須宜童便頻頻洗外貼蟾酥膏蓋良

初用熱童便次貼蟾酥餅外用清涼膏蓋之後搽玉紅膏生肌長肉而愈

蟾酥丸 見額疔 清涼膏 玉紅膏 見腫瘍

馬齒傷

馬齒傷時何藥醫肉肌損破血淋漓急宜生栗來搗爛內服馬齒莧合宜

此傷用生栗嚼爛敷於患處毒氣入裏煩悶噁心者

馬齒莧煎湯多飲爲妙

瘋犬傷

瘋犬傷來最不輕頻頻童便洗之平頂心紅髮當宣去
急服扶危散自輕

治法歌

瘋犬傷 毒更深洗宜童便又宜針初時卽服扶危散
碧玉頻投效可欽

扶危散

扶危散內用蟹螯滑石雄黃原麝投細末更須溫酒下

搜除惡血病能瘳

蟹螯

按日數一日一枚去翅足糯米同炒去米用

滑石

壹兩水飛雄黃壹錢麝香貳分

共研細末溫酒調下

琥珀碧玉散 毒歸小便淋塞者用之

碧玉散中琥珀君滑甘青黛共相珍同研爲末燈心引
每服三錢效若神

滑石

六兩甘草壹兩琥珀五錢

青黛八分

共研極細每服三錢燈心湯下

初咬時急於傷處刺去毒血卽將豆豉研末香油調