

肩部 手部 腋部 乳部 胸部 心部 肺部
各種氣痛 咳嗽 勞傷吐血 哮喘 脾
飲食積滯 噎膈 肚腹 痞積 虫疾
腰部 背部 三消

人本大驗方新編

上海啟新書局
印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

眼部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃 嘔吐 附

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

痲症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十二

急救

凡吊頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷 湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癱瘓

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽

又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡

十指節斷壞惟有筋連

蟲出長數尺遍身緣毛

虎口並各手指縫生瘡

或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣服痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鐵

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

驚掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部

肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疣瘡

音隔答

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上濕瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口

乳岩

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人乳忽縮入

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

無子食乳腫痛難消

胸部

胸隔閉結不通

胸滿腹脹

胸前生乳

胸旁生瘡

龜胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

驗方新編卷二

肩部

擔肩癰癤

此惟擔夫有之

五倍子

燒存性

為細末加黃丹

用水飛過

醋調敷之甚效

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癰蝦蟆一

個

目赤腹無八字文者忌用

破去腸雜

不可破胆指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並將蝦蟆心

肝焙枯研末沖酒服以免毒氣攻心約一對時破口出膿而愈套住之後瘡

頭猶如針刺痛更難忍甚至心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急

服護心散

見癰毒方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心自安定蝦蟆能拔極重惡毒切

不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘誤將蝦蟆揭去別藥難醫

為害不小去膿後如發昏暈亦不必驚慌用高麗參三四錢以砂礮煮濃汁

服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃厚易

見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若再腫痛此毒氣未盡之

故再用蝦蟆套上少頃膿盡即不再發此瘡最為陰惡此方極屬神效不可

輕視○又方 鳳仙花用下半截連根不用水洗和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡腫大

如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦蟆方尤為神速○又方 用

磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛拔毒治之見癰毒諸疾疔瘡門止痛消腫最為神

效○又方 蜈蚣焙枯為末豬膽調搽神效○又方 雞蛋一個穿一小孔入信

石分套指頭上熱則再換立刻止痛如神真仙方也較前各方功效更大○

又方 雄黃 枯礬 各等分研末用麻油或醋敷亦極效驗○又方 白

蘿蔔挖孔入雄黃三分蒸半熟套指頭或用真烏梅仁嚼爛敷之均極效驗

又方 如色白者照後脫骨疽陽和湯各方治之又方雞子清磨雄黃敷之又方陳柿餅雄黃搗敷

脫骨疽 此症生手足各指或云生手足第四指者是或生指頭或生指節指縫初生或白

色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅棗黑色不退久則潰爛節節

脫落延至手足背腐爛黑陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜

用 頂大甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不可間斷忌

食發物不出十日必愈真神方也再用 金銀花 元參各三兩當歸二兩甘草

兩一水煎服一連十劑永無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要○

兩一水煎服一連十劑永無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要○

又方 大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸均見陰方蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之方也○又方 甘草嚼融厚敷

乾則隨換日夜不斷數日必愈神效

甲疽又名瘰癧 凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒兩黃芪二兩

醋浸一宿入猪油兩五微火煎取二兩絞去渣退火氣敷之日換三次神效此

林屋山人方也○又方 乳香 膽礬 研細時時敷之此病須剔去甲不

藥亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效○又方 皂礬五錢火煨候冷研末先以鹽湯

洗瘡拭乾以礬末敷之舊紬裏定一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微

覺疼痛○又方 陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲

外用蛇退燒灰雄黃錢一為末乾摻或香油調敷○又方 輕粉 乳香 沒

藥各一錢 黃丹二錢 赤石脂五錢 寒水石三錢 共為末濕則乾摻乾則油調最妙○

又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效○又方 見頭部頭角太

陽生瘡方

灌甲初起 用磁鋒於甲上削去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲 每日取鳳仙花又名指甲花連根蒂葉搗敷指甲上用布包好一日一

換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃共搗擦之若延遲不治必生蛇頭

蛙節等疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

指頭畏冷

天氣不寒指共作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有鹽者煮去鹽味用

切兩段醋磨雞毛蘸搽二十日後

漸消

指節生瘡

名曰蛀節生黃豆嚼融敷

須先漱口再嚼

即愈

指甲下生瘡

名曰蛀甲治與上蛀節同

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用 赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早治即爛入手

大指二指間為虎口又名

又指

生蒲公英槌融敷之數日即愈○又方

生黃豆嚼融敷

將口漱淨再嚼甚效

又方

通草為末用雞蛋清調敷其腫即消○又方

白芨

研三錢

蟾酥錢一共

和雞蛋清搽神效○又方 白芷 滑石 黃丹各等分研極細末敷之神

效

手了枝痛不可忍 通草研末生雞蛋白調敷即愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛 雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並

忌沾水數日自好倘一經抓擦則纏綿難愈用 白芷 黃丹 滑石各等

分研極細末敷之神效或用玉真散

見跌打損傷門

敷之亦極效

手指斷落 方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷 方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有蟲 猪肝切片和桃葉搗

融敷之神效或用白油膏

見腿

貼之更妙

手指手掌皮厚如鐵 苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止 用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛 此名穿掌又曰擎疽又曰托

盤用生附子切片貼之或用生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作

痛作癢切不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉一分貼之必

愈○又方 白鹽 花椒 末等分醋和敷之未破者極效已破者勿用○又

方 溲雞糞敷之或用鮮桑葉搗敷均極效如腫而不甚紅又不甚痛者照

卷十一陰疽各方治之為要

驚掌風 生手掌上紫白斑點疊起白皮堅硬乾燥甚則疊疊脫皮血肉外露

或癢或痛久則成癰難愈用一大碗以紙緊糊碗口紙上用針刺破多孔上鋪細米糠

二三十寸厚手錫燃炭放糠上緩緩燒之燒至離紙三分光景將炭與糠一并

棄去紙不可將碗穿取碗中糠油時時搽之數日斷根屢試神效有人患此筋肉現

露十餘年不愈照此醫痊永不復發○又方 真小磨麻油一兩紅砒一錢敲細

入油煎至砒枯烟盡為度去砒留油冷透火氣用火烘油擦三五次十日即

愈血寒者最宜此林屋山人極驗方也○又方 鉛彈子二個如核桃大每日在手

內搓熱將鉛彈子握緊晝夜不歇如此十餘日即愈愈後再搓一二月則不

復發

手腕生物如豆紅紫疼痛 治法見卷十一癰毒門葡萄瘡內

手臂生瘡腫大如拳 以小刀畧破其皮或用癰毒門代刀散敷之即破 真礪砂 上

冰片各一分輕粉五釐為末摻之即化為水而愈矣

熱毒攻手腫痛欲脫 猪油和羊糞塗之或水煮馬糞洗之

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解 黃蘆 酒浸一夜焙乾研末每服

二錢酒調服頗效

手足作痛 手足痛人以為脾經之熱不知非脾也乃肝木之鬱結也散其鬱

氣則手足之痛自去用逍遙散

見內外備用諸方

加梔子

錢三

製半夏

白芥子

錢各二

水煎服二劑其痛若失蓋肝木作祟則脾不敢當其鋒氣散於四肢結而不伸所以作痛今一旦平其肝氣而脾氣自舒脾舒而痛在手足有不盡除者乎

手足生瘡久不收口 取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火煨化研

細末加水片少許摻之即愈或照癰毒門瘡不收口諸方治之

小兒手軟

薏仁

當歸

秦艽

酸棗仁

防風

羌活

錢各五

共為末蜜丸

芡實大荆芥湯化下

新增不二散

采驗方拔萃

治手足患毒橫紋區處並蛇頭眼腹等症拔毒去腐如

神幸勿泛視

杜蜈蚣

八錢

雄精

錢四

上藥兩味共研細末臨用看症輕重

酌量同雄豬膽汁調和敷患上或生指頭將藥入豬膽套在指上如乾加膽

汁不二散立刻止痛套三四次即潰潰後摻前藥膏蓋即拔膿去腐再上生

肌桃花八寶散收功忌開刀開即翻花綿延難愈多即痛苦異常萬勿用生

降拔提之藥倘誤用致橫肉弔空腫脹實難收口此豎治失宜反增痛苦耳
慎之慎之初起用飛龍奪命丹一二服汗之汗之未愈內宜服仙方活命飲
外用不二散此余應手治法也

新增誤斷指頭 用降香細末摻之包以絲棉七日即痊不可落水冒風親試

有驗採驗方
拔萃

腋部肩下
即是

腋下腫硬形如鴨蛋 色紅者照癰毒各方治之皮色不變者照陰疽各方治
之

腋下疙瘩音隔
答

如豆如米或麻或痛恐是疔瘡查疔瘡門辨別治之

腋下癭瘤 治法見癭瘤門

腋下狐臭 用蒸餅一個劈作兩片放蜜陀僧細末一二錢急夾在腋下略睡

片時候冷棄去如係一腋狐臭只用一片夾之有人患此二十餘年照治斷

根屢試不爽○又方 頂大蜘蛛一個或用小蜘蛛
兩個亦可黃泥包好火內燒紅取

出候冷去泥加輕粉一錢共研末日搽數次輕者二日即愈重則三四日必

斷根較前方尤簡便神驗百發百中○又方 蜜陀僧 潮腦各四
兩 枯白礬

兩輕粉

錢三

右為細末頻擦兩腋擦至半月見效不可間斷半年全愈○又方

麝香

分一

膽礬

分二

水粉

分三

取田螺

個二

將壓

掩音

起開

以各藥入螺中過一夜螺肉

即化為水將水擦腋下其臭從大便出宜埋土內恐人聞則頭眩暈也此方

極效不可輕視

乳部

乳頭破裂

胭脂和蛤粉用水調敷○又方

雞屎白炒研每服

錢一酒送下即愈

乳上濕瘡

研又方

末

燈

油

調服

男女乳上濕瘡膿血淋漓成片痛痒不休此名火

草瘡用蜂殼

煨五錢

輕粉

分五

水片

分一

共研末用銀花煎湯調搽兩三次結痂收

功或照癰毒門濕瘡黃水瘡各方治之

乳頭生瘡痛不可忍

生鹿角

分三

生甘草

分一

共研末用雞蛋黃

個一

入藥攪勻置

銅器中炙溫敷之日二次即愈神驗非常

乳癰

紅腫疼痛者是

男女皆有此症

炒白芷

製乳香

製沒藥

製法見藥

浙貝

歸身

各等分研末每服五錢酒送一服全消如已潰爛用醒消丸酒送一服以止

其痛外貼洞天膏自愈如色白者照流注治法倘潰爛不堪者以洞天救苦

丹按法與服七日後接服大棗丸收功此林屋山人秘法也醒消諸方見癰