

沈阳市郊区蔬菜品种志

沈阳市科学技术委员会
沈阳市农业生产委员会

印

目 录

一、茄 果 类

茄 子	1		
柳条青	2		紫圆茄
卵茄子	3		安阳茄
紫线茄	4		白圆茄
灯 泡	5		
辣 椒	9		
朝天猴	10		世界冠军
吉林柿子椒	11		尖 椒
三道筋	12		
蕃 茄	15		
小 桃	16		粉 红
牛 奶	17		蘋果青
火 红	18		黄珍珠
大 桃	19		桔黄佳橙

二、瓜 类

黄 瓜	25		
叶 三	26		宁阳刺瓜
小八杈	27		一窝猴
大八杈	28		小密刺
接架瓜	29		
南 瓜	33		
一窝猴	34		青 皮
蔓角瓜	35		磨 盘
白 皮	36		方 瓜
甘 栗	37		白玉瓜
冬 瓜	42		
架冬瓜	43		地冬瓜
菜 瓜	45		
大菜瓜	45		
瓠 子	46		

三、豆 类

菜 豆	47		
早熟黄皮	48	大白皮	51
矮生大青皮	49	滚 豆	52
青皮紫筋	50		
豇 豆			53
挑 豆	54	红籽豇豆	56
十八粒	55		
扁 豆			57
紫花扁豆	57		

四、根 莖 类

蘿 卜	59		
赤峰水萝卜	60	大红袍	64
圈河水萝卜	61	翘头青	65
小五纓	62	白大根	66
灯笼红	63	石家庄白萝卜	67
胡蘿卜			68
小顶金红	69	地八寸	70
大头菜			71
二道眉	72	花叶玉根	73
馬鈴薯			74
男 爵	75		
山 药			76
本山药	76		
牛 蒡			77
菊 芋			78
莴苣笋			79
圆叶莴苣	79		

五、白菜、甘蘭类

大白菜	81		
二青帮	82	大娃娃	86
唐山快菜	83	跃进一号	87
白麻叶	84	大青帮	88
青帮河头	85		
甘 兰			89
金早生	90	丹麦早生	91

荷兰早生.....	92	继 承.....	94
牛 心.....	93	斑大古.....	95
球茎甘兰.....			96
大平头.....	95		
花椰菜.....			97
80 天.....	97		

六、葱 蒜 类

大 葱.....			93
大白皮.....	100	八叶齐.....	102
仙鹤腿.....	101	对 白.....	103
韭 菜.....			104
三 楞.....	105	薤 韭.....	107
马蔺宽.....	106	烫发韭菜.....	108
大 蒜.....			109
白皮蒜.....	110	紫皮蒜.....	111
洋 葱.....			112
荸荠扁.....	113	红 皮.....	114

七、綠 叶 菜 类

菠 菜.....			115
双城菠菜.....	116	唐山大叶.....	118
快菠菜.....	117	诺贝尔.....	119
油 菜.....			120
青 帮.....	121	白 帮.....	122
芹 菜.....			123
空 腔.....	124	实 心.....	125
雪里蕻.....			126
小八杈.....	126		
茴 香.....			127
大茴香.....	127		
茼蒿.....			128
茴 香 菜.....			129
大 叶.....	129		

茄 子

学 名: *Solanum melongena* L.

茄子为本市夏季主要蔬菜之一，种植面积在夏季果菜类中居首位。目前郊区栽培的茄子都属中晚熟品种，但在市郊一部分老菜队也有栽培灯泡茄等早熟品种。


在1937年以前，本市栽培的茄子品种绝大部分都是柳条青，以及少量的紫圆茄，据老农反映当时的柳条青顶端尖，似鹰嘴状，故又称鹰嘴柳条青，目前栽培的柳条青顶端渐有变粗的现象。1950年以来，紫圆类型的品种才逐渐增多。

当前郊区栽培最多的是市郊地方品种柳条青，约占茄子栽培面积的60%左右，其次为卵茄和紫圆茄等。

本市栽培的茄子品种共有七个，依其果形分为长茄和圆茄二大类型。

一、长茄：有柳条青，紫线茄，卵茄；

二、圆茄：有灯泡茄，安阳紫茄，紫圆茄，白圆茄。



品种名称：柳条青（别名：青茄子）。


栽培历史：地方品种，已栽培60—70年。

分布地区：郊区各地普遍栽培。

特 征：株高90—100厘米，株幅50—60厘米，节间较长，茎及叶脉绿色。第一花蕾着生在第7—9节，果实浅绿色，棒状，顶端尖或略钝，叶主脉、果梗及萼片上具刚硬的刺毛，果实长20—25厘米，最长者可达35厘米，横径4—6厘米，单果重4—5两。单株产量2.5—3.0斤。

特 性：生长势较强，较直立，中熟种。抗病力中等，果实含水份少，但种子较多，品质中。

栽培简要：2月下旬温室或冷床播种，移植1—2次，五月中旬定植。壟作，行距55—60厘米，株距45—50厘米。6月下旬开始采收，亩产7,000—8,000斤。



品种名称：卵茄子（又名懶茄子）


栽培历史：地方品种，栽培约15年。

分布地区：郊区南部普遍栽培此品种。

特 征：株高70—80厘米，株幅50—70厘米，茎及叶脉紫色，叶片上被茸毛。果实长卵形，顶端钝尖，紫红色或紫色，长18—25厘米，平均约20厘米，横径7—9厘米，平均约7.5厘米，单果重5—7两。单株产量2.5—3.0斤。

特 性：生长势强。开张性。耐瘠薄，前期生长较慢，后期生长较快，喜高温。晚熟种。抗绵腐病、褐纹病，及黄萎病强。果实含水少，味甘，表皮不易老化，品质佳。

栽培简要：2月下旬—3月上旬冷床或温室播种，移植1—2次，5月中旬定植，壟作，行距60厘米，株距60—66厘米。生育期中一般不打叶。7月上旬开始收获，亩产6,000—7,000斤。



品种名称：紫线茄（别名紫长茄、羊角茄）


栽培历史：来源不详，栽培30余年。

分布地区：郊区各地均有栽培。

特 征：株高105厘米，茎纤细，节间长，茎、叶柄及叶脉紫色。第一花蕾着生于第8—9节。果实棒状顶端尖、紫黑色，有光泽。长20厘米，横茎4.0—4.5厘米，单果重3—4两，单株产量2.5斤。

特 性：生长势中、中晚熟种，抗病力中，皮薄，品质中。

栽培简要：3月上旬育苗、移植1次，五月中旬定植，苗期60—70天。行距55—60厘米，株距50厘米。7月上旬开始采收，至10月上旬为止。亩产5,000—6,000斤。



品种名称：灯泡（别名电灯泡）


栽培历史：引自安东，已栽培14—15年。

分布地区：郊区西南部有少量栽培。

特 征：株高70—80厘米，株幅70厘米，茎及叶脉紫黑色，有光泽，叶片浓绿色，在叶脉附近稍呈紫色。第一花蕾着生于第5—6节，果实为倒卵形，紫黑色，有光泽，长12厘米，横径6—8厘米，一般为7厘米，单果重3两。单株产量1.5—2.0斤。

特 性：生长势中，开张性较强，早熟种，抗病力中等。果实含水份大，质紧密，品质中。

栽培简要：2月上中旬温室育苗，移植2次，五月上旬定植，苗期80—90天。行距50—60厘米，株距40—45厘米。6月上旬开始采收，亩产4,500—5,500斤。



品种名称：紫圆茄


栽培历史：地方品种已栽培三十余年。

分布地区：近郊老菜田均有栽培。

特 征：株高80—90厘米，节间较短，茎及叶脉紫色，第一花蕾发生于第7节，果梗短而粗，果实稍呈扁圆形，紫色，长11厘米，横径12厘米，单果重5—6两，单株产量2.5—3.0斤。

特 性：生长势中，中早熟种。对褐纹病抵抗力较弱。开展性较强。因节间短，第一果易触地。果实质地紧密。

栽培简要：2月上中旬温室播种，移植2次，5月上旬定植，苗期80—90天。畦作，行距50—55厘米，株距40—45厘米。6月中下旬开始采收，至9月上旬止，亩产6,000—7,000斤。



品种名称：安阳茄子


栽培历史：来源安阳，栽培四年。

分布地区：五三社南塔大队栽培较多。

特 征：株高70厘米，株幅60厘米，茎和叶脉为紫色，果实长度12厘米，横径8厘米，椭圆形，果皮紫红色，有光泽，单果重量5—6两。

特 性：生长势较强，中熟种，对红蜘蛛的抵抗力较弱，耐肥但不耐湿。座果率高。果实含水份较多，品质较差。

栽培简要：3月上、中旬在温室或温床育苗，5月上旬定植，壟作或畦作，株距45厘米，行距60厘米，7月上旬开始收获至9月上旬止，亩产量6,000—7,000市斤。



品种名称：白圆茄

栽培历史：来源不详，栽培7—8年。

分布地区：郊区东部和西部有少量栽培。

特 征：株高68厘米，株幅70厘米。叶片较大，卵圆形，绿色。果实纵径10厘米，横径9厘米，卵圆形，绿白色。单果重5—7两，单株产量2.5—3.0斤。

特 性：植株较矮，开张度大。耐瘠。果实含水份少。

栽培简要：同紫圆茄。

辣 椒

学 名: *Capsicum annuum* L.

辣椒在本市栽培甚广，栽培面积比茄子稍小，也是夏季主要蔬菜种类之一。


郊区栽培的辣椒以吉林柿子椒和三道筋为主要品种，56年以来引入的世界甜椒品种，甚为市民喜爱，但因其晚熟故至今栽培面积尚不甚广。

当前本市栽培的辣椒品种共有五个，隶属于甜椒，半辛辣椒，辛辣椒三个类型。

一、甜椒类型：果大肉厚，极少辣味，产量较高，主要有世界甜，三道筋 2 个品种；

二、半辛辣椒类型：果扁圆，肉稍薄，带辣味，主要有柿子椒，朝天猴二个品种；

三、辛辣椒类型：果细长，肉薄，辣味强，适于干制用。主要有尖椒，1 个品种。



品种名称：朝天猴


栽培历史：地方品种，栽培10余年。

分布地区：近郊东部沈抚公路附近菜田有少量栽培。

特 征：植株较矮，高约40—50厘米。株幅亦较小，约30—40厘米。茎枝较弱，果柄短不向下弯曲，所以果顶向上是其特点。果实纵径5.3—6.2厘米，果肩横径4.8—5.4厘米，呈纯圆锥形，果皮绿色，单果重1.5—2两左右，单株产量1.0—1.2斤。

特 性：生长势较弱，早熟。适宜早熟栽培，抗热和耐湿能力较差。果形小，果肉较薄，辣味中等，品质中。

栽培简要：2月上、中旬播种，移植2次，5月上旬定植，行距50厘米，株距30厘米。每穴两株，壟作或畦作。6月上旬开始收获，至9月上旬止，亩产4,000—5,000斤。



品种名称：吉林柿子椒


栽培历史：引自吉林省吉林市，栽培约40—50年。

分布地区：郊区各地普遍栽培。

特 征：株高55—60厘米，开张度40厘米，茎略细，节间较长。叶片深绿色，纺锤形。果实灯笼形，纵径6.5厘米，横径5.5—6.0厘米。4—5个心室。单果重2.0两左右。

特 性：生长势中，中早熟种。耐热耐湿力及抗病力较弱，味甜辣，供炒食用。

栽培简要：2月下旬—3月上旬温室或冷床播种，移植1—2次。5月中旬定植，壟作，行距55—60厘米，株距21厘米（单株）或35厘米（双株）。6月中、下旬开始采收，亩产5,000—6,000斤。



品种名称：三道筋（别名：甜椒、油椒）


栽培历史：引自吉林，栽培30—40年。

分布地区：郊区普遍栽培。

特征：株高55—60厘米，茎粗，节间较短，叶肥大，叶色浓绿。果实纯圆锥形，皮色浓绿，有光泽，果肉较厚；长9厘米，肩粗6.8厘米，单果重3.5—4两，单株产量1.5斤。

特性：生长势较强，较晚熟，不耐湿，喜肥，味甜，宜生食，品质佳。

栽培简要：3月上旬冷床播种，5月中旬定植。行距55—60厘米，株距36—40厘米。壟作。7月上旬开始收获，亩产5,000—6,000斤。



品种名称：世界冠军

栽培历史：1956年从原兴城园艺试验场引入，栽培7年。

分布地区：郊区各地有少量栽培。

特 征：株高64厘米，株幅50—55厘米，茎粗，叶肥大，叶色浓绿。果实长10厘米，肩宽8厘米，为纯圆锥形，果实浓绿色，果肉厚，单果重4两左右。

特 性：生长势强，晚熟。耐热力强，但不耐湿，喜肥，味甜，宜生食，品质佳。

栽培简要：3月上旬冷床播种，5月中旬定植。行距55—60厘米，株距36—40厘米。壅作，7月上旬开始采收，亩产5,000—6,000斤。