

卷三 虛損 虛煩 中風 附虛心驚悸

婦人 心腹痛 惡露 下痢

雜治

附癥瘕

卷四 補益 月水不通 赤白帶下

月水不調

千金要方

附衍義

寄鴈署



探真備急人千金要方卷三

婦人方中凡八類

虛損第十

論一首二條方二十首

論曰婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於嵩岱何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須缺藥若行缺藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以產後百日以來極須慙懃愛養勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或有微不慎戲笑作病一朝困臥控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不可同於常方耳特忌土廁便利宜室中盆上佳 凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之 凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也 凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候三兩日消息可服澤蘭丸比至滿月丸盡爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也 凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老百方治不能瘥桃

仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內將常服之佳

四順理中圓 產訖可服此方 甘草 人參 白朮 乾薑各一兩 右四味爲末蜜和丸如梧子大服十丸

稍增至二十丸新生藏虛所以養藏氣也

〔衍義〕理中加以四順之銜以太陰手足自溫雖有虛寒祇宜理中溫之非少陰四逆之比產後諸虛必先溫養脾氣脾氣健運則飲食有常氣血無滯何憚瘀垢之不順趨於下哉

桃仁煎 治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方 桃仁一千二百枚搗令細熟以上好酒一斗五升研漉三四遍如作麥粥法以極細爲佳內長項瓷瓶中密塞以麴封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上無令沉沒熟訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可服也

〔衍義〕桃仁雖能逐瘀然隨烏藥莪朮專於破血隨芎歸芍藥則相胥和血若單用一味破之與和惟在多用少用之間兼之以酒爲產後和血聖藥但所稟柔脆坐草無傷無所留滯者不在此例

石斛地黃煎 治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方 石斛 甘草 紫苑各四兩 桃仁半升 桂心二兩 大黃八兩

兩麥門冬二升 茯苓一升 生地黃汁 醇酒各八升 右十味爲末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得

一半次內飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹攪無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不知稍加至二丸 一方用人參三兩

〔衍義〕虛羸短氣而用地黃門冬舉世之通套用桂心大黃近世所未聞須知地黃門冬得桂心則滋而不滯桂心得大黃則宣而遂通鹿角膠醇酒飴糖白蜜等溫養精血之味咸得辛溫敷布之力羣行補劑之中雖有一味大黃祇能行滯斷無泄瀉之理譬如列坐皆端直卽有一匪人亦必隨之而向化矣

地黃羊脂煎

治婦人產後欲令肥白飲食平調方

生地黃汁一斗 生薑汁

白蜜

各五升

羊脂二斤

右四

味先煎地黃令得五升次內羊脂合煎減半內薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取鷄子大一枚投熟酒中服日三

〔衍義〕地黃純陰滋膩能治傷中淋露羊脂性溫益津能固腸胃虛脫蜂蜜解毒和中能除心腹邪氣以產母素稟燥熱故聚潤劑以滋之薑汁辛散專行三味之膩也

地黃酒

治產後百病未產前一月當預釀之產訖服之方

地黃汁一升 好麴

好米

各二升

右三味

先以地黃汁漬麴令發準家法醱之至熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎蒜生冷酢滑豬雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月熱不可合春秋冬並得合服地黃并滓內米中炊合用之一石十石一準此一升爲率先服羊肉當歸湯三劑乃服之佳

〔衍義〕地黃寒滯得麴發之滋養血虛之良法不當以藥例之

羊肉湯

治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛方

肥羊肉

去脂三斤

當歸

姚氏用葱白

桂心

甘草

各一兩

芎藭

三兩

兩子母祕錄

作鼓子母祕錄生薑各四兩乾地黄五兩右八味咬咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮取一升芍藥作葱白

三升去滓分三服不瘥重作翼方有葱白一斤

〔衍義〕金匱當歸生薑羊肉湯爲產後腹中病痛之聖藥即寒疝小腹結痛亦得用之況合四物以調其血

加桂以通其滯用甘草者以緩薑桂之急也緩急得宜攻補兼濟非深入金匱之奧何以及此

猪腎湯 治產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧狀名蓐勞方 猪腎去脂剖一具香豉綿裹白粳米 葱白各一兩右

四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作廣濟方有人參當歸各二兩爲六味

〔衍義〕產後百脉皆虛虛風易感每致虛羸喘乏寒熱如瘧故取葱白香豉湯加猪腎以安其腎粳米以安

其胃并調先後二天卽無虛風亦無妨礙金匱旋覆花湯中用葱白未嘗爲風而設

羊肉黃耆湯 治產後虛乏補益方 羊肉三斤黃耆三兩大棗三十枚茯苓 甘草 當歸 桂心 麥門冬

乾地黄 芍藥各二兩右十味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥煎取二升去滓分三服日三

〔衍義〕前羊肉湯以有腹中絞痛故用薑芎之辛以散之此無腹中絞痛專宜補虛故用黃耆茯苓門冬大

棗滋養營氣可無藉於辛散也

鹿肉湯 治產後虛羸勞損補之方 鹿肉四斤乾地黄 甘草 芎藭 黃耆 芍藥 麥門冬 茯苓各二兩

兩入參 當歸 生薑各一兩半夏一升大棗二十枚右十三味咬咀以水二十五升煮肉取一斗三升去

肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

〔衍義〕鹿肉湯合羊肉黃耆湯以鹿易羊更加人參半夏健運中氣鹿肉填補督腎洵為產後虛羸勞損之神丹專於婦人科者急須著眼

麋骨湯 治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏府冷熱不調方 麋骨一骨 遠志 黃耆 芍藥 乾薑 防

風 茯苓 原朴各三兩 當歸 橘皮 甘草 獨活 芎藭各二兩 桂心 四兩 生薑 四兩 右十五味咬咀以

水三斗煮麋骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

〔衍義〕產後虛羸祇宜溫養一切苦寒切不可犯方中桂心芍藥專和寒熱不調餘皆健脾和營之品惟麋骨一味為堅強筋骨克復勞傷之藥惜乎世鮮知用也

當歸芍藥湯 治產後虛損逆害飲食方 當歸一兩 芍藥 人參 桂心 生薑 乾地黄 甘草各一大

棗二十枚 右八味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

〔衍義〕此以內補建中湯除去膠飴易入人參地黃平調血氣雖有虛羸寒熱無不可治豈特逆知飲食而已哉

杏仁湯 治產後氣虛方 杏仁 橘皮 白前 人參各三兩 蘇葉 半夏各一升 桂心 四兩 生薑 十兩 麥門冬

二兩 右九味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

〔衍義〕產後浮腫喘乏總屬氣虛風襲之故故效金匱大半夏湯之法參以蘇杏白前疎風利氣之品又以桂半性燥以門冬濟之與大橘皮湯用蜜不殊蘇杏耗氣以人參固之較大橘皮湯用意稍別

治婦人產後上氣責豚積勞藏氣不足胸中煩躁關元以下如懷五千錢狀方 厚朴 桂心 當歸 細辛

芍藥 石膏

桔梗

各三兩

甘草

黃芩

澤瀉

各二兩

吳茱萸

五兩千金翼作大黃

乾地黃

四兩

乾薑

一兩

右十三味

㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服服三劑佳

〔衍義〕婦身素有責豚氣以病不在子藏故仍能受胎受胎之後又不慎勞動產後胸煩上氣殆所不免氣既上逆惡露不無阻滯所以臍下重墜方用厚朴破血中滯氣桂心當歸散臍下積結芍藥地黃除血痹寒熱細辛逐竅祛陰邪茱萸乾薑下逆氣通痹桔梗開胸中煩躁石膏甘草散寒熱逆氣於上黃芩澤瀉逐水下血閉於下地黃芍藥得桂心乾薑之辛散可無阻血之虞茱萸細辛得石膏黃芩之寒化可無助熱之患任熱邪固結則當從翼方退茱萸而進大黃要在量人所稟之偏勝而為調適其宜可也

乳蜜湯

治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒冷補氣方

牛乳

七升惡則用羊乳

白蜜

一升半

當歸

人參

獨活

各三兩

大棗

二十枚

甘草

桂心

各二兩

右八味㕮咀諸藥以乳蜜中煮取三升去滓分四服

〔衍義〕

產後亡血過多而致腎虛風闕故需參歸桂心溫養血氣兼取獨活搜風乳蜜潤燥甘草大棗調和

脾胃之津氣惟脾虛食少便澹者禁用

五石湯 治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補腎治百病方 紫石英 鍾乳 白石英 赤石脂 石膏

茯苓 白朮 桂心 芎藭 甘草各二兩 薤白六兩 人參 當歸各三兩 生薑八兩 大棗二十枚 右十五味五

石並爲末諸藥各咀咀以水一斗二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨活各二兩下痢加龍骨一兩

三石湯 主百病如前方 紫石英 生薑 當歸 人參 甘草各二兩 白石英 鍾乳各二兩 茯苓 乾地黄

桂心各三兩 半夏五兩 大棗十五枚 右十二味三石爲末咀咀諸藥以水一斗五升煮取三升去滓分四服若

中風加葛根四兩

〔衍義〕產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必然崩脫不止乃致清陽下溜濁陰上逆故用紫白石英鍾乳石脂固脫參苓朮草益氣芎藭桂心調血石膏薤白除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒熱與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派 三石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣素弱故不用朮之相激石脂之固脫石膏之標進用地黃卽五石湯中芎藭之義半夏卽薤白之義方後云中風加葛根與五石湯二方不異

內補黃耆湯 治婦人七傷身體疼痛小腹急滿面目黃黑不能飲食并諸虛之不足少氣心悸不安方 黃耆 當歸 芍藥 乾地黄 半夏各三兩 茯苓 人參 桂心 遠志 麥門冬 甘草 五味子 白朮

澤瀉各二兩 乾薑四兩 大棗三十枚

右十六味咬咀以水一斗煮取三升去滓一服五合日三夜一服

〔衍義〕此內補建中合保元四君而易乾薑溫中益氣加地黃療傷中逐血半夏治胸腹急痛遠志門冬除心悸不安澤瀉通膀胱氣化五味子收腎藏之津氣也

吳茱萸湯 治產後虛羸盜汗瀟瀟惡寒方 吳茱萸三兩以清酒三升漬一宿煮如蟻鼻沸減得二升許半分之頓服一升日再間日再作服亦治產後腹中疾痛

〔衍義〕產後虛羸盜汗良由血氣虛冷濁陰擾亂於中生陽不能自固所以瀟瀟惡寒當非太陽中風宜和營衛之比故但取專走厥陰溫中下氣之吳茱萸借清酒漬煮外充腠理以散在表之陰邪內溫藏府以固在裏之津液此與桂枝湯治自汗之法迥乎角立

猪膏煎 治產後體虛寒熱自汗出方

猪膏

生薑汁

白蜜

各一升

清酒五合

右四味煎令調和五上五

下膏成隨意以酒服方寸匕

〔衍義〕產後體虛寒熱且自汗多而津液外泄久之大便澀難所以專取猪膏蜜酒之潤以滋腸胃之枯槁此惟脾約便秘者爲宜若病人舊有微溼者禁用

鯉魚湯

治婦人體盈流汗不止或時盜汗方

鯉魚二斤

葱白

切各一升

乾薑

桂心

各二兩

右五味咬咀

三物以水一斗煮魚取六升去魚內諸藥微火煮取二升去滓分二服取微汗卽愈勿用生魚

〔衍義〕河間云鯉之治水驚之利水因其氣相感也鯉專治水而體豐多汗盜汗用之者以其能散週身濕熱之氣也更兼香豉專解陰邪葱白專通陽氣乾薑出汗逐風桂心和營散邪邪散表實無復自汗盜汗之虞矣

桂枝附子湯 治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸者方 桂枝 芍藥 生薑各三兩 甘草 一

兩半 附子 一枚 大棗 二十枚 右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

〔衍義〕桂枝湯本風傷衛之專藥小便澹難亦得用之者以其多汗傷津之故良非太陽犯本之比且見四肢微急非附子不能利其屈伸原本太陽例中病證象陽且因加附子參其間增桂令汗出之法總由腎臟陽虛所致在產後亡陽多汗尤為合轍

虛煩第十一方十一首

薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣方 薤白 半夏 甘草 人參 知母各二兩 石膏四兩 栝蔞根 三兩 麥門

冬半升 右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

〔衍義〕虛煩懊懣與胸痹所爭一問虛痰痹著而痛則謂胸痹虛火擾亂不寧則為虛煩此因痰火交混而煩熱氣逆故借胸痹薤白湯法參入竹葉石膏劑中庶痰之與火各得其平乃治虛煩之變法仍治懊懣之

正治也

竹根湯 治產後虛煩方 甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗三十枚復煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

〔衍義〕產後虛煩不勝湯藥但以甘竹清胃火小麥斂肝氣大棗益脾津門冬滋肺熱使火無上炎之勢胸無煩擾之患矣用根不用葉者取其降泄直達下焦也

人參當歸湯 治產後煩悶不安方 人參 當歸 麥門冬 乾地黄 桂心各一兩 大棗二十枚 粳米一升芍

藥四兩淡竹葉三升 右九味咬咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三斗煮取一升盡服之甚良

〔衍義〕此以氣血兩虛虛火上炎而煩悶不安故用人參大棗以益氣歸芍地黄以滋血竹葉門冬粳米以除煩用桂心者專攝上炎之火也

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣方 甘竹茹一升人參一兩茯苓 甘草各二兩 黃芩三兩 右五味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

〔衍義〕產後而見煩熱短氣急宜清補為先方中人參茯苓專補心虛甘草專益胃氣竹茹黃芩兼清內外之熱如無外熱黃芩可無用也

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方 知母三兩芍藥 黃芩各二兩 桂心 甘草各一兩 右五

味咬咀以水五升煮取二升半分三服 一方不用桂心加生地

〔衍義〕知母芍藥黃芩統治內外之熱妙用尤在桂心辛散不獨收攝上炎之火且使上三味無渴閉之虞更以甘草和其寒熱煩悶自除矣

竹葉湯

治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬各一升

甘草二兩生薑

茯苓各三兩

大棗十四枚小麥

三合

右七味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸藥煮取三升去滓分三服若心中虛悸者加人

參二兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏二兩

淡竹茹湯

治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方

生淡竹茹一升麥門冬

小麥各五合

甘草一兩

生薑

三兩產實用乾葛

大棗十四枚產實用石膏三兩

右六味咬咀以水一斗煮竹茹小麥米八升去滓內諸藥煮取二升去

滓分二服羸人分作三服若有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛

驚悸安定精神有則爲良無自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩

〔衍義〕

產後雖無短氣悶亂亦無妨於補益竹葉竹茹一清肺一清胃肺胃本相接壤津氣貫通但以胃熱

上蒸而頭痛卽用竹茹肺熱內蘊而煩心則用竹葉佐以茯苓使之下泄也但虛極必內人參氣逆而嘔並

用半夏二方之功用髣髴可知

赤小豆散

治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以溫水和頓服之良

蒲黃散 治產後煩悶方 蒲黃以東流水和方寸匕服極良

〔衍義〕赤小豆燒之不特清火兼可消瘀蒲黃生用功專逐血也

蜀漆湯 治產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方 蜀漆葉 桂心 甘

草 黃芩

各一兩

黃耆五兩知母

芍藥

各二兩

生地黃一斤

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服治寒

熱不傷人

〔衍義〕草蓐中發露得風因而虛熱煩滿晡時輒甚頗有似乎瘧狀故借瘧症門中蜀漆以療之蜀漆性劣
耆草和之芩知性寒桂心散之地黃芍藥專清血分之熱也

芍藥湯

治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黃

牡蠣

各五兩

桂心三兩

右四味咬咀以水一斗煮取二

升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

〔衍義〕產後虛熱虛煩渾是虛火上炎之候芍藥地黃專清血熱恐其閉拒乃以桂心散之牡蠣能解虛熱
上蒸之頭痛以其鹹降也通身發熱加黃芩以黃芩爲少陽經藥表裏風熱皆得用也

中風第十二 論一首 方三十首

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大
豆紫湯產後大善

大豆紫湯 治產後百病及中風痺痿或背強口噤或但煩熱若渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆

因虛風冷濕及勞傷所爲方 大豆五升清酒一斗 右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之

去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒

卽瘥

〔衍義〕黑大豆去風活血更兼酒沃通行經絡產尊前後一切虛風關節不利等證無不宜之宜乎千金首推也

獨活紫湯 治產後百日中風瘳口噤不開并治血氣痛勞傷補腎方 獨活一斤大豆五升舊酒三升 右

三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

〔衍義〕獨活專祛風毒加於大豆紫湯中製其苦燥之性深得剛柔兼濟之妙用終嫌燥血須白日用之若新產暴虛恐非所宜

小獨活湯 治如前狀方 獨活半斤葛根 生薑各六兩 甘草二兩 右四味咬咀以水九升煮取三升去滓

分四服微汁佳

〔衍義〕此純用風藥僅可施於藜藿之人若高梁柔脆諒不處是方也

甘草湯 治在尋中風背強不得轉動名曰風痙方 甘草 乾地黄 麥門冬 麻黃各十兩 栝樓根 芎藭

黃芩各三兩 杏仁五十枚 葛根 半斤 右九味咬咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升去滓內諸藥煮取

三升去滓分再服一劑不瘥更合良翼方崔氏有前胡三兩

〔衍義〕所中風毒最重見證最急不得不以重劑發之略兼滋血潤燥可也不當以產後新虛而致失治也

獨活湯 治產後中風口噤不能言方 獨活 生薑各五兩 防風 秦朮 桂心 白朮 甘草 當歸 附

子各三兩 葛根 二兩 防己 一兩 右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

〔衍義〕前甘草湯治背強不能轉動純見太陽表證故用麻黃葛根以太陽之經行身後也此治口噤不能言純見少陰風證故用附子獨活以少陰之脉循喉嚨也風濕流泊非防己防風桂心白朮無以祛之兩不

移易之定法也

雞糞酒 治產後中風及百病并男子中一切風神効方 雞糞一升熬令黃 豆一升熬令聲絕勿焦 右二味以清酒三升

半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

〔衍義〕內經用雞矢醴治心腹滿脹此用雞矢醴療產後中風全在黑豆淋酒取汗之力雞屬巽而祛風糞

屬穢而祛惡也

竹葉湯 治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛方 淡竹葉 一握 葛根 三兩 防風 二兩 桔梗 甘草 人參

桂心各一兩 大附子一枚 生薑五兩 大棗十五枚 右十味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三溫覆

使汗出若頸項強者用大附子若嘔者加半夏四兩

〔衍義〕產後中風發熱面赤戴陽為患最急急進辛溫救本之藥庶陽不致上逆風熱不致內攻若誤認陽明病面合赤色純行解肌不旋踵而告變矣

防風湯 治產後中風背急短氣千金翼作裏急短氣 防風 獨活 葛根各五兩 當歸 芍藥 人參 甘草 乾薑

各二兩 右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

〔衍義〕背急表實可驗短氣內虛可憑故以人參輔正祛邪一舉而兩得其平非若虛陽上逆竹葉湯之兩難分解也千金翼作裏急短氣若作裏急恐非防葛可治也

鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方 鹿肉三斤 芍藥 獨活 秦朮 黃芩 黃芪 半夏一升

乾地黄 桂心 芎藭各二兩 生薑六兩 甘草 阿膠各一兩 茯苓千金翼作茯神 人參各四兩 右十五味咬咀以水二

斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎三升去滓內膠令烱分四服日三夜一

〔衍義〕產後為虛風所襲非峻培氣血助其祛風之力弗克有濟若疑其有客邪不敢用補而與疎表之劑則氣隨藥脫雖有九還救無及矣即使用補尚恐草木無情不能速為取效故取血肉之味稍兼獨活秦朮鼓舞參芪之性不但助力祛邪并杜虛風復入真補中寓瀉之良法也

獨活湯 治產後中風方 獨活一斤 桂心二兩 秦朮五兩 右三味咀咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加

至一升不能多飲隨性服

〔衍義〕三味漬之以酒流動血脈虛風無復可留矣

大豆湯 治產後卒中風發病倒悶不知人及妊娠挾風兼治在尊諸疾方 大豆五升炒 葛根 獨活各八兩

防己六兩 右四味咀咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服日四夜二

〔衍義〕獨活祛風防己逐濕葛根解肌不得大豆紫湯何以司血氣之開闔

五石湯 治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫癱瘓眩冒不知人及濕痹緩弱身體痙攣妊娠百病方 紫石英

三兩 鍾乳 赤石脂 石膏 白石英 牡蠣 人參 黃芩 白朮 甘草 栝蠹根 芎藭 桂心

防己 當歸 乾薑各二兩 獨活三兩 葛根四兩 右十八味末五石咀咀諸藥以水一斗四升煮取三升半

分五服日三夜二 一方有滑石寒水石各二兩聚二十枚

四石湯 治產後卒中風發疾口噤癱瘓悶滿不知人并緩急諸風毒瘳身體痙攣及挾胎中風婦人百病方

紫石英 白石英 石膏 赤石脂各三兩 獨活 生薑各六兩 葛根四兩 桂心 芎藭 甘草 芍藥 黃芩

各二兩 右十二味咀咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

〔衍義〕產後非極虛寒何致卒然口噤五石湯治證最劇急需鍾乳白朮相反之性激發二英脂膏薑桂人