

廿二年

金匱玉函經二註卷之十九

趙以德衍義

元和李清俊春泉重刊

周揚俊補註

門人

唐邦基澹園
張清源梅汀

全校

趺蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇蟲病脈證第十九

皆係

筋病故彙爲篇論一
首脈證一條方五首

帥曰。病趺蹶。其人但能前。不能卻。刺腨入二寸。此太陽經傷也。

補註腨名承筋。在上股起肉處。腳跟上七寸。腨之中陷者是法不可刺。或刺轉深。遂傷其經。以致能前而

不能卻此仲景自註已詳。

病人常以手指臂腫動。其人身體瞶瞶者。藜蘆甘草湯主之。

補註 凡動皆屬風。而腫屬濕。故肝木主風。血虛則風生。氣虛則濕。手臂腫且動。知其血不足以養筋。陽亦不能以自固。而身體之潤勢不得已矣。豈非有痰氣在筋節間乎。夫見于外者。未有不因于內者也。窺仲景有吐之法。惜乎方缺焉耳。

轉筋之爲病。其人臂腳直。脉上下行微弦。轉筋入腹者。

雞屎白散主之。

雞屎白散

雞屎白一味爲散。取方寸匕。以水六合。和溫服。

補註轉筋者。脾胃土衰。肝木自盛。風火燥爍于筋。則筋痙而痛。故風氣甚急。則肝血失養。筋失其柔和之性。乖其屈伸之節。故臂腳直至脈直上下行者。乃督衝之爲病。何者。督脈循陰器。陰器者。宗筋所主也。衝脈爲肝之幕。肝木多風。則衝亦病矣。若微弦。則轉入于內。爲病較重。因以雞屎白投之。其肝邪外出耳。

陰狐疝氣者。偏有小大。時時上下。蜘蛛散主之。

蜘蛛散方

蜘蛛十四枚 桂枝半兩
熬焦

二味爲散。取八分一匕飲和服。日再服。蜜圓亦可。

衍義。厥陰之筋病也。狐陰獸善變化而藏。匿丸上下。有若狐之出入無時也。足厥陰之筋上循陰股。結于陰器。筋結故偏有小大氣病。故時時上下也。蜘蛛布網取物。其絲右繞。從外而內。大風不壞。得乾金旋轉之義。故主治風木之妖狐。配桂枝以宣散厥陰之氣。

結。

問曰。病腹痛有蟲。其脉何以別之。師曰。腹中痛。其脉當沉。若弦反洪大。故有蛦蟲。

衍義。腹痛中焦濕土之爲病也。腹爲陰。痛爲陰類。故脉當沉。若脉弦。是見厥陰風木之象矣。反洪大者。風木盛而生火。風木之邪。賊傷中土。濕熱不攘。則生蟲。故曰諸蟲皆生於風也。東方生風。在地爲木。在體爲筋。在藏爲肝。風傷筋。此因風傷而生蟲。故蟲乃厥陰肝筋之爲病也。是以傷寒蛦厥。在厥陰篇內。此章蛦

痛。列於筋病篇中。

蛻蟲之爲病。令人吐涎。心痛。發作有時。毒藥不止。甘草粉蜜湯主之。

甘草粉蜜湯方

甘草

二兩

粉

一兩

蜜

四兩

右三味。以水三升。先煮甘草。取二升去滓。內粉蜜攪令和。煎如薄粥。溫服一升。差即止。

衍義夫飲食入胃。胃中有熱。則蟲動。蟲動則胃緩。胃緩則廉泉開。故吐涎。蛻上入膈。故心痛。蛻聞食臭出。

得食則安。故發作有時也。毒藥不止者。蛇惡之不食也。蛇喜甘。故用甘草蜜之甘。隨所欲而攻之。胡粉甘寒。主殺三蟲。蛇得甘則頭向上而喜食。食之卽死。此反佐以取之也。

蛇厥者。當吐蛇。今病者靜而復時煩。此爲藏寒。蛇上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛇聞臭出。其人當自吐蛇。

衍義蛇厥者。病蛇而手足厥冷也。蛇厥者。當吐蛇。病者靜而復時煩。此因肝藏寒而蛇上入膈。故煩。蓋言

蛻生于肝。因臟寒而上入于膈也。須臾復止。得食而
嘔。又煩者。此蛻聞食臭而出于胃。故其人常自吐蛻。
蓋言蛻因風而生于肝。藏寒則上入膈。聞食臭則出
于胃也。

蛻厥者。烏梅丸主之。

烏梅丸方

烏梅三百

個

細辛六兩

乾薑十兩

黃連一觔

附子炮

六兩

川椒去汗四兩

當歸四兩

桂枝去皮

人參

黃蘖各六兩

右十味異搗篩合治之。以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之。五升米下飯熟。擣成泥和藥令相得。內臼中與蜜杵二千下。圓如梧子大。先食飲服十圓。日三服。稍加至二十圓。禁生冷滑臭等物。

衍義烏梅味酸入肝。梅得先春之氣。主助生陽而殺陰類。細辛發少陽之初陽。以助厥陰之化。當歸啟少陰之血液。以資肝藏所藏之榮。黃連配蜀椒。助心火以殺蛇。益子氣也。附子配黃柏。資腎氣以固厥。助母氣也。乾薑佐人參補中焦而止嘔。桂枝制風木。踈肝

卷一
三
鬱陰陽和而厥逆同。風邪散而氣血足。治蛇厥之法。
備已。蛇之化生有若蜒蚰。生長極速。

金匱玉函經二註卷之二十

趙以德衍義

元和李清俊春泉重刊

周揚俊補註

門人

唐邦基澹園
陳德明梅坡

全校

婦人妊娠病脉證治第二十

證三條
方九首

師曰。婦人得平脉。陰脈小弱。其人渴不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。于法六十日當有此證。設有醫治逆者。卻一月加吐下者。則絕之。

術義婦人平脉者。言其無病脉也。陰脉小弱。其榮氣不足耳。凡感邪而榮氣不足者。則必惡寒發熱。不妨

於食今無寒熱妨于食是知妊娠矣妊娠者血聚氣搏經水不行至六十日始凝成胎斯時也氣血化于下榮氣不足衛不獨行壅突中焦而不能食津液少布其人渴用桂枝湯益榮和衛設有醫以他治則更一月當化若加吐下復損其榮土亦失其養育條芩白术可也芎歸可也參芪可也但要益榮生津和中下二焦而已

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥瘕害

衍義宿有癥瘕內結及至血聚成胎而癥病發動氣淫于衝任由是養胚之血不得停畱遂漏不止癥瘕下迫其胎動於臍上故曰癥瘕害也凡成胎妊者一月血始聚二月始胚三月始胎胎成始能動今六月動者前三月經水利時胎下血者未成也後斷三月始胚以成胎方能動若血下不止而癥乘故也必當去其癥內經曰有故無殞亦無殞也癥去則胎安也桂枝桃仁丹皮芍藥能去惡血茯苓亦利腰臍間血即是破血然有散有緩有收有滲結者散以桂枝之

辛肝藏血。血畜者肝急緩以桃仁丹皮之甘陰氣之發動者收以芍藥之酸惡血既破佐以茯苓之淡滲利而行之。

妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月不血也。所以血不止者其癥不去故也。當下其癥桂枝

茯苓丸主之。

桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁

去皮尖熬芍藥各分等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不

知加至三丸、

衍義此復申明胎成三月而後動也。上章以經斷三月而漏下不止，然胎已成，故雖漏下而胎動於上也。此章以六月動者，以前三月經水利時而成胎，胎雖成而血時下，至後三月始斷而不血，是以妊娠六月而胎始動，蓋前三月因下血而胎失養，前三月與後三月之血下不止者，以其癥不去故也。當下其癥，此丸主之。

婦人懷妊六七月，脉弦發熱，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少

腹如扇。其所以然者。子藏開故也。當以附子湯溫其臟。
〔衍義〕妊至六七月。筋骨堅強之時。若其脉弦。弦爲虛。
爲寒。內格其陽于外。而發熱。陰寒內逆。而作脹。腹痛。
惡寒者。其內無陽。故子藏開。少腹如扇也。用附子湯。
復返其陽。以溫其藏。

師曰。婦人有漏下者。有半產後。因續下血。都不絕者。有。
妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。膠艾湯主之。

膠艾湯方

阿膠二兩

艾葉三兩

甘草二兩

當歸三兩