

醫
經
原
旨

卷六

醫經原旨目錄

一卷

攝生第一

陰陽第二

藏象上第三

藏象下第三

二卷

脉色上第四

脉色下第四

經絡上第五

三卷

經絡下第五

標本第六

氣味第七

論治第八

四卷

疾病第九

病機 邪氣 陰陽

疾病第十

經藏 虛實 時令

五卷

疾病第十一

五氣 情志 風 厥 傷寒

疾病第十二
寒熱
瘧疾
水疽
咳
喘汗
鼓脹

六卷

疾病第十三
胎孕
血枯
癰狂
卒痛
痺

五變
痺病
痿
病變
雜病

疾病第十四
涕淚
惑忘飢
臥
夢
癰疽

癰瘰
失守
五逆
死期

醫經原旨

薛雪集註

疾病第十三

胎孕

血枯

癰疽

卒瘕

痺

何以知懷子

之且生也

身有病而無邪脉也

身有病謂

經斷惡阻

之類也

身病者脉亦當病或斷續不調或弦滑細數是

皆邪脉則真病也

若六脉和滑而身有不安者其為胎

氣無人有重身九月而瘕

婦人懷孕則身中右身故胞

疑矣

之絡脉絕也

胎懷九月兒體已長故何以言之胞絡者

能阻絕胞中之絡脉

繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言無治也

當十月復

胞中之絡衝任之絡也胞絡者繫於腎而上會於

咽喉故胞中之絡脉絕則不能言十月子生而胞

絡復通則能言

無損不足益有餘以成其疹

疹疾也治不治

矣故不必治

之反以

無損不足者身羸瘦無用鑠石也

身重疲勞養

成疾

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

疾病胎孕

胎力困正虛羸不足之時必無益其有餘者腹中有形

而泄之泄之則精出而病獨擅中故曰疹成也胎元在

之則精氣必泄精泄則胎氣傷而病獨專於中是益其

有餘故疹成也胎孕之道顛顛顛經云一月為胞胎精

血疑也二月為胎形始成也三月陽神為三魂四月

陰靈為七魄五月五行分五藏也六月六律定六府也

七月精開竅通光明也八月受氣足萬象成也九月宮

室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也生後六十

日瞳子成能咳笑應和人百五十日任脉成能自反覆

百八十日髓骨成能獨坐二百一十日掌骨成能扶伏

三百日髓骨成能行也若不能依期者必有不平之處

巢元方曰妊娠一月名胎胚足厥陰脉養之二月名始

膏足少陽脉養之三月名胎足厥陰脉養之四月名始

時血不流行形象始化未有定儀因感而變欲子端正

莊嚴常口談正言身行正事欲子美好宜佩白玉欲子

賢能宜看詩書是謂外象而內感者也四月始成其血

脉手少陽脉養之五月始成其氣足太陰脉養之六月

始成其筋足陽明脉養之七月始成其骨手太陰脉養

之八月初成清革手陽明脈養之九月始成毛髮足少
陰脈養之十月五藏六府關節人神皆備此其大畧也
常推其理若足厥陰者肝脈也足少陽者胆脈也此
藏一府之經也餘皆如此凡四時之令必始春木故十
二經之養始於肝胆所以養胎在一月二月手心主包
絡也手少陽三焦也屬火而王夏所以養胎在三月四
月足太陰脾也足陽明胃也屬土而王長夏所以養胎
在五六月手太陰肺也手陽明大腸也屬金而王秋
所以養胎在七月八月足少陰腎也屬水而王冬所以
養胎在九月至十月兒於母腹之中受足諸藏之氣然
後待時而生也然十二經中惟手少陰心脈手太陽小
腸脈及足太陽膀胱脈皆不言養胎者蓋九月之養在
腎則膀胱亦在其中矣惟心與小腸為表裏九月之養在
六府之主雖其尊而無為然藏氣所及則神無不至小
腸切近胞胎而火所化則氣無不至此矣第胎有男女
實無月不在也胎孕之道無出此矣故男動在三月男
有遲速體有陰陽則懷分向背故男動在三月男陽性
也女動在五六月陰性遲也女胎背母而懷故母之腹
男胎面母而懷故母之腹硬此又男胎而懷故母之腹
者也至若既生之後兒之壽夭其因有二蓋一則由於

稟賦一則由於撫養爲壽夫稟賦爲胎元之本精氣之受於父母者是也撫養爲壽天之本居處寒溫飲食得失者是也凡少年之子多有羸弱慾勤而精薄也老年之子反多強壯者慾少而精全也多飲者子多不育蓋以酒亂精則精半非真而濕熱勝也多慾者子多不育以孕後不節則盜泄母陰奪養胎之氣也此外如飢飽勞逸五情六氣無不各有所關是皆所謂稟賦也至於撫養之法俗傳有云若要小兒安須帶三分飢與寒此言殊爲未當恐飲食之過傷脾而積聚生故當防其放肆無度叠進而驟脾不及化必使飲食勻調節其生冷何病之有若云帶飢則不可也至若寒之一字關係非淺聖人避風如避箭則風寒之爲害也不小彼嬰兒以未成之血氣嫩薄之肌膚較之大人相去百倍顧可令其帶寒耶新產之兒多生驚風抽搐等病蓋其素處腹中裹護最密及胞胎初脫極易感邪而收生者遲慢不慎則風寒襲之多致不救及其稍長每多發熱輕則爲鼻塞咳嗽重則爲小兒傷寒幼科不識一槩呼爲變蒸誤藥致斃者此也或寒氣傷藏則爲吐爲瀉或因寒生熱則爲驚爲疳種種變生多由外感雖稟體強盛不畏風寒者亦所常有但強者三之一弱者二之二傷熱者十之

三傷寒者十之七矧膏梁貧賤氣質本自不同醫家不能察本但知見熱攻熱嬰兒不能言病家不能辨徒付之命誠可嘆也又有謂小兒為純陽之體多宜清涼之治者此說尤為悞人女子二七男子二八而後天癸至夫天癸者陰氣也小兒之陰氣未至故曰純陽原非陽氣有餘之謂特稚陽耳稚陽之陽其陽幾何使陽本非實而誤認為大則必用寒涼妄攻其熱陰既不足又伐其陽多致陰陽俱敗脾腎俱傷又將何所藉賴而望其生乎又曰小兒無補腎法此何說耶夫小兒之陰氣未成即腎虛也或父母多慾而所稟水虧亦腎虛也陰既不足而不知補之陰絕則孤陽亦滅矣○病有胸脇支何謂無可補耶此義惟薛立齋獨得之

滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血何以名之

支滿者滿如支膈也肺臭臊肺氣不能平肝則肝肺俱逆於上濁氣不降清氣不升故聞腥臊而吐清液也口中唾血血不歸經也四支清冷氣不能周也頭目眩運失血多而氣隨血去也血氣既亂故於前陰後陰血不時見而月信反無期矣

病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也血枯者月水斷絕也致此之時有所大脫血如胎產既多及崩淋吐衄之類皆是也一則以醉後行房血盛而熱因而縱肆則陰精盡泄精去則氣去故中氣竭也夫腎主閉藏肝主疏泄不惟傷腎而且傷肝及至其久則三陰俱虧所以有先見諸證如上所云而終必至於血枯則月事衰少不來也此雖以女子爲言丈夫有犯前證亦不免爲精枯之病則勞損之屬治之何術以四烏鰂骨一蘆茹二物并合之丸皆是也

以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以鮑魚汁利腸中

及傷肝也後飯者先藥後飯也烏鰂卽烏賊也骨名海螵蛸其氣味鹹溫下行故主女子赤白漏下

及血閉血枯其性瀉故亦能令人有子蘆茹亦名茹蘆卽茜草也氣味甘寒無毒能止血治崩又能益精氣活血通經脉作藺茹者非蓋藺茹有毒豈血枯者所宜未之詳耳雀卽麻雀也雀卵氣味甘溫能補益精血主男

子陰痿不起故可使多精有子及女子帶下便溺不利
鮑魚即今之淡乾魚也諸魚皆可爲之惟石首鯽魚者
爲勝其氣味辛溫無毒魚本水中之物故其性能入水
藏通血脉益陰氣煮汁服之能同諸藥通女子血閉也
以上四藥皆通血脉血主於肝故凡病傷肝者亦皆可
用之。血枯一症與血暈相似皆經閉不通之候然而
枯之與隔則相反有如冰炭夫枯者枯竭之謂血虛之
極也隔者阻隔之謂血本不虛而或氣或寒或積有所
逆也隔者病發於暫其證則或痛或實通之則血行而
愈可攻者也枯者其來也漸衝在內竭其症無形必不
可通者也今人每用四物加桃仁紅花甚至硝朴稜莪
之類無所不至夫血既枯矣只當補養陰氣使其血充
則勿招自至奚俟通也若勉強
○病有怒狂者怒狂者
逼之則枯者愈枯不危何待
狂也即罵詈不
避親疎之謂
生於陽也陽氣者因暴折而難決故善
怒也名曰陽厥
陽氣宜於暢達若暴有折剗則志無所
伸或事有難決則陽氣被抑逆而上行
故爲怒狂
陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾
病名陽厥

此其候也

陽明常動者謂如下關地倉大迎人迎氣衝者謂巨陽惟委中崑崙少陽惟聽會懸鐘其脉雖微動而動不甚也於其不甚動者而動且大疾則其常動者更甚矣此即陽

厥怒狂之候奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故

奪其食即已食少則氣衰故節奪其食不使胃使之服火復助陽邪則陽厥怒狂者可已

以生鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也生鐵洛即爐冶用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開

結平水火之邪故可以下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉針砂鉄鏽○癰疾脉搏大滑久自已疔小堅

水之類皆同此意

急死不治搏大而滑為陽脉陽盛氣亦盛故久將自己若小堅而急則肝之真藏脉也全失中和而

無胃氣故故又曰癰疾之脉虛則可治實則死虛則柔

死不治

微也故生實則弦人生而有病癰疾者何得之言人之初生者

急邪氣盛也故死

未犯邪氣卽有癰疾也。病名爲胎病。此得之在母腹中時。其母有

所大驚。氣上而不下。精氣并居。故令子發爲癰疾也。則驚

氣亂而逆。故氣上不下。氣亂則精亦隨之。故精氣并及於胎。令子爲癰癰疾也。○人之五藏卒

痛者。經脉流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。泣而

不行。客於脉外則血少。客於脉中則氣不通。故卒然而

痛。其痛或有卒然而止者。或痛甚不休者。或痛甚不可

按者。或按之而痛止者。或按之無益者。或喘動應手者。

或心與背相引而痛者。或脇肋與少腹相引而痛者。或

腹痛引陰股者。或痛宿昔而成積者。或卒然痛死不知

人。少間復生者。或痛而嘔者。或腹痛而後泄者。或痛而

閉不通者凡此諸痛皆當別之寒氣客於脉外則脉寒

脉寒則縮踈縮踈則脉絀急絀急則外引小絡故卒然

而痛得炅則痛立止絀不伸也絀屈曲也炅熱也寒氣

流通則外引小絡而卒然為痛故但得炅客於脉外者邪不甚深衛氣不得

燖之氣其痛則立止也踈音拳絀音屈因重中於寒

則痛久矣重中於寒則寒氣客於經脉之中與炅氣相

薄則脉滿滿則痛而不可按也陽氣行於脉中而寒襲

行則邪實於經故脉寒氣稽留炅氣從上則脉充大而

滿而痛不可按也之則寒熱相薄留而下

血氣亂故痛甚不可按也炅氣從上陽主升也寒邪遏

其痛必甚寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急

引故痛按之則血氣散故按之痛止膜筋膜也原肓之

原也義詳下章腸

胃之間膜原之下皆有空虛之處血不散而小絡滿則
急引而痛按之則寒氣可散小絡可緩故其痛止非若
經脉之無罅隙者按之則愈實而愈痛也寒氣客於俠
其著於腸胃之募原也飽食則安飢則痛
脊之脉則深按之不能及故按之無益也俠脊者足太陽經也其最
深者則伏衝伏膺之脉寒氣客於衝脉衝脉起於關元
故按之不能及其處
隨腹直上寒氣客則脉不通脉不通則氣因之故喘動
應手矣關元任脉穴在臍下三寸衝脉起於胞中即關元也其脉並足少陰腎經夾臍上行會於咽喉
而腎脉上連於肺若寒氣客之則脉不通脉不通則氣亦逆故喘動應手也
之脉則脉泣脉泣則血虛血虛則痛其俞注於心故相
引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣背俞五藏俞也皆足太陽
經穴太陽之脉循膂當心入散上出於項故寒氣客之
則脉澁血虛為背與心相引而痛因其俞注於心也按

之則熱至而痛止寒氣客於厥陰之脉厥陰之脉者絡者正以血虛故耳

陰器繫於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少

腹相引痛矣肝經之脉循陰股入髀中抵少腹布脇肋也厥氣客於陰股寒

氣上及少腹血泣在下相引故腹痛引陰股厥氣寒逆之氣也少

腹陰股之間乃足三陰衝脉之所中行也寒氣犯之皆相引而痛寒氣客於小腸膜原

之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留不得行

故宿昔而成積矣小腸為受盛之府化物所出若寒氣客其膜原絡血之間則血滯不行故

不得注於大經稽留漸久因成積也寒氣客於五藏厥逆上泄陰氣竭陽

氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣寒傷藏氣則氣不得

降而厥逆上泄乃致真陰暴竭陽氣未能遽入故卒然痛死必待藏氣復反則生矣寒氣客於腸

胃厥逆上出故痛而嘔也

腸胃亦言府也水穀之在六府必自上而下乃其順也若

寒氣客之則逆而上出故為痛為嘔

寒氣客於小腸小腸不得成聚故後

泄腹痛矣

小腸為丙火之府而寒邪勝之則陽氣不化水穀不得停畱故病為後泄腹痛矣

熱

氣留於小腸腸中痛痺熱焦渴則堅乾不得出故痛而

閉不通矣

熱畱小腸是陽藏陽病也故為痺熱焦渴堅乾痛閉之疾治痛之法有曰痛無補法者

有曰通則不痛痛則不通者有曰痛隨利減者人相傳

誦皆以此為不易之法凡是痛症無不執而用之不知

痛隨利減利字訓作通字非下也假令在表者實汗而

利之在裏者實下而利之在氣血者實散之行之而利

之則得治實之法也然痛症亦有虛實治法亦有補寫

其辨之之法不可不詳凡痛而脹閉者多實不脹不閉

者多虛痛而拒按者為實可按者為虛喜寒者多實愛

熱者多虛飽而甚者多實飢而甚者多虛脈實氣粗者

多實脈虛氣少者多虛新病壯年者多實愈攻愈劇者

多虛痛在經者脈多弦大痛在藏者脈多沉微必兼脈

疾病卒痛

七