

金匱懸解

回
終

金匱懸解卷十七

內傷雜病

昌邑黃元御坤載著

腹滿寒疝宿食

腹滿寒疝宿食病之相因者也寒水風木之邪合而賊土土
涇脾陷迫於風水之侵滯塞不通是以脹滿所謂腎氣實則
脹者雖寒水之侮土其中未嘗無木邪也風木上鬱而剋涇
土則爲脹滿風木下鬱而陷寒水則爲疝瘕寒疝者風木之
下鬱於寒水而凝結者也土之所以化穀者火也寒盛火衰
水穀不化是謂宿食宿食既停壅遏中氣變虛而爲實故宜
攻下攻下雖行而其始實屬寒因此三證悉以寒爲病本總

因於少陰之勝跌陽之負也

腹滿一

跌陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下

也當以溫藥服之

胠音區脇也

跌陽胃脉在足趺上

卽衝陽也

微弦者肝膽之氣也脉見微弦則

木邪尅土戊土賊於甲木胃逆而濁氣不降法當腹滿若不
腹滿者則甲木不賊於戊土乙木必賊於巳土脾陷而清氣
不升法當便難以脾陷肝鬱不能行其疏泄之令肝膽之脉
行於脇肘若見兩胠疼痛此虛寒之氣從下而上也當以溫
藥服之溫煖水土以舒木氣也蓋木生於水木氣之鬱必生

水寒水位在下木位在左右脇肘之間兩
臂疼痛是木氣之
鬱此必寒水之氣從下而上侵於木位也

腹滿二

寸口脈弦者卽脇下拘急而痛其人嗇嗇惡寒也

跌陽以候陽明寸口以候太陰寸口脈弦者肝木之尅脾土
也木邪鬱迫經氣不舒故脇下拘急而痛木鬱陽陷陰邪外
束其人當嗇嗇惡寒也

嗇嗇者皮毛振動戰慄者不宜之意

此申明上章之義

腹滿三

腹滿時減復如故此爲寒當與溫藥

陽清而陰濁清則通而濁則塞中氣痞塞是以滿也腹滿時

金匱要略 卷之
減復如故者陽有時而復故減陰有時而勝故復然陰易勝而陽難復是以減不逾時而旋即如故此爲陰勝而內寒非有陳宿之阻隔當與溫藥以驅寒邪也

腹滿四

夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嚏

欠者開口出氣靈樞口問衛氣晝行於陽夜行於陰陰者主夜夜者臥陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠中寒之家陰氣下盛招引陽氣引則陽陷而陽性升浮隨引卽升一升一降是以有欠常引常伸故喜欠也緣其陰盛陽衰升氣少而降令多不

必曰暮而陰常司權故清涕出者肺氣之上薰也肺氣鬱阻
不得下達則上薰鼻竅而生清涕鼻孔窄狹積氣不能暢泄
故衝激而爲嚏噴以其中氣虛寒樞軸不運肺無下降之路
因而逆行上竅肺氣熏衝是以清水常流而嚏噴恒作然欲
嚏而卽出猶是上焦陽氣之稍盛者陽稍盛則顏色和也

腹滿五

中寒其人下利以裡虛也欲嚏不能此人肚中寒

中寒其人大便下利以其裡陽之虛也若欲嚏不能此人肚
中寒陽虛而寒盛也靈樞口問陽氣和則滿於心出於鼻故
爲嚏嚏者肺氣逆行皆極而通而泄路迫狹故激而爲響至

於欲嚏不能則氣虛寒盛比上之善嚏者又不加也

腹滿六

病者痿黃燥而不渴胸中寒實而利不止者死

病者痿弱發黃咽喉乾燥而實不覺渴是溼旺而土鬱也土

氣困之則痿靡不振木氣不達則入土發黃

木主五色
入土爲黃

木鬱

風動則咽喉乾燥水勝土溼則不渴若胸中寒實而不利不
止者火漸金冷土敗木賊陽無復機主死也

腹滿七

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝
者心下則痞

瘦人陽氣衰乏繞臍痛楚腹中必有風冷之邪壅遏穀氣不
得運行寒水風木合而賊土衝突擊撞是以痛也而反下之
敗其微陽陰邪無制其氣必衝若不衝於膈上必填於心下
心下痞滿之證於是作也

腹滿八

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒脈
緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之

其脈數而兼緊此乃弦脈其狀如弓弦硬直按之不能移動
是中氣虛寒木邪尅土之診脈數弦者寒氣凝滯當以溫藥
下其積寒脈緊大而遲者濁陰上逆必心下痞堅以足少陽

之脉下胃貫臍胃氣上逆壅礙膽經降路甲木逼迫胃口結
滯故心下堅硬緊大而遲則心下之堅全是陰邪結聚緣陽
位一虛則陰邪乘虛而上湊非衝塞於胸膈卽痞結於心下
也凡脉大而緊者是爲陽中有陰可以溫藥下之傷寒脉法
緊則爲寒內外之寒皆令脉緊外緊而內大者陰盛而外束
也陽爲陰束鼓宕不能外發故內大而外緊內緊而外大者
陰盛而內隔也陽爲陰隔浮動不能內交故外大而內緊積
陰內凝非下不去是以可下下宜溫藥大黃附子湯是其法
也

病者腹滿按之不痛爲虛痛者爲實可下之舌黃未下者下之黃自去

病者腹中脹滿按之不痛爲虛虛滿而未至滯塞也痛者爲實實滿而已至壅阻也陳宿凝滯是可下之舌黃者溼氣乘心故舌起黃胎以心竅於舌上性溼而色黃也痛滿因於氣滯氣滯必緣於土濕舌胎黃者溼之外候其未下者下之溼氣內泄則黃色外退矣

腹滿十

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

腹中寒氣雷鳴切痛者水寒木鬱肝氣梗澁而拂怒衝笑必

欲強行氣轉腸鳴聲如雷引排觸擊撞是以切痛胸脇逆滿
嘔吐者膽胃上逆經絡壅塞濁氣薰衝則生嘔吐附子粳米
湯粳米甘草補土而緩中半夏附子降逆而驅寒也

附子粳米湯

百二十九

附子

一枚

半夏

半觔

甘草

一兩

大棗

十枚

粳米

半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

腹滿十一

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上
下痛而不可觸近者大建中湯主之

心胸大寒痛嘔不能飲食者土火俱敗寒水上凌胃氣奔逆

不能下降也腹中寒氣上衝皮起頭足出見上下走痛而不可觸近者風木與寒水合邪肆行無畏排擊衝突勢不可當也大建中湯膠飴人參培土而建中乾薑蜀椒補火而溫寒也

大建中湯

百三十一

乾薑

四兩

蜀椒

二合炒去汗

人參

二兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煮取一升半分溫再服如一次頃可飲粥二升後更服當一日食糜粥溫服之

腹滿十二

寒氣厥逆赤丸主之

寒氣厥逆寒氣在內手足厥冷也四肢秉氣於脾胃寒水侮土四肢失秉是以厥逆寒水上凌心火漸敗是宜泄寒水而護心君赤丸茯苓烏頭泄水而驅寒溼半夏細辛降濁而下衝氣珍珠保護心君而止疼痛也

赤丸 百三十一

茯苓 四兩

烏頭 二兩

半夏 四兩

細辛 一兩

右四味末之內珍珠爲色煉蜜爲丸如麻子大先飲食酒

下三丸日再夜一服不知稍增之以知爲度 珍珠卽珠砂非寶珠也

腹痛十三

脇下偏痛發熱其脈繁弦此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯
脇下偏痛發熱其脈繁弦此脾土寒溼肝木鬱迫以溫藥下
其濕寒則愈矣宜大黃附子湯辛附降逆而驅寒大黃下積
而破結也

大黃附子湯 百三十二

大黃 三兩 附子 三兩 細辛 二兩

炮

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升
半分溫三服服後如人行四五里進一服

腹滿十四

病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故厚樸七物湯主之

腹滿痛發熱十日脉浮而數者外感風邪經府皆鬱經氣不
泄故發熱脉浮府氣不通故腹滿而痛而飲食如故則內證
非寒厚樸七物湯薑桂甘棗解表而和中枳樸大黃泄滿而
攻裡也小承氣湯合薑桂甘棗重用生薑亦溫下法也

厚樸七物湯 百三十三

厚樸

半觔

枳實

五枚

大黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

三兩

大棗

十枚

生薑

兩五

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加半
夏五合下利去大黃寒多者加生薑半斤

腹滿十五

痛而閉者厚樸三物湯主之

痛而內閉不通必驚而生熱直用寒泄不須溫下厚樸三物湯枳樸泄其滿大黃通其閉也

厚樸三物湯

百三十四

此即小承氣湯而分兩不同

厚樸

八兩

枳實

五枚

大黃

四兩

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利爲度

腹滿十六

腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯

方在痙病

腹滿時減已復如故此爲寒也今腹滿不減雖少減而究不

足言減此非虛寒是實邪也內實故常滿而不減當須下之
宜大承氣湯也

腹滿十七

按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大柴胡湯

心下滿痛者少陽之經鬱迫陽明之府也少陽之經由胃口
而行兩脇脘胃上逆經府鬱塞故心下滿痛此爲實也法當
下之宜大柴胡湯柴芩芍藥清解少陽之經枳實大黃寒泄
陽明之府半夏薑棗降逆而補中也

大柴胡湯

百

柴胡

半斤

枳實

三兩

半夏

半斤

生薑

五兩