

增補
加批

臨證指南醫案

臨證指南醫案卷四

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲全校

〔濕〕

濕阻
肺焦
肅降

馮三古白頭脹身痛肢疼胸悶不食溺阻當開氣分除濕

飛滑石

杏仁

白蔻仁

大竹葉

炒半夏

白通草

王仁酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺王一身之

氣化也杏仁

枯藁皮

白蔻仁

飛滑石

半夏

厚朴

吳五酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫

大杏仁

金石斛

飛滑石

紫厚朴

活水蘆根

孔心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩

連翹

炒杏仁

白通草

滑石

野赤豆皮

濕阻
肺溫

某九濕溫阻於肺衛咽痛足跗痺痛當清上焦濕走氣自和

飛滑石

竹葉心

連翹

桔梗

射干

蘆根

周病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所云因於濕首如裹此呢忒鼻衄皆邪混氣之象況古

色帶白咽喉欲閉邪阻上竅空虛之所諒非苦寒直入胃中可以治病病名濕溫不能自解即有昏煙之變

醫草泛稱時氣而已連翹

牛蒡子

銀花

馬勃

射干

金汁

李三時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道遂致清肅不行不飢不食但溫乃化熱之漸致機凝不為靈

動與形質滯濁有別此清熱開鬱必佐芳香以逐穢為法

枯藁皮

桔梗

黑山桅

香鼓

枳殼

鬱金

降香末

某吸受穢邪募原先病嘔逆邪氣分布營衛皆受送熱蒸頭脹身痛經旬神識昏迷小水不通上中下三焦

交病古白濁不多飲是氣分室塞當以芳香通神淡滲宣竅俾穢濕濁氣由此可以分消

濕熱
微氣
阻凝

濕熱傷胃

濕熱入心

濕熱內陷

濕熱脾陽

吳 荻仁 茯苓皮 豬苓 大腹皮 通草 淡竹葉 牛黃丸二丸

鮮省頭草 如母 川斛 荻仁 炒麥冬

張 體壯有濕近長夏陰雨潮濕著於經絡身痛自利發熱仲景云濕家大忌發散汗之則變痙厥脈來小弱而緩濕邪凝遏陽氣名濕溫溫中熱氣橫冲心胞絡以致神昏四肢不煖亦手厥陰見症非與傷寒同法也

蔡 犀角 連翹心 元參 石菖蒲 金銀花 野赤豆皮 煎送至寶丹

張 陽虛挾濕邪熱內陷所以神識如蒙議用瀉心法 人參 生乾薑 黃芩 川連 枳實 生白芍

周 此濕蘊氣中足太陰之氣不為鼓動運行試以痞結胸滿仲景列於太陰篇中概可推求其理矣 半夏 醋炒 茯苓 川連 厚朴 通草湯煎 豬苓 秦皮

范 濕傷脾陽腹膨小溲不利 茅朮 厚朴 茯苓 澤瀉 又 五苓散 又 二朮膏 四肢乍冷自利未已目黃稍退而神倦不語濕邪內伏足太陰之氣不運經言脾竅在舌邪滯竅少靈

以 致語言欲塞必當分利佐辛香以默運坤陽是太陰裏症之法 生於木 厚朴 茯苓 草薢仁 木瓜 澤瀉 炒遠志

又 身體稍稍轉動語塞神呆猶是氣機未為靈轉色脈非是有餘而濕為險邪不徒偏寒偏熱已也 生於水 茯苓 荻仁 鬱金 炒遠志 石菖蒲汁

又 脾胃不醒皆從前濕蒸之累氣升咳痰參藥緩進 炒黃川貝 茯苓 荻仁 鬱金 地骨皮 淡竹葉

又 濕滯於中氣蒸於上失降不得寐口數白疳仍不渴飲開上鬱佐中運利腸間亦是宣通三焦也 生於木 荻仁 寒水石 桔梗 豬苓 澤瀉 廣皮白

此等症多由風痰濕所上焦藥治之

法治
之心
當有未

濕阻
中焦
氣

曹十三 腸胃屬脾 濕久生熱 氣阻不爽 仍以通為法

生於朮 川黃連 厚朴 淡生薑渣 廣皮白 酒煨大黃 水法丸服三錢

李四 脈小澹 痰多上湧 食入脘阻 大便不爽 上秋至今夏不愈 自述飢飽失和 曾病黃疸 以濕傷氣 痺主治

大杏仁 苡仁 半夏 薑汁 茯苓 橘紅 鬱金 香豉

俞五 酒濕鬱傷 脘中食阻而痛 治以辛苦寒 小川連 半夏 薑汁 枳實 茯苓 香豉

某九 古白目黃 口渴溺赤 脈象呆鈍 此屬濕鬱

綿茵陳 生白朮 寒水石 飛滑石 桂枝末 茯苓皮 木猪苓 澤瀉

李 酒客中虛 粵地潮濕 長夏涉水 外受之濕 下起水穀不運 中焦之濕 內聚治法 不以宣通經腑 致濕阻氣

分 鬱而為熱 自脾胃不主運通 水濕橫漬於脈膝之間 二便不爽 濕熱濁氣交排 混亂前輩 治中滿必曰分

消 此分字明明謂分解之義 但亂藥既多 不能去病 就是脾胃受傷 於藥蔓延 腿肢腫極且痛 病深路遠 藥

必從喉入胃 然後四布 病所未得 藥益清陽 先已受傷 此湯藥難以進商也 議用丹溪小温中丸三錢 專以

疎利腸中 取其不致流散 諸經亦一理也 小温中丸八服

某二 陽微體質 濕痰內聚 便溏脘悶 肌麻舌乾 清理濕邪 氣機升降自安

金石斛 茯苓 半夏 廣皮白 鈎藤 白蒺藜

張 脈右緩濕著阻氣 厚朴 廣皮 煨草菓 炒杏仁 藿香梗 炒神麴

某二 不耐煩勞 是本虛脫悶 便泄屬濕邪 先治濕後治本

藿香梗 廣皮 茯苓 大腹皮 厚朴 穀芽

陸 濕滯如痞 山茵陳 草菓仁 茯苓皮 大腹皮 絨 厚朴 廣皮 澤瀉 猪苓

汪三 古黃脫悶 穢濕內著 氣機不宣 如久釀蒸 必化熱氣 即有身熱之累

杏仁 藿香 茯苓皮 滑石 厚朴 廣皮白

某 閱病源皆濕熱內停之象 當走濕清熱為主 至於藥酒 雖濕助熱 尤當永戒

生白朮 赤小豆皮 綿茵陳 黃柏 茯苓 澤瀉

某脈濡頭脹胸身重著而痛寒熱微嘔此濕阻氣分

厚朴 杏仁 白蔻仁 木通 茯苓皮 大腹皮 滑石 竹葉

某長夏外受暑濕與水穀之氣相併上焦不行下脘不通氣阻熱從濕下蒸逼不飢不食目黃舌白氣分之

結厚朴 杏仁 廣皮 茯苓 半夏 薑汁

某脈緩身痛汗出熱解繼而復熱此水穀之氣不運濕復阻氣鬱而成病仍議宣通氣分熱自濕中而來徒

進清熱不應 黃芩 滑石 茯苓皮 大腹皮 白蔻仁 通草 猪苓

方四形質頽然脈遲小瀼不食不寐腹痛大便窒痺平昔嗜酒少穀中虛濕結陽傷寒濕瀉陰鴉聚為痛

炒黑生附子 炒黑川椒 生淡乾薑 葱白 調入猪膽汁一枝

王五二冷濕損陽經絡拘束形寒酒客少穀勞力所致桂枝 淡乾薑 熟附子 生白朮

莫十五今年夏四月寒熱不飢是時令潮診氣蒸內應脾胃夫濕屬陰晦必傷陽氣吞酸形寒之陽運行議鼓運

轉旋脾胃一法 苓薑朮桂湯

某六地中濕氣自足先腫濕屬陰邪陽不易復畏寒筋骨猶牽強無力以金匱苓薑朮桂湯

陳五濁凝氣結有形酒肉挾濕 華撥 生香附汁 木香 草菓 茯苓 廣皮白

江脈緩臍上痛腹微膨便稀溺短不爽此乃濕鬱脾胃之陽致氣滯裏急宗古人導濕分清用桂苓散方

生茅朮 官桂 茯苓 厚朴 廣皮白 飛滑石 猪苓 澤瀉 炒查肉

林五中年清陽日薄忽然脫中痞悶乃清陽不自轉旋肉酒濕濁之氣得以凝聚矣過飲溲瀉濕傷脾胃胃陽

微仲景法以輕劑宣通其陽若投破氣開降最傷陽氣有格拒之害 苓桂朮甘湯

嚴三胸滿不飢是陽不運行嗜酒必挾濕凝阻其氣久則三焦皆閉用半硫丸二便已通議治上焦之陽

苓桂朮甘湯

王六病人迷病中厚味無忌腸胃滯雖下而留濕未解濕重濁令氣下墜於肛肛墜痛不已胃不喜食陽明失

閻古上有白腐形色議劫腸胃之濕
肝痛不宜 大腸有熱不得用燥補之劑

生茅朮 人參 厚朴 廣皮 炮薑皮 生炒黑附子

胡十二受濕患瘡久瘡陽之氣泄半年淹淹無力食少噎噎難化此脾胃病法以運中陽為要

茯苓 桂枝 生於朮 炙草 苡仁 生薑

汪夏令脾胃司氣兼以久雨泛潮地中濕氣上干食味重濁少運所謂濕勝成五泄也古云寒傷形熱傷氣

芒種夏至天漸熱宜益氣分以充脾胃此夏三月必有康健之理 補中益氣湯

某十五穢濕邪吸受由募原分布三焦升降失司脫腹脹悶大便不爽當用正氣散法

藿香梗 厚朴 杏仁 廣白皮 茯苓皮 神麴 麥芽 綿茵陳

蔡仲景云小便不利者為無血也小便利者血症諦也此症是暑濕氣蒸三焦瀰漫以致神昏乃諸數阻塞

之兆至小腹硬滿大便不下全是濕鬱氣結彼奔醫猶然以滋味呆鈍滯藥與氣分結邪相反極矣議用甘

露飲法 猪苓 浙茯苓 寒水石 晚蠶沙 皂莢子 去皮

某四脫悶便溲身痛脈象模糊此屬濕蘊三焦

厚朴 廣皮 藿香梗 茯苓皮 大豆黃卷 木防己 川通草 苡仁

牛向年積聚候服燥熱諸藥頻與清養推陳致新乃安身處江南濕熱之鄉飲啖仍用山右濃厚之味留熱

由腸升膈三焦不清議攻無形之熱清心涼膈去芒硝加菖蒲

韓三冷酒水濕傷中上嘔食下泄脂液陽氣傷極再加浮腫作脹則危

人參 茯苓 熟附子 生於朮 生白芍 生薑

又酒濕類聚例以分利診脈微陽氣已敗濕蘊生熱至胃癰脹清熱則陽亡即死木苓運中祛濕佐附迅走

氣分亦治濕一法 茯苓 熟附子 生白朮 左牡蠣 澤瀉 車前子

龐四食久脾陽消乏中年未育子腎真亦敗做安腎丸

鹿茸 胡蘆巴 附子 韭子 赤石脂 補骨脂 真茅朮 茯苓 兔絲子 大茴香

脾濕陽衰 胃鬱傷濕

三瀰濕邪 焦漫邪

張四陽傷痿弱有濕麻痺痔血 生白朮 附子 乾薑 茯苓
某八古白身痛足跗浮腫從太谿穴水流如注此濕邪伏於足少陰當用溫蒸陽氣為主

肝胃濕熱

楊厥陰為病必錯雜不一瘧痢之後肝臟必虛發症左脇有痞腹中塊礪外堅脇下每常汨汨有聲惡虛就實常有寒熱胃中不知飢而又錯雜吞酸脈長而數顯然厥陰陽明濕熱下參前陰陽縮而為濕熱症也議用升發陽明胃氣參泄厥陰濕熱其症自愈

濕鬱冷肢節痛

浦氏胸膈迷漫胃痛嘔食肢節屈曲處冷痛經絡後來時周身腰脊不舒脈弦沈痛即便瘡此濕鬱阻閉氣血不行用藥先須斷酒

濕熱入經為痺

徐溫瘧初愈驟進濁膩食物濕聚熱蒸蘊於經絡寒戰熱熾骨節煩疼舌起灰滯之色面目痿黃色顯然濕熱為痺仲景謂濕家忌投發汗者此陽傷變病蓋濕邪重者汗之不却是苦味辛通為安耳

濕鬱經脈痛

某四風暑濕渾雜氣不主宣咳嗽頭脹不飢右肢若廢法當通陽驅邪
防己 杏仁 滑石 醋炒半夏 連翹 山梔 苡仁 野赤豆皮
杏仁 錢 苡仁 錢 桂枝 分五 生薑 分 厚朴 錢 半夏 錢 漢防己 錢 白蒺藜 錢

某汗多身痛自利小溲全無胸腹白疹此風濕傷於氣分醫用血分涼藥希薑熱緩殊不知濕熱在脈為痛濕家本有汗不解苡仁 竹葉 白蔻仁 滑石 茯苓 川通草

濕為重濁有質之邪若從外而受者皆由地中之氣升騰從內而生者皆由脾陽之不運雖云霧露雨濕上先受之地中潮濕下先受之然霧露雨濕亦必由地氣上升而致若地氣不升則天氣不降皆成燥症矣何濕之有其傷人也或從上或從下或遍體皆受此論外感之濕邪著於肌軀者也此雖未必即入於臟腑治法原宜於表散但不可大汗耳更當察其兼症若兼風者微微散之兼寒者佐以溫熱兼熱者佐

方重全者厭書何
案複生編者欲

治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥
治濕熱之品以之為藥

氣分 熱 肺 津 虛 火 上 心 過 傷 胃 陰 虛

〔燥〕

以清藥此言外受之濕也然水流濕火就燥有同氣相感之理如其人飲食不節脾家有濕脾主肌肉四肢則外感肌軀之濕亦漸次入於臟腑矣亦有外不受濕而但濕從内生者必其人膏梁酒醴過度或嗜飲茶湯太多或食生冷瓜果及甜膩之物治法總宜辨其體質陰陽斯可以知寒熱虛實之治若其人色蒼赤而瘦肌肉堅結者其體屬陽此外感濕邪必易於化熱若內生濕邪多因膏粱酒醴必患濕熱濕火之症若其人色白而肥肌肉柔軟者其體屬陰若外感濕邪不易化熱若內生之濕多因茶湯生冷太過必患寒濕之症人生若一小天地今觀先生治法若濕阻上焦者用開肺氣佐淡滲通膀胱是即啟上開開支河導水勢下行之理也若脾陽不運濕滯中焦者用朮朴薑半之屬以溫運之以苓澤腹皮滑石等滲泄之亦猶低窪濕處必得烈日曬之或以剛燥之土培之或開溝渠以泄之耳其用藥總以辛苦寒治濕熱以苦辛溫治寒濕藥以淡滲佐之或再加風藥甘酸膩濁在所不用總之腎陽充旺脾土健運自無寒濕諸症肺金清肅之氣下降膀胱之氣化通調自無濕火濕熱暑濕諸症若夫失治變幻則有腫脹黃疸泄瀉淋閉痰飲等類俱於各門兼參之可也 華岫雲

某

脈右數大議清氣分中燥熱 桑葉 杏仁 大沙參 象貝母 香豉 黑梔皮

〔燥〕

夏熱秋燥致傷都因陰分不足

冬桑葉 玉竹 生甘草 白沙參 生扁豆 地骨皮 麥冬 花粉

某

燥火上鬱 銀脹咽痛 當辛涼清上 薄荷梗 連翹殼 生甘草 黑梔皮 桔梗 萊豆皮

王

老人舌腐肉消肌枯 心事繁冗 陽氣過動致五液皆涸而為燥 冬月無妨 夏月深處林壑心境凝然可以延年 每早服牛乳一杯

陳

秋燥復傷 宿恙再發 未可補瀉 姑與甘藥養胃

某

上燥治氣 下燥治血 此為定評 今陽明胃腑之虛 因久病嘔逆 投以辛耗破氣 津液劫傷 胃氣不主下行 茯苓 糯稻根鬚

致腸中傳送失司。經云六腑以通為補。半月小效。全在一通。補工夫豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。

鮮生地

天冬

人參

甜梨肉

生白蜜

熱劫陰液

張

脈數虛舌紅口渴。上鬱乾咽。腹熱不飢。此津液被劫。陰不上承。心下溫溫液液。用炙甘草湯。

炙甘草

阿膠

生地

麥冬

人參

麻仁

某氏心中煩熱。正值經來。而熱渴不已。若清肺氣。大謬。用復脈法。

炙甘草

生地

阿膠

麥冬

棗仁

蔗漿

某陽津陰液重傷。餘熱淹留不解。臨晚潮熱。古色若赭。頻飲救亢。陽焚燎。究未能解渴。形脈俱虛。難投白虎。

議以仲景復脈一法。為邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰少。雖得胃關復振。因左關尺空。數不藏。非久延。

所宜耳。人參

生地

阿膠

麥冬

炙草

桂枝

生薑

大棗

燥為乾涸不通之疾。內傷外感宜分。外感者由於天時風熱過勝。或由深秋偏亢之邪。始必傷人。上焦氣分。其法以辛涼甘潤肺胃為先。喻氏清燥救肺湯及先生用玉竹門冬桑葉薄荷梨皮甘草之類是也。內

傷者乃人之本病。精血下奪而成。或因偏餌燥劑所致。病從下焦陰分。先起其法以純陰靜藥。柔養肝腎。

為宜。大補地黃丸六味丸之類是也。要知是症大忌者苦瀉。最喜者甘柔。若氣分失治。則延及於血下病。

失治則稿。及乎上喘咳痰厥。三消噎膈之萌。總由此致。大凡津液結而為患者。必佐辛通之氣味。精血竭。

而為患者。必藉血肉之滋填。在表佐風藥而成功。在腑以緩通為要。務古之滋燥養營湯潤腸丸五仁湯。

瓊玉膏。一燕丹牛羊乳汁等法。各有專司也。即新甫。

有因風而燥當兼治風藥中未備。

治風藥中未備。

(疫)

朱

疫癘穢邪。從口鼻吸受。分布三焦。瀰漫神識。不是風寒客邪。亦非停滯裏症。故發散消導。即犯劫津之戒。

與傷寒六經大不相同。今喉痛丹痧。舌如硃。神躁暮昏上受。穢邪逆走。體中當清血絡。以防結閉。然必大用解毒以驅其穢。必九日外不致昏憤。其邪去正復。

心入癘
胞干邪

治時疫外等若一傳惡非通金之度數隨施不能也
時方此不方時毒用靈石製種症用效能效

犀角 連翹 生地 玄參 菖蒲 鬱金 銀花 金汁

姚 疫毒口糜丹疹喉啞治在上焦
犀角 鮮生地 玄參 連翹 石菖蒲 銀花 金汁 至寶丹

譚 口鼻吸入穢濁自肺系漸於心包絡初病喉痛舌燥最怕竅閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯
同法 玄參 連翹 鬱金 銀花 石菖蒲 藜蘆 射干 牛蒡 冲入真白金汁一杯

楊 吸入疫癘三焦皆受久則血分漸瘀愈結愈熱當以鹹苦之製仍是清揚理上做古大製小用之意
玄參 西瓜翠衣 金銀花露 瑩白金汁

金氏 人靜則神昏癘邪竟入臆王先生方甚妙愚意兼以芳香宣敷遂擬 至寶丹
疫癘一症都從口鼻而入直行中道流布三焦非比傷寒六經可表可下夫疫為穢濁之氣古人所以飲

芳香採蘭草以襲芬芳之氣者重穢穢也及其傳變上行極而下行極而上是以邪在上焦者為喉啞為口糜若逆傳臆中者為神昏古絳為喉痛丹疹今觀先生立法清解之中必佐芳香宣敷遂擬如犀角菖蒲銀花鬱香等類兼進至寶丹從表透裏以有靈之物內通心竅搜剔幽隱通者通鎮者鎮若邪入營中三焦相溷熱愈結邪愈深者理宜鹹苦大製之法仍恐性速直走在下故用玄參金銀花露金汁瓜蔓皮輕揚理上所謂做古法而不泥其法者也考是症惟張景岳喻嘉言吳又可論之最詳然宗張喻二氏恐有遺邪留患若宗吳氏又恐邪去正傷惟在臨症權衡無盛盛無虛虛而遺人大缺方不愧為司命矣
鄰游九

三焦

張 伏氣熱蘊三焦心瀉熱發煩渴遍體赤癍夜躁不寐兩脈數搏

羚羊角 犀角 連翹心 玄參心 鮮生地 金銀花 花粉 石菖蒲

又 寒熱必有形象攻觸及於胃脘之下口渴喜飲煖湯癍已發現病不肯退此邪氣久伏厥陰之界矣

桂枝 川連 黃芩 花粉 牡蠣 枳實

嚴 濕溫雜受。身發斑疹。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中強食。反助邪威。議用涼膈疎斑方法。

連翹 薄荷 杏仁 鬱金 枳實汁 炒牛蒡 山梔 石膏

又 古遺赤皆。譴早輕夜重。斑疹隱現。是溫濕已入血絡。夫心主血。邪干膈中。漸至結閉。為昏瘡之危。苦味沉寒。竟入中焦。消導辛溫。徒劫胃汁。皆濕邪大禁。議清疎血分。輕劑以透斑。更參入芳香。逐穢以開內竅。近代

喻嘉言申明戒律宜遵也。犀角 玄參 連翹 銀花 石菖蒲

先煎至六分。後和入雪白金汁一杯。臨服研入周少川牛黃丸一丸。

江 溫邪發疹。濕熱內蘊。便閉不通。先開上焦。杏仁 蘇子 桔萸皮 紫苑 山梔

某 風溫發疹。薄荷 連翹 杏仁 牛蒡子 桔梗 桑皮 甘草 山梔

某 風溫發疹。薄荷 赤芍 連翹 牛蒡子 桔梗 桑皮 甘草 山梔

費 暴寒驟加。伏熱更熾。邪鬱則氣血壅遏。疹不肯外達。疫氣交阻。神迷喘促。漸入心胞。絡中有內閉外脫

之憂。熱注下迫。自利黏膩不爽。法當開其結閉。消毒解其膈中之壅。必得神清。方保無變。

連翹心 飛滑石 石菖蒲 炒金銀花 射干 通草 煎化牛黃丸一丸

朱 痧後痰多咳嗽氣急。蘆根 杏仁 桔梗 飛滑石 桑皮 通草

某 痧後伏火未清。內熱身痛。玉竹 白芍 地骨皮 川斛 麥冬 生甘草

某 痧後熱不止陰傷。生白芍 炙甘草 生扁豆 炒麥冬 川斛 穀芽

章 涼風外襲。伏熱內蒸。秋金主令。內應乎肺。喘咳身熱。始而晝熱。繼而暮熱。自氣分漸及血分。肌肉紫而肌

壘發疹。辛寒清散為是。薄荷 連翹 石膏 淡竹葉 杏仁 桑皮 苡仁

吳 病在暴冷而發肌表。頭面不透。是外蘊為寒。內伏為熱。肺病為衛。衛氣分兩解為是。

麻黃 石膏 牛蒡子 枳殼汁 杏仁 射干 桔梗 生甘草

尹 環口燥裂而痛。頭面身半以上。發出癰疹。赤紋乃陽明血熱。久蘊成毒。瘦人偏熱。頗有是症。何謂醫人不

識。犀角地黃湯 再加風藥尤妙

血陽明熱

濕熱 鬱肺 陰傷 內外寒熱

風溫 熱邪 絡入

溫溫

此症乃血中熱毒發於前未服之妙藥

濕邪內陷
胃腸腐爛
發蒸

風濕

痰火

江溫邪自利癰疹 黃苓 連翹 牛蒡子 桔梗 香豉 薄荷 杏仁 橘紅 通草

李二發瘰癧腫獨現正而每遇九十月大發五六月漸愈七八年如是因思夏令陽氣宣越營衛流行無間秋冬氣凜外薄氣血凝滯此濕熱漫無發泄乃少陽木火之鬱及陽明燥蒸之濕故上焦尤甚耳法以辛涼佐以苦寒俾陽分鬱熱得疏庶幾發作軌緩

夏枯草 鮮菊葉 苦丁茶 鮮荷葉邊 羚羊角 黑桅皮 鬱金 苡仁

唐五麻木忽高腫發瘰必有風濕襲入皮膜乃軀殼病昔人每以宣行通劑此防變風症

片薑黃 羚羊角 川桂枝 撫芎 半夏 白芥子

某心風塊瘰癧咳嗽腹痛邪著表裏當用雙和

牛蒡子 杏仁 連翹 桔梗 桑皮 象貝母 煎藥送通聖丸

瘰癧者有觸目之色而無礙手之質即稠如錦紋稀如蚊跡之象也或佈於胸腹或見於四肢總以鮮紅起發者為吉色紫成片者重色黑者為凶色青者為不治蓋有諸內而形諸外可決其臟腑之安危邪正之勝負也殆傷寒瘟疫諸症失於宣解曰蘊於胃腑而走入營中每有是患耳考方書之治其法不一大抵由失表而致者當求之汗失下而致者必取乎攻火其清之毒其化之營氣不足者助其虛而和之託之至於陰瘰一說見象耳微若必指定些些之瘰點為陰猶恐不能無誤恐前人此例無非覺後人勿執見瘰為實熱之義也吾故曰必參之脈象及兼證方妥痧者疹之通稱其頭粒而如粟象癰者即疹之屬腫而易痒須知出要周勻沒宜徐緩不外乎太陰陽明之患故繆氏常以肺胃論治為精也若先生之法本乎四氣隨其時令之勝復酌以辛涼辛勝及甘寒苦寒鹹寒淡滲等法而治之凡吾幼科諸友於此尤當究心焉 邵新甫

痰

汪八宿哮久矣不發心忤震動似乎懼懼之象此屬痰火治以宣通鬱遏勿徒呆補
半夏 川連 石菖蒲 蛤粉 枳實 茯苓 川鬱金 橘紅 竹瀝姜汁 沒丸

增補
品登告白
上海華僑記書局及甲

川連 白朮 枳實 厚朴 茯苓 半夏 淡薑湯泛丸

沈痰久嗽海蛤丸

張姬
痠火風眩暈防仆跌
明天麻
炒半夏
茯苓
橘紅
羚羊角
鉤藤
竹瀝

陳^姬老年痰火咳逆痰有穢氣 蘆根 苁仁 桃仁 絲瓜子 葶藶 大棗 即兼肺癰治法

又下虛不納濁泛嘔逆痰氣
熟地炭 紫衣胡桃肉 炒杞子 炒牛膝 川斛 茯神

某 痰火上逆蒙竅耳鳴頭暈二陳加天麻釣藤甘菊羚羊薑皮

某夏至節兩關脈弦長五火燔燎而肝陽胃陽亢其動怒抽搐為肝病食辛香厚味即病至胃病使然痰火

根深非頃刻可除惟靜養勿患其薄味以清裏此病發之勢必緩由漸加功議藥乃近理治法

羴羊角 犀角 川連 鬱金 山梔 北秦皮 牛黃 膽星 橘紅

生石膏 寒水石 金箔
方諸水法丸竹葉燈心湯送下

何如診脈右關弦滑痰多舌乾微強語言似瘳蓋因痰火上蒙津液不得上承高年頗慮風痺宜清上宣通勿

進剛燁及臍滯之藥

半夏 金石斛 橘紅 黑山拖 茯苓 鬱金 生甘草 石菖蒲 竹瀝 薑汁

張
昏昏如寐
神憤如迷
熱痰內閉
勢非輕渺
半夏
石菖蒲
桔梗
枳實
鬱金
橘紅
竹瀝
薑

汁
二
曲
卷
二
萬
寧
日
本
刀
三
冬
留
工
之
之
刀
姜

某
 鬱疾 半夏 茹 豐金 石 菖蒲 明天麻 白茯苓 橘紅 茯苓
 欽 藤

肝左弦脈損痰多食不易運此鬱癰已甚肝侮脾胃有年最宜開懷不致及噎膈

豐夏 薑汁 在冬 在仁 薑金 橘絲

又朋女前拜。前方甚世仁加白。子金四。息九。門。受。火。自。眼。本。所。法。易。世。為。干。金。世。貴。爵。西。各。受。之。送。口。金。加。尊。樂。中。後。貳。兩。方。央。示。通。用。

金六 濕熱內蒸，身大日盛，汗多，口渴，中脘熱，口法，服桂枝湯，不效，月

痰熱內閉 神昏

濕熱蒸痰

豬肚丸方

葉久寓南土水穀之濕蒸熱聚痰脈沉弦目黃肢木易有瘡疾皆濕熱盛致氣隧不得流暢法當苦辛寒清裏通肌做前輩痰因熱起清痰為要

生茅朮 黃柏 瓜蒌實 山柰 萊服子 川連 半夏 厚朴 橘紅 竹瀝薑汁丸

某病後厚味蒸痰 風化硝 瓜蒌仁霜 枳實 鬱金 生茯苓 薑汁炒山柰 竹瀝法丸

汪脈脹濕阻熱痰 半夏 茯苓 黑山柰 橘紅 製蒺藜 遠志 降香

徐陽動內風用滋養肝腎陰藥壯水和陽亦屬近理夏李脾胃主司肝膽火風易於貫膈犯中中受木火

木火 犯胃 生痰

之侮陽明脈衰痰多經絡不利矣議清少陽鬱熱使中宮自安黃蘗滋補上中愈實下焦愈虛二陳去甘草加金斛桑葉丹皮 又 脈左浮弦數痰多腕中不爽煩則火升眩暈靜坐神識安舒議少陽陽明同治

羚羊角 連翹 廣皮 炒半夏麴 黑山柰皮 香豉

又脈兩手已和惟煩動恍惚欲暈議用靜藥益陰和陽 人參 熟地 天冬 金箔

汪痰火上盛腎氣少攝下焦暮服清肅上焦方法

羚羊角 半夏 茯苓 橘紅 黑梳皮 鬱金

熟地 淡苳蓉 杞子 五味 牛膝 茯苓 遠志 線膠 蜜丸早服

曹五色鮮明屬上有痰飲蓋上實則下虛半百年歲未得種玉診得脈左小不靜右部弦滑法當清肺胃之熱

痰益腎肝之精血做曼倩衛生方法 燕窩膠 甜梨膏 人參 黃芪 麥冬 山藥 茯苓

於朮 黃節 黑節 鹿尾膠 羊內腎 淡苳蓉 故紙 胡桃 青鹽

芮向來痰多食少而參朮服餌未合此稟質為陽不受溫熱剛燥之劑上年冬季溫煖入春痰愈多體中微

倦由乎藏聚未固春氣自地升舉之徵法當攝腎固真乃治痰之本方為有益

熟地 茯苓 補骨脂 胡桃肉 杞子 五味 牛膝 遠志 東前 蜜丸

痰症之情狀變幻不一古人不究標本每著消痰之方立消痰之論者甚多後人有其法而用之治之不

腎虛 痰多

肝腎 虛火 痰

驗遂有稱痰為怪病者矣不知痰乃病之標非病之本也善治者治其所以生痰之源則不消痰而痰自無矣余詳考之夫痰乃飲食所化有因外感六氣之邪則脾肺胃升降之機失度致飲食輸化不清而生者有因多食甘膩肥腥茶酒而生者有因本質脾胃陽虛濕濁凝滯而生者有因鬱則氣火不舒而蒸變者又有腎虛水泛為痰者此亦因土衰不能制水則腎中陰濁上逆耳非腎中真有痰水上泛也更有陰虛勞症龍相之火上炎燔肺以致痰嗽者此痰乃津液所化必不濃厚若欲消之不惟無益而徒傷津液其餘一切諸痰初起皆由濕而生雖有風火燥痰之名亦皆因氣而化非風火燥自能生痰也其主治之法惟痰與氣一時壅閉咽喉者不得不暫時豁痰降氣之劑以開之餘皆當治其本故古人有見痰休治痰之論此誠千古之明訓蓋痰本飲食濕濁所化人豈能禁絕飲食若常欲消之由於外邪者邪散則痰或可清如寒痰溫之熱痰清之濕痰燥之燥痰潤之風痰散之是也若涉本原者必旋消旋生有至死而痰仍未清者矣此乃不知治本之故耳今觀案中治法有因鬱因火者必用開鬱清火為君以消痰佐之有因濕因熱者則用燥濕清熱略佐化痰之品若因肝腎虛而生痰者則純乎鎮攝固補此真知治痰之本者矣若因寒困濕者更當於痰飲門兼參而治之華岫雲

所列方藥皆治肺胃浮痰之藥若透經入絡盤踞臟腑及三焦隱處之老痰尚有峻厲製鍊之方此等方不能奏效也

〔痰飲〕

某六高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆咳嗽形寒仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之

杏仁錢三 粗桂枝錢一 淡乾薑半錢 茯苓錢三 以仁錢三 炙草四分

周向有耳聾鳴响是水虧木火蒙蔽冬陽不潛亦屬下元之虛但今咳聲喉下有痰音脇痛臥著氣衝乃衝

陽升而痰飲泛脈浮當此驟令恐有外寒引動內飲議開太陽以肅上

雲茯苓 粗桂枝 乾薑 五味同薑 白芍 炙草 當午時服

某二新涼外束肺受寒冷氣餒不降宿飲上干而病發矣法當暖護背心宿病可卻

淡生薑粉 半夏 蛤蚧粉 茯苓 桂枝木 以仁煎湯

逆氣不降

某十五背寒咳逆此屬飲象先當辛通飲邪以降肺氣鮮杷杷葉杏仁茯苓橘紅生薑半夏
某二脈右大弦氣喘咳唾濁沫不能着枕喜飲湯水遇寒病發此屬飲邪留於肺衛如見咳投以清潤愈投愈

徐氏劇矣葶藶子山東大棗
痰飲上吐喘不得卧乃溫邪阻蔽肺氣氣不下降壅滯不能着右議用宣通開氣分方法

小青龍去細辛麻黃加芍仁白糖炒石膏

沈氏冬溫陽不潛伏伏飲上泛仲景云脈沈屬飲面色鮮明為飲飲家咳甚常思其飲不當治咳緣年高下焦

根蒂已虛因溫煖氣泄不主收藏飲邪上擾乘肺肺氣不降一身之氣交阻薰灼不休絡血上湧經云不得

卧卧則喘甚痺塞乃肺氣之逆亂也若以見病圖病昧於色診候氣必致由咳變幻腹腫脹滿漸不可挽明

眼醫者勿得忽為泛泛可也茲就管見略述大意議開太陽以使飲濁下趨仍無礙於冬溫從仲景小青龍

越脾合法杏仁茯苓芍仁炒半夏桂枝木石膏白芍炙草

方氏冷暖失和飲泛氣逆為浮腫喘咳腹脹卧則衝膈議用越脾方

石膏杏仁桂枝炒半夏茯苓炙草不用麻黃不成越脾

脾胃虛

施氏勞煩太甚胃陽受傷外衛單薄怯寒畏冷食物少運痰飲內起氣阻濁凝胸背皆痛辛甘理陽已效當此

長夏脾胃主令崇其生氣體旺病可全好六君子加益智木香

黃三身居沿海氣瘴霧露客邪侵入清陽陽傷畏寒久嗽病人不知却病護身猶然用力承辦裏結飲邪沈痼

不卻病茯苓桂枝湯

胡氏六脈沈而微微則陽氣不足沈乃寒水陰凝心痛怔忡漸及兩脇下墜由陽衰不主運行痰飲聚氣欲阻致

痛之來其心震之謂亦如波撼岳陽之義議用外臺茯苓飲合桂枝方

人參茯苓半夏枳實桂枝薑汁

增補
白二脈沈小弦為陰濁飲邪稟質陽不充旺胸中清氣不得舒展曠達偶觸入寒冷或悞進寒物飲邪暴冷凝
結胸痞當平日食物忌用酒肉腥濁便清揚流行常服仲景苓桂朮甘湯百劑若病來因冷即服大順散
上海華福記書局校印

戴病去神已爽慧但本脈帶弦平素有飲為陽氣不足之體年紀漸多防有風痺此酒內宜少用勞怒當深

戒矣議外臺茯苓飲方

人參

茯苓

廣皮

枳實

半夏

金石斛

朱四煩勞太過陽傷痰飲目聚陽蹇脈空寐不成寐衛陽失護毛髮自墜乃目就其衰奪矣初進通飲濁以甦

陽接服外臺茯苓飲

吳氏脈弦背中冷左偏微痛食少欲嘔四肢牽強此飲邪內結議通陽氣

桂枝

茯苓

薑汁

炙草

大棗

某眩暈惡心胸脫不爽脈右弦左弱面色紅亮此乃痰飲上泛有厥中之事

炒半夏

製蒺藜

橘紅

煨天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

尤口中味淡是胃陽虛夫濁飲下降痛緩向有飲濕為患若不急進溫通理陽濁飲必致復聚議大半夏湯

法人參

半夏

茯苓

枳實

薑汁

不脾陽

張七酒客穀少中虛常進疎散表藥外衛之陽亦傷其痰飲發時胸中痞塞自述或飢遇冷病來其為陽氣受

病何疑不必見痰搜逐但護中焦脾胃使陽氣健運不息陰濁痰涎馬有竊據之理

生於朮

川桂枝

茯苓

淡薑渣

苡仁

澤瀉

薑棗湯法丸

王三脈沈為痰飲是陽氣不足濁陰欲蔽當以理脾為先俾中陽默運即仲景外飲治脾之意

苓桂朮甘加半夏陳皮水法丸

某四舌白咳逆不渴非飲象而何宜宣溫藥和之

杏仁

苡仁

半夏

乾薑

粗桂枝

茯苓

厚朴

炙草

某食後脘中痞塞按之漉漉有聲手麻脇痛心煩耳目昏眩是氣不流行痰飲內聚中焦用桂苓丸竹瀝薑

汁法丸

又桂枝

人參

茯苓

半夏

廣皮

炙草

黃味過甘膩中氣緩不主運延綿百天聚氣結飲東垣云病久髮不焦毛不落不食不飢乃痰飲為患飲屬

陰類故不渴飲仲景五飲互異其要言不煩當以溫藥和之通陽方法固無容疑惑太意外飲宜治脾內飲