

噎膈門方 反胃門方 嘔吐噦門方 闕格門方 呃逆門方

諸見血門方 衄血門方 吐血門方 溲血門方 下血門方 畜血門方 頭痛門方

心痛胃脘痛門方 胸痺門方 腹痛門方 腰痛門方 脇痛門方 脊痛脊強門方

臂痛門方 腿痛門方 膝痛門方 身體痛門方 痺門方 痿門方 百合門方

脚氣門方



張氏醫通 卷十四

張氏醫通卷十四

清

長洲石頑張

璐路玉父纂述

登誕先

男

倬飛疇

叅訂

日本

大泉長菴前田安宅子仁

男

典子守

再訂

噎膈門

開關利膈丸

實鑑名人
參利膈丸

治腸胃壅滯。噎膈不通。大便秘結。

木香

檳榔

各七錢

人參

當歸

酒洗

藿香

甘草

炙

枳實

炒各一兩

大黃

酒蒸

厚朴

薑製各二兩

滴水為丸。梧子大。每服三五十丸。食後米飲下。

按此本小承氣加入參歸等味。意在養正祛邪。而實攻多於補。惟熱壅膈塞用之。庶為得宜。然噎膈之燥結。皆由五志抑鬱。傷耗精氣而成。非有熱邪留結。可攻下而除也。用方者審諸。

五噎丸 千金

治胸中久寒。嘔逆妨食。結氣不消。

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

細辛 各一兩

人參

白朮

各二兩

橘皮

茯苓

各一兩半

附子

炮一枚

右為細末。煉白蜜丸。梧子大。酒服十五丸。日三服。漸加至

三十九丸。

五噎丸 千金

治飲食不得下。手足冷。上氣喘息。

麥門冬三兩 去心

甘草二兩

蜀椒炒去汗

遠志肉

桂心

細辛

乾薑炮各一兩

附子炮一枚

人參二兩

右爲細末。煉白蜜丸。彈子大。先食含一九。細細嚥之。喉中

胸中當熱。藥丸稍盡。再含一九。日三夜二服。七日愈。

五噎五膈二九。同用參附椒辛薑桂之屬。一以肝氣上逆。

胃氣不下而嘔噎。故用萸橘以疎肝降逆。苓朮以健胃通

津。一以腎氣不蒸。肺胃枯槁而不納。故用冬草以滋肺和

胃。遠志以補火生土。又嘔噎而藥食可進者。頻與小丸調

之。膈塞而飲食不納者。時用大丸嚥之。其立法之詳若此。

可不辨而忽諸。

旋復代赭石湯玉函

治胃虛噫氣不除

施復花 二錢

代赭石 煨一錢

人參 二錢

甘草 炙二錢

半夏 三錢

生薑 半兩

大棗 擘四枚

右七味水煎去滓。分溫日三服。

六君子湯 湯下 四君子

異功散 湯下 四君子

四君子湯 方祖

指迷七氣湯 局方七氣湯下

局方七氣湯 方祖

四物湯 方祖

代抵當丸 湯下 抵當

理中湯 方祖

越鞠丸 鬱門

八味丸 方祖

二陳湯 方祖

反胃門

藿香安胃散

治脾胃虛弱。飲食不進。嘔吐不腐。

藿香

橘紅各半兩

丁香三錢

人參一兩

為散。每服二錢。生薑三片。水煎溫。食前和滓服。

四逆湯方祖

小半夏湯二陳湯下

大半夏湯二陳湯下

理中湯方祖

茯苓澤瀉湯五苓散下

六君子湯四君子湯下

異功散四君子湯下

平胃散方祖

四君子湯方祖

桂苓丸五苓散下

七味白朮散四君子湯下

二陳湯方祖

開關利膈丸噎膈門

固本丸二冬膏下

逍遙散虛損門

歸脾湯保元湯下

八味丸方祖

黑錫丹金液丹下

六味丸 八味丸下

代抵當丸 抵當湯下

嘔吐噦門

甘草粉蜜湯 金匱

治吐涎心痛。發作有時。毒藥不止吐。就

者。

甘草 半兩

粉 三錢即鉛粉

蜜 一兩二錢

右三味以水三升。煮甘草取二升。去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥。溫服一升。瘥即止。

吳茱萸湯 玉函

治胃氣虛寒。乾嘔吐涎沫頭痛。

吳茱萸 取開口者湯泡七次以去濁氣淨一錢

人參 半錢

大棗 四枚

生薑 半兩

右四味水煎去滓。溫分日三服。

通草橘皮湯 千金

治傷寒胃熱嘔逆

通草 三錢

橘皮 錢半

粳米 一合

生蘆根汁 半合

右四味水煎熱服。不瘥更作。

本方去通草橘皮。加竹茹生薑汁。千金名蘆根飲子。治傷

寒後嘔噦。反胃乾嘔。

麥門冬理中湯。千金治漏氣上焦熱。腹滿不欲飲食。食則

先嘔後瀉。身熱痞悶。

麥門冬 去心

白朮 各五錢

甘草 炙

茯苓 各二錢

人參

橘皮

導心

萎蕤 各三錢

蘆根 生一握

竹茹 一團雞子大

生薑 四錢

陳米 一合

右十二味水煎。溫分日三服。

澤瀉湯 千金

治上焦飲食下胃。胃氣未定。面背身中皆熱。

名曰漏氣。

澤瀉

半夏

柴胡

生薑 各三錢

桂心

甘草 炙各一錢

茯苓

人參 各二錢

地骨皮 五錢

石膏 八錢

竹葉 一把

蓴心 五錢

右十二味。水煎溫服。日三。

人參湯 千金

治下焦熱。氣逆不續。嘔逆不禁。二便不通。名

曰走哺。

人參

黃芩

知母

萎蕤

茯苓 各三錢

白朮

梔子 薑汁炒黑

陳皮

蘆根 各四錢

石膏

煨八錢

右十味水煎溫服日三

準繩多
竹茹

走嘔漏氣皆屬火淫於內火性急速故得食則既吐且利是名漏氣若得食即嘔而便溺不通者則為走嘔總是胃虛火逆所致觀麥門冬理中湯人參湯二方可知不可誤認虛寒輕用溫補之劑也

安蛇散

治吐蛇色赤成團而活屬熱者

烏梅肉

三錢

黃連

蜀椒

藿香

檳榔

各一錢

胡粉

白礬

各半錢

為散每服三四錢水煎如糊空腹服之差即止

半夏瀉心湯

方祖

豬苓散

五苓散下

小柴胡湯 方祖

大黃甘草湯 承氣湯下

文蛤湯 麻黃湯下

橘皮湯 二陳湯下

橘皮竹茹湯 二陳湯下

半夏乾薑湯 二陳湯下

二陳湯 方祖

理中湯 方祖

小半夏湯 二陳湯下

大半夏湯 二陳湯下

薑附湯 四逆湯下即乾薑附子湯

黑錫丹 金液丹下

逍遙散 虛損門

六君子湯 四君子湯下

橘皮半夏湯 二陳湯下

小青龍湯 桂枝湯下

小承氣湯 方祖

豬苓湯 五苓散下

橘皮乾薑湯 七氣湯下

黃芩湯 桂枝湯下

黃芩加半夏生薑湯 桂枝湯下

佐金丸 方祖

連理湯 理中湯下

補中益氣湯 保元湯下

附子理中湯理中湯下

平胃散方祖

五苓散方祖

烏梅丸理中湯下

四君子湯方祖

異功散四君子湯下

歸脾湯保元湯下

霍亂門

理中湯方祖

四逆湯方祖

胃苓湯平胃散下

藿香正氣散平胃散下

平胃散方祖

六和湯暑門

香薷飲方祖

竹葉石膏湯白虎湯下

五苓散方祖

漿水散四逆湯下

二陳湯方祖

黃芩加半夏生薑湯桂枝湯下

連理湯理中湯下

天水散方祖即益元散

導痰湯

二陳湯下

補中益氣湯

保元湯下

六君子湯

四君子湯下

關格門

人參散

治胃虛津枯。關格吐逆。

人參

五錢至一兩

麝

半分至一分

冰腦

三釐至半分

爲散。水煎和滓。分二三次溫服。

此雲岐子治噎膈胃反關格不通。九方之一。用獨參湯峻

補其胃。稍加腦麝以發越其氣。得補中寓瀉之至訣。乃肥

盛氣虛。痰窒中脘。及酒客溼熱鬱痰固結之專劑。以中有

腦麝善能開結利竅散鬱也。若瘦人津枯不能出納而大

便秘結者。卽以此方去腦麝。加蘆根汁竹茹。未嘗不爲合

轍也。

栝子仁湯 治胃虛關格。脈虛微無力。

人參 錢半

白朮

茯苓

陳皮

各一錢 畧去白

甘草

炙三分

栝子仁

研三錢

麝香

一字

生薑

五片

水煎去滓入麝調服。

此雲岐第二方。取用異功。加栝仁麝香。其法稍平。而胃中

津枯。大便艱澀者最宜。亦可加蘆根汁竹茹或竹瀝俱妙。

既濟丸

治關格脈沉細。手足厥冷。

熟附子

一兩

人參

三兩

麝香

少許 為衣

為細末。陳米飲糊丸。梧子大。每服十九至三十九。米飲下。

此雲岐第三方。用參附加麝單刀直入。以破中下二焦之

結。藥雖峻而用法最緩。不可不詳此義。而擅改作湯也。

二陳湯 方祖

四君子湯 方祖

補中益氣湯 保元湯下

黃連湯 瀉心湯下

生料八味丸 方祖

呃逆門

丁香煮散 與局方不同

治胃反嘔逆呃噦泄瀉

丁香 三七粒

建蓮肉 去心二七粒上二味另煎去滓

生薑 七片

黃秫米 半合

水一碗半。煮熟去薑啜粥。

此倣附子粳米湯之制。彼用粳米。此用糯米。皆取其直達

胃府。雖其勢稍平。亦是突圍之將。局方無蓮肉秫米。而多

川烏紅豆。青皮陳皮。甘草乾薑。良薑益智胡椒等味。為散

煮湯。入鹽一字調服。

異功散湯四君子

六味丸八味丸下

理中湯方祖

橘皮竹茹湯二陳湯下

越鞠丸鬱門

附子梗米湯腹滿門

四逆加入參湯四逆湯下

羌活附子散四逆湯下

連理湯理中湯下

旋復代赭石湯噎膈門

調中益氣湯保元湯下

蘇子降氣湯七氣湯下

黑錫丹金液丹下

胃脘癰門

射干湯治人迎逆而盛。嗽膿血。營衛不流。熱聚胃口成癰。

射干去毛

梔子仁薑汁炒黑

赤茯苓去皮

升麻各一兩

赤芍藥兩半

白朮生半兩

右為粗末。每服五錢。水二盞煎。去滓入地黃汁一合再煎。

溫日再服。日晡發熱。每服加犀角丹皮各一錢。甘草二分。

太乙膏 治內外一切癰瘍

黑參

白芷

歸身

肉桂

大黃

赤芍

生地黃

各二兩

右切爲片。麻油二觔浸。春五夏三秋七冬十日。煎熬去滓。攪淨再熬。徐下黃丹。不住手攪。滴水不散爲度。內癰可丸服之。

金匱排膿湯

桔梗湯下

大黃牡丹湯

承氣湯下

涼膈散

方祖

金匱排膿散

桔梗湯下

犀角地黃湯

傷寒門

八珍湯

四君子湯下

諸見血門