

不 於穴温不
不 巖大 病即

第一卷

讀內經論

讀四大家論

古今元氣不同論

富貴貧賤治病不同論

腎為先天本脾為後天本論

水火陰陽論

不失人情論

疑似之證須辨論

用藥須知內經之法論

藥性合四時論

辨治大法論

苦欲補瀉論

行方智圓心小膽大論

伏人圖

伏人圖

改正內景臟腑圖說

第二卷

四言脈訣

脈法心忒

色診

第三卷

本草上 草部一百八十七種

人參

地黃^{生熟} 天門冬

麥門冬

白朮

蒼朮

甘草

黃耆

遠志

菖蒲

萎蕤

薯蕷

黃芩^{生熟} 木香

石薊

牛膝

芫花^{附子}

當歸

芍藥

五味子

丹參

沙參

玄參

苦參 知母

貝母

紫苑

百合

天花粉^{結核及}

續斷

秦龜

木通^{通草}

澤瀉

車前子^{根葉}

扁蓄

燈心

草薢^{梁杜}

白鮮皮

金銀花

甘菊花

升麻

紫胡^胡 獨活^{羌活}

細辛

紫蔚子^{鹽附}

防風

荊芥

紫蘇^{附子}

薄荷

乾葛

麻黃

白芷

藁本

天麻

香薷

黃蓮

胡黃連

黃芩

龍膽草

何首烏

桔梗

藿香

香附

白豆蔻

草豆蔻

草果

肉豆蔻

縮砂仁

玄胡索

姜黃^{附子}

薑黃

蓬莖

京三稜

欽冬花

茅根^{附子}

白前

淡竹葉

冬葵子^二

葶藶花

地榆

蕤黎

半夏

南星

附子

天雄

白附子

桑休

大黃

商陸

芫花

大戟

甘遂

續斷子

芫麻子

射干

常山

馬兜鈴^{青木}

巴戟天

百部

旋覆花

紅花

大薊^{小薊}

夏枯草

葫蘆巴

牛蒡子

肉蓯蓉

鎖陽

淫羊藿

仙茅

補骨脂

芫絲子

覆盆子

骨碎補

鉤藤

蒲黃

海藻

澤蘭

艾葉

昆布

防己^種

威靈仙

水萍

牽牛子

紫葳花

使君子

木賊草 稀簽 青蒿 茵陳 益智仁 華撥 高良姜 海金沙 穀精草附月 青黛

連翹 馬鞭草 葶藶子 王不留行 瞿麥 地膚子 決明子草決明附 紫草 山慈姑 貫眾

狗脊 天名精附蟲 山豆根 白芨 藜蘆 營寔 蛇床子 景天 蘭葉 懷香附蟲

黃精 蘆薈 阿魏 蘆根附竹

第四卷 本草下木部 果部 穀部 菜部 金石部

木部

桂樹附心 松脂附松子 附 茯苓附神 琥珀 柏子仁 側柏葉 枸杞子 地骨皮 槐花附子 槐

酸棗仁 黃蘗 楮寔 乾漆 五加皮 蔓荊子 辛夷 桑根白皮桑葉桑子桑枝桑耳桑寄生

杜仲 女貞寔 槿仁 丁香 沉香 檀香 降真香 蘇合香 乳香 沒藥 安息香

麒麟竭 龍腦香 金櫻子 竹葉附竹 烏藥 海桐皮 大腹皮 合歡 五倍子 梔子 蕪荑 枳殼附寔

厚朴 茶葉 猪苓 烏藥 海桐皮 大腹皮 合歡 五倍子 天竹黃 密蒙花 巴豆

蜀椒 胡椒 橡斗子 木鱉子 水楊葉 柞木皮 欖櫚皮 川槿皮 皂莢附子刺 訶黎勒 棟寔

檉白皮 郁李仁 雷丸 蘇木 沒石子 木瓜 蓮子蓮藕蓮花附 橘皮附肉 青皮 香櫟

大棗附紅棗 芡寔 烏梅附梅 柿附霜乾 勃薺 枇杷葉 甘蔗 白沙糖 紅沙糖 桃仁附桃 杏仁

梨 橄欖附 胡桃 龍眼 山查 榧子 石榴皮 胡麻 麻仁 麻油 飴糖

黑豆 赤小豆 萊豆 糯豆 淡豆豉 麥蘗 神麴 穀芽 酒麴 醋 罌粟殼

瓜蒂 白芥子 萊菔子 乾姜附姜 生薑附皮 葱白 大蒜 韭

金石部

金箔附箔 自然銅 銅青 黃丹 密陀僧 紫石英 硃砂附銀 雄黃 石膏 滑石

赤石脂 爐甘石 鍾乳石 海石 陽起石 磁石 青礞石 花蕊石 食鹽附鹽 朴硝附硝 蓬砂

硫黃 白礬

土部

伏龍肝 百草霜 墨

人部

髮 牙齒 乳 津唾 紅鉛 人溺秋石附 金汁 人胞 天靈蓋

獸部

龍骨 麝香 黃牛肉 牛黃 阿膠 熊胆 象皮 鹿茸附骨肉 羊肉附角肝腎 狗肉附狗寶

虎骨附爪 犀角 羚羊角 獺肝 脰臍臍 猪脊髓附血肝腸肺付

禽部

鴨 烏骨雞雞冠血雞屎白雞子卵 淘鷺油 雀卵 五靈脂

蟲魚部

蜂蜜 露蜂房 牡蠣 龜甲 鼈甲 真珠 桑螵蛸 海鯨鱗 瓦楞子 石決明 蟹

新州白花蛇 穿山甲 白殭蠶 雄蠶蛾 斑猫 蟾酥 蝦蟇 水蛭 蝨虫 麝虫

蜈蚣 蟬殼 蟹

第五卷

傷寒

第六卷

真中風 類中風 傷風 虛癆

第七卷

水腫脹滿 積聚 反胃噎塞 瘧疾 痢疾 泄瀉

第八卷

頭痛 心腹諸痛 腰痛 疝氣 淋症 小便閉癰

目錄 凡例

第九卷

大便不通 小便不禁 遺精 赤白濁 痰飲 欬嗽 喘

第十卷

痺 痿癰 恐 健忘 不得卧 不能食 汗 黃疸 霍亂 嘔吐噦

凡例

一是刻志本內經。凡先賢名論與經旨異贅者。收採無遺。間有十慮一失。匪敢臆說妄評。咸以經文正其偶誤。具服者必能鑒也。

一方書充棟。非繁而快。即簡而多漏者也。是刻洗盡浮辭。獨存精要。約而實該。使學者一覽無餘。更不必他求矣。一脈訣。即舊刻四言賦。今改而刪補者。居十之七。俾初機便於誦習。然限於字句。有未盡之意。則以註釋詳之。零補心忒一帙。或予獨得。或摘名言。皆診家當亟聞者也。

一藥性賦。舊刻每味止有一句。豈能盡其用乎。茲者仍用賦體。有用必詳。少則三四句。多至十餘言。復加註釋。期於詳盡。并按禁忌。以戒妄投。

一傷寒邪氣慘毒。頭緒繁多。小有不當。同於操刃。茲者簡要詳明。方法大備。闢千年之秦蕪。張暗室之明燈。

一病機。先祖述內經。為之註釋。次採集名論。參以管窺。更加圈點。條證名用。口辨證用。△緊關用。○獨得用。◎說弊用。使讀者醒心快目。了了分明。

一醫案。二十年來。案帙頗多。茲摘其稍異者。附於病機之內。僅百一耳。

一古方最多有相類者。有險僻者。有漫布者。概為刪去。但以切要者。載在各證條下。蓋已十有餘方。若夫神而明之。存乎其人。

門人黃雷錫清伯父參
姪孫李廷芳衡伯父訂

傷寒

黃帝曰熱病者皆傷寒之類也其死皆以六七日之間其愈皆十日以上者何也
至夏變岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也巨大也太陽為六經之長統其脈連於風府故為諸陽主氣也風府者腦之府也
諸陽之氣故主之傷於寒也則為病熱雖其不死起而於表則玄府閉而氣不得其兩感於寒而病者必不免於死
兩感者陰陽俱傷表裏同病也太陽與少陰同病則頭眩身重而脈微三陽俱傷水漿不入皆不知人六日當死也傷寒
一日巨陽受之故頭項痛腰脊強太陽之經從頭項下肩膊挾脊扶腰中故其見病如此二日陽明受之陽明主肉
其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥也胃不和則脾泄三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛
而耳聾咽乾口渴下利不渴者三陽已盡將入太陰故為半表半裏之經仲景曰脈弦細頭痛發熱者屬少陽口苦
受其病而未入於藏者故可汗而已三陽入藏可汗而解四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而噎乾嘔失
汗解則傳在三陰自太陰始也仲景曰脈浮而緩手足自利者太陰受之五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴
自屬水而太陰濕滿而飲食不化也六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮至厥陰而六經傳變邪氣
曰少陰為病脈微細但欲寐也六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮至厥陰而六經傳變邪氣
太陽經病若渴者自入於中病飲不欲食則吐蛇下之利不止經傳太陽傳少陽者名曰越經傳太陰傳少陽者名曰越經傳
或傳太陽傳少陰者名曰越經傳太陰傳少陽者名曰越經傳太陰傳少陽者名曰越經傳太陰傳少陽者名曰越經傳
陽明合病有太陽少陽合病有少陽陽明合病有少陽陽明合病有少陽陽明合病有少陽陽明合病有少陽陽明合病有少陽陽明合病
三陰三陽五臟六腑皆受病營衛不行五藏不通則死矣
內經五臟六腑皆受病營衛不行五藏不通則死矣
血運行周身不通所謂其死而有六七日者如之傷人劉宗素謂傷寒皮寒者傳足不傳手其說蓋出此篇而誤矣蓋夫氣之
肺主氣而心主血心火與肺金相克心火與肺金相克心火與肺金相克心火與肺金相克心火與肺金相克心火與肺金相克心火與肺金相克
藏六腑皆病豈手經不在內乎然經言傳變不及手經者何也足之六經可盡用身上下不通此篇而誤矣蓋夫氣之
言矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰

腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而愈十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣
所謂其愈皆十日以上者如此又有言傷寒以不服藥為中醫者其說本於此不知經文帝曰治之奈何岐伯曰治之為氣實者言也若正虛邪實則死譬如大瀉洪滿不為援手而聽其自渡全活者衆希矣
各通其臟脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其未滿三日者可泄而已
各通者言各明經脈隨証施治也未滿三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳正理論云脈大浮數在表可汗脈實沈數在裏不可汗數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞爾形毋勞爾神形神並守偕行於閉壅封藏之本者也
一有不謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月即發名正傷寒伏而不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞
治之或差反掌生殺自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶節菴曰得其要領易於拾芥脈證於理而已求之多岐則支離繁碎如涉海問津矣脈證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其常通其變也多岐者蔓衍之方書也余有感於斯言約六法以盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散寒勝之時陰勝之藏陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛涼一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍緩但見痞實者攻之更緩或行血畜或逐水傷輕重緩急隨証靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣為陽氣虛則寒故溫即是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳令人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可惜已如屢散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而大不遇陰氣不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除溫中則寒自散此必見衰微之陰服者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知釋其義夫正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈證之陽者假實也脈之陰者真虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用藥至為穩當不論浮沈大小但指下無力重按全無便是伏陰然則沈小者人知為陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實

而病者攻之即愈雖不服藥經蓋即安何足慮也。所可慮者惟挾虛耳。奈何淺庸之輩不察虛實但見發熱動手使攻虛而攻之無不死者。且曰傷寒無補法謬之甚矣。獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇。垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇。東垣丹溪即庵亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也。謂傷寒無補法可乎。大實者不約可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者旣傷寒之要矣何必求之多岐哉。

傷寒十六證傷寒者寒傷營血脈浮而緊頭痛發熱無汗惡寒。傷風者風傷衛氣脈浮而緩頭痛發熱有汗惡風。

傷寒見風者旣傷於寒復感風邪惡寒不躁其脈浮緩。傷風見寒者旣傷於風復感寒邪惡風其脈浮緊。以上四証皆冬月即

病。溫病者冬受寒邪來春乃發乃發熱頭痛不惡寒而渴脈浮數。溫瘧者冬受寒邪復感春寒。風溫者冬受寒邪

復感春風頭痛身熱自汗身重嘔噦欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮。溫疫者冬受寒邪復感春溫時行之氣

溫毒者冬受寒邪春令早熱復感其邪。以上五証皆冬傷於寒而熱病者冬傷於寒至夏乃發頭痛身熱惡寒其脈洪

盛。傷暑者暑熱為邪自汗煩渴身熱脈虛。傷濕者感受淫邪身重而痛自汗身不甚熱兩脛逆冷四肢沈重胸腹

滿悶。風濕者既受淫氣復感風邪肢體重痛頸汗脈浮。痙者身熱足寒頭項強急口赤目赤口噤頭搖身反張

若先受風邪復感於寒無汗惡寒為剛痙先受風邪復感於淫惡風有汗為柔痙。

類傷寒五症。一曰痰中脫傳痰憎寒發熱自汗胸滿但頭不痛項不强與傷寒異耳。一曰食積胃中停食發熱頭痛但

身不痛氣口緊盛與傷寒異耳。一曰虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳。一曰脚

氣足受寒溼頭痛身熱肢節痛便閉嘔逆但脚痛或腫滿或枯細與傷寒異耳。一曰內癰脈浮數當發熱而惡寒若有

痛處飲食如常畜積有膿也胸中痛而咳脈數咽乾不渴濁唾腥臭肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮

甲錯腹皮腫急脈滑而數腸癰也胃脘痛手不可近胃脈細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而誤認傷寒禁其飲食必

死。

表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胸脇耳聾寒熱嘔脈浮而大或繁或緩。有汗脈浮緩無力表虛

裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞭滿大便不通腹痛腸鳴自利小便如常。譫語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿裏

縮而厥唇青舌卷脈沈細或沈實。腹鳴自利不渴唇青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脈沈微裏熱也腹中鞭大便閉

傷寒

屬中表裏俱無不
可下下小柴胡湯隨証如減

陰證身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入二便不禁面如刀割色青黑或喜向壁卧閉目不欲見人鼻氣自冷唇口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也陰毒者腎本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六脈沈細或尺衰寸盛五日可治六七日不可治陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脈浮微手足冷大便洩小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛於內真陽失守也

陽證身動氣高而喘目睛了了呼吸能往能來口鼻氣熱面赤唇紅口乾舌燥謔語能飲涼水身輕如常小便赤大便閉手足溫指甲紅陽毒者邪熱深重失汗失下或誤服熱藥熱毒散漫舌卷焦黑鼻中如煙煤咽喉痛甚身面錦斑狂言直走踰垣上屋登高而歌棄衣而走脈洪大滑促五日可治六七日不可治城皆喉蛾及見鬼神陽證似陰者手足冷大便閉小便赤煩悶昏迷不眠身寒卻不欲食口渴指甲紅脈沈滑或四肢厥冷陽陰脈沉滑指甲紅而溫此陽極於內真陰失守也

六經證治足太陽膀胱此經從頭項貫腰脊故頭痛惡寒發熱脊強然風與寒常相因寒則傷營惡寒頭痛脈浮緊而無汗用麻黃湯開發腠理以散寒得汗而愈風則傷衛惡風頭痛脈浮緩而有汗用桂枝湯充塞腠理以散風止汗而愈若夫風寒兼受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠密非辛溫不能發散故宜用也若春溫夏熱之證皆用羌活中和湯辛涼解之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯升麻湯治之此証有在經在府之別如目痛鼻乾微語發渴大便閉去衣被手揚足熱傳至少陽則寒熱而嘔胸脇痛口苦耳聾此為半表半裏之經表證多者小柴胡湯裏証急者大柴胡湯過此不已則傳陽明之府表証悉罷名為入裏惡熱謔語口渴咽乾不大便脈沉實如痞滿燥實四証皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見痞滿實三証邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳櫟枳傷上焦之氣也但見痞實二証邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂喜忘前血証也宜桃仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腸痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄面如刀割引衣踈臥脈見遲數急宜溫之輕者理中湯

重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名為直中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證即與汗之一見裏證即與下之一見虛寒即與溫補但當以脈證為據不可以日數拘也

可汗頭痛項強皮脊腰背俱強身疼拘急裏寒發熱無汗脈浮數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脈浮煩再汗之不可汗無表證者不可汗脈沉不可汗尺脈遲不可汗脈微弱者雖盛寒不可汗咽中閉塞者不可汗諸

動氣者不可汗淋家不可汗亡血虛家不可汗厥者不可汗汗家不可重汗太陽與少陽併病頭項強痛

或眩胃心下痞不可汗脈弦細頭痛面熱屬少陽不可汗音范雲連傷寒時武帝有九錫之命謂徐文伯曰可連愈

開道夕死可矣况二年未遂以蒸法或汗而愈後二年果卒虛者其可輕汗哉

可吐病在膈上者可吐汗下後虛煩懊懣者可吐

不可吐脈虛不可吐厥逆者不可吐膈上寒乾嘔宜溫不宜吐

可下汗後不解邪傳胃府可下潮熱腹痛脈實可下陽明多汗譫語有燥糞可下潮熱手足腋下汗出譫語者

可下吐後腹滿可下凡臍腹硬或痛不可按者可下下後不解臍腹硬痛可再下結胸脈不浮可下少陰

病下利清水其色青者心下必痛口乾者可下太陽証熱結膀胱小便不利小腹急結其人如狂者血蓄也可下

陽明證其人喜忘大便黑必有閹血可下陽明無汗小便不利心中懊懣必發黃可下

不可下表未解者不可下腹脹可按而減者不可下諸虛者不可下陽微者不可下咽中閉塞者不可下

諸動氣者不可下脈弱者不可下脈浮大者不可下小便清白者不可下陽明病面赤心下雖鞭滿不可下

用火法以大燒地布桃葉梅葉亦可設席置病人於上即汗出或醋炒香附熱熨胸背即汗或置火於床下或艾炷

用水法傷寒思飲水為欲愈若不與便不愈若恣飲則水停宜以新汲水少與之待再思再與熱甚者以青布浸新

水中置病人胸前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口若表未解及陰證似陽者忌之

發熱翕翕而熱者表也羌活湯蒸蒸而熱者裏也輕者承氣湯重者大柴胡湯半表半裏者表裏俱熱而輕於純在裏也小柴湯至於

三陰發熱則有腹痛肢冷脈沉下利為異湯潮熱屬陽明一日一發日晡而作陽明內實也大便秘者小柴湯表未罷

者小柴湯煩熱兼渴竹葉石膏湯心煩不眠酸棗湯煩而心悸小建中湯煩而悶者梔子湯熱者白虎湯寒者附子湯

發自示小賣卷五傷寒

惡寒雖熱不欲去衣被發熱惡寒者陽也攻裏下後不解發熱而渴惡寒惡寒而潮熱桂枝湯加口渴心煩背惡微寒惡寒者虛也附子湯惡風風不惡寒太陽惡風無汗而喘麻黃湯有汗桂枝湯吐下後不解表裏俱熱時時惡風燥渴而煩白虎湯汗多亡陽惡風

自汗惡風寒者桂枝湯惡寒自汗表虛也小建中湯或黃建中湯自汗不惡風寒表證罷裏證實也桂枝湯汗多小便利必津液竭大便雖鞭不可攻宜蜜導用蜜於銅器中微火煎精凝攪之勿令焦自汗而渴小便難五苓汗多不止曰亡

陽桂枝湯兩桂枝附子湯外用白朮黃芩通身汗盜汗在羊表半裏臆有熱也頭汗出小建中湯頭汗出小便難者死手足汗大便燥謔氣寒不能食小便不利水穀不分手足汗者理中湯

頭痛太陽少陰有身熱無頭痛厥陰有頭痛發熱無汗惡寒大便六七日不通頭痛有熱小便清者不在裏仍在表羌活頭痛甚者必衄川芎少陽頭痛胡頭痛寒熱寸脈大瘕厥也散厥陰頭痛嘔而吐沫吳茱萸陰頭痛脈微遲為欲愈如不愈小建中湯陽明頭痛不惡寒微惡熱不大便調胃承

身痛太陽脈浮身痛無汗麻黃湯陽明下證已見但身痛者表未解也麻黃湯發熱有汗身痛桂枝湯陽明脈浮身痛葛根湯汗後脈沈遲身痛血虛也中陽陰毒嘔逆下利身痛如被杖唇青白一身盡痛發熱惡寒面黃熱結瘀痛發熱面黃二便反利甘草附子湯一身盡痛發熱發黃頭汗出背強小便不利淫也一身盡痛發熱面黃熱結瘀

血也抵當湯筋惕玉瞤汗多亡陽筋肉失潤動兼肢冷者輕者茯苓桂枝甘草白朮湯汗吐下後見此者先服防風白朮湯胸脇滿胸脇多表證葛根喘而胸滿麻黃杏仁脇下痞鞭中胸脇俱滿或鞭痛或嘔或不大便舌上白胎柴胡

邪在胸汗下之而煩熱梔子散胸中痞鞭氣上冲喉寒也散陽明少陽合病下利身熱脇痛柴胡汗後頭痛心痞脇

痛

滿湯

結胸病發於陽而反下胸脈浮者先以小柴胡解表然後下之按之則痛小結胸也胸脇不按亦痛大結胸也胸脇

懷躁渴實熱結胸也三黃瀉血結胸者小腹滿小便不利飲水不散水結胸也胸脇用陷胸等藥不效者

煩亂欲死宜水漬法中熱除為度

痞滿而不痛病名曰痞病也輕者通用枳桔胸滿脹滿手足溫按之濡關上浮者連瀉乾嘔有水氣

下利腹鳴心下痞瀉胃寒效逆湯中關脈沉緊大柴胡

大腹滿六七日不大便腹滿常痛者承氣腹滿時痛者桂枝芍腹滿吐食中湯汗後脹滿厚朴半夏甘腹滿漉漉有

聲水與氣也半夏茯苓

小腹痛滿下滿也胸滿有物小腹痛滿小便利蓄血也重者桃仁承氣湯小腹痛硬滿小便自利發狂者抵當小腹痛手足

厥冷真武不結胸小腹痛按之痛冷結也元穴

腹痛陽邪痛者其痛不常按而痛甚為實右關脈實腹痛便閉承氣下之早因而腹痛中陰陰脈瀉陰脈弦腹痛洩

利建中湯或桂少陰厥逆或利而效四逆加五味厥陰小腹痛當歸四

咽痛證少陰不可汗不可下甘桔湯為陰厥陰陽俱緊主無汗有汗曰亡陽屬少陰當咽痛陽毒咽痛口瘡赤爛

六物湯或瀉非時暴寒附於少陰之經脈弱咽痛必下利湯用半夏桂甘下利咽痛手足微冷無熱證者湯中

腸痛往來寒熱腸痛胸痛小柴胡湯身涼表證乾嘔腸痛有水也湯

呃逆中景物效逆即此咳脈微細呃逆胃寒也橘皮乾薑半夏生薑湯脈洪大而呃心火上奔肺不得納甘草湯服約無效用

欬法確黃芩有等分失下呃逆大便實者小承

嘔吐噦嘔者聲物俱出吐者無聲出物噦者有聲無物太陽陽明合病當自利若不利但嘔嘔高根加少陽有嘔證

胡嘔而渴者茯苓湯先渴後嘔水停心下茯苓先嘔後渴此為欲解水飲後餘熱在胃而嘔者薑桂湯太陽少

陽合病自利而嘔生薑湯寒熱嘔而不渴藳附嘔而發熱心下多微煩煩胸中有熱胃中有邪陰陽不交腹痛欲

吐生薑湯三陽發熱而吐柴胡湯發熱六七日不解煩渴欲飲水入即吐散虛熱少氣逆欲吐竹葉石膏湯寒多而吐

湯中不飲而吐理中湯去汗下後胃虛而冷吐乾薑黃連黃少陰吐者真武去附吐逆二便秘厥逆無脈大承心下有

水氣乾嘔身熱微喘或自利龍湯不發熱不惡寒助痛乾嘔十棗自汗頭痛乾嘔桂枝乾嘔自利黃芩半裏寒外熱

脈微欲絕乾嘔通脈四咳嗽有聲無痰曰咳太陽證罷表未解心下有水氣乾嘔發熱而咳龍湯太陽發熱咳嗽方全太陽發熱嘔噦而咳柴

胡少陽寒熱往來咳嗽胸脇滿或泄利小柴胡去參棗少陰咳嗽真武少陰腹痛小便不利四肢沉重咳嗽者水氣也

真武湯加五味玉細平乾姜喘太陽無汗而喘太陽陽明合病胸滿而喘黃連邪氣壅盛而喘雖汗而喘不已宜再發之麻黃杏子誤下太陽利

不止喘而有汗脈促葛根黃連太陽汗後飲多水停而喘小青龙湯去麻黃加太陽下之微喘表未解也厚朴杏仁水

停心下腎氣乘心為悸為喘五苓散陰喘脈伏而逆理中湯喘而氣促腹滿大柴煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

煩躁太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗煩躁龍湯煩躁消渴五苓散下利咳嗽煩躁諸苓下利咽痛胸滿而煩諸

惡風大渴白虎加人參湯汗後脈大而渴白虎加人參湯夏至左右虛煩而渴發熱不惡寒竹葉石膏湯小便不利而渴必發黃茵陳五苓散

陰自利而渴人參湯小便清利下焦虛寒甘草湯心煩但欲寐或自利而渴少陰也陽明脈長而實有汗而渴承氣湯脈沉

滑熱實煩躁而渴枳實湯

口燥咽乾引飲曰燥少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脈弦小澀口乾脈浮緊微數白虎加人參湯陽明無大熱背惡寒口

燥咽乾引飲曰燥少陰病二三日口燥咽乾急下之大承氣湯

漱水不欲嚥此證屬陽熱不在經而在府也陽明身熱頭痛脈微漱水不欲嚥必發狂犀角地黃湯外證無寒熱漱水不欲嚥必發狂

此畜血也桃仁承氣湯

發狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

狂熱毒在胃併于心神志不定而狂少陽脈洪數面赤目脹大熱煩燥狂言欲走葶藶黃湯陽毒發

瘰癧熱極則生風緩風主伸或伸而筋急而汗出時益覆不周腰背手足搖擗根湯脈浮數有風聖散風通血不養筋

動氣臍者脾中州以行四藏之津液左右上下皆不宜干中州散此證須手探之切勿忽也四旁有動氣

命散氣

剛瘰癧瘰癧
必發陽中
瘰癧曰身
熱足寒頭
項強急
汗出惡寒
頭熱面赤
背反張口
燥脈沉細
如瘰癧狀
是也若先
受風復感
寒無

陰陽為陽中為陰脈浮緊數為陽沉細濇為陰陽證易治陰證難治通用附子柔經去麻黃陰經厥逆筋脈

危急汗多木散
 閉目合眼風散
 胸滿口噤臥
 不着席牙
 牙緊急氣
 頭項強小
 腹滿小
 便不利五
 風血燥
 當歸

四時令謂之四次。衣已用盡人皆愛之曰四次。逆氣不通脈四次。事加理中。

手足厥逆逆即名厥也 厥逆用酒經踞臥惡寒引不自覆不飲水下和清穀湯湯 厥不至者逆湯 厥遲弱湯湯 手足厥冷逆 胃中不和而欲食逆 小澤月帛人用手足溫大干而解急風五味子湯湯 倉房土川反危逆 黃巢穴逆 逆者數會逆 胃中不和而欲食逆 小澤月帛人用手足溫大干而解急風五味子湯湯 倉房土川反危逆 黃巢穴逆 逆者數會逆

人排御沁言之流濁
實意于朋面色入注月絲衣色三三注力注千角急用

吳殊歌而自熱黃者人參歌而渴者白虎歌而季羌台其水茯苓甘歌而臺熟下民警吾白虎者易受氣今詢下各則

易氣不施手足厥逆脈乍緊心滿而煩病在胸中先吐之瓜蒂先發熱而後厥者手陽足鄭貞樂歌水畏熱天更必小

便赤。悌鬱大抵熱深厥亦深脈沉滑頭面有汗指甲溫皆伏熱也。大陽小承

頭眩上虛半表半裏中陽虛頭眩葛根風家多頭眩上方同口苦咽乾頭眩小柴陽明頭眩不惡寒能食而欲飲茯苓白

太陽病發汗。汗不止。眩暈身瞤動。振振欲僻地。湯真武

衄血鼻血也太陽病衄血及服桂枝後衄者為欲解犀角地黃湯脈浮大發熱下利臭衄乾嘔黃芩芍藥湯煩渴欲飲水水入

即吐先服五苓散自利而血淋黃升少陰病但厥無汗而強發之必衄名下厥上竭為難治當歸四逆湯黑錫丹汗後執退鼻

血不止新汲井水蘸紙數層貼頂上及項脊溫則易必止

吐血當汗不汗熱毒深入故吐血內有瘀積湯桂枝湯當湯服桂枝後吐血或解地黃湯血紫黑成塊脈遲細口不渴小便

清加丹皮

血太陽病不解，熱結膀胱，發狂，血自下。桂枝湯熱在下焦，小腹痛滿，小便不利，其人如狂，桃仁承氣湯。
下血太陽病不解，其人如狂，熱結膀胱，血自下者，愈若不愈。桂枝湯小腹痛滿，當少陰下血，桃花腹滿身熱，下膿血。

小便不利，已汗復下，小便不利，心煩。小柴胡湯太陽汗後，脈浮，小便不利，微熱而渴，五苓散。
身黃，小便不利，腹微滿者，茵陳湯。
大便乍難乍易，微熱有燥屎也。承氣湯
潮熱，大便泄，小便不利。桂枝湯
風溼自汗，身重，小便不利，子湯。熱鬱不通

小便自利，太陽病，小便自利，以飲水多，心下悸。桂枝湯
身黃，小便當不利，今反自利，其人如狂，下焦蓄血，熱而

小腹滿，應小便不利，今反自利，蓄血也。抵當湯
二便俱利，脈沉遲。四逆

小便數，頻來而太陽汗，吐後，小便數，譫語。調胃承氣湯
太陽自汗，四肢拘急，心煩微惡寒，小便數，甘草乾薑湯。
發黃，發熱，身盡痛，面目俱黃，太陽中溼，小便赤，熱不去，瘀血在裏而黃，小便微利，赤黃連翹往來寒熱，身痛發黃，胡加

瀝子，發熱，頭汗，渴欲引水，小便利，大便快發黃。茵陳湯
小便不利，四肢沈重，似瘧不欲飲。茵陳湯
傷冷脈虛，小便如

常，變為陰黃。理中湯
下之太過，脾虛津竭，飲水自傷，此陰黃。茵陳湯
發斑，熱甚，傷血裏實，表虛發為斑也。斑見紫黑者，十死一，生或陽證誤溫，或當汗陽毒結熱，古卷焦黑，鼻如煙煤，狂言

見鬼，面赤，錦斑，陽毒升，赤斑咽痛，麻疹升，表證多者，黃。已上消散
斑出咽痛，諸細細咽之，赤斑，大青，四通用，升麻

連四物湯，黃，久後發斑，溫毒也。黑膏化毒丹
溫毒煩渴，便實腹痛，赤斑，氣汗下虛極，發斑，白虎湯加

孤感，失汗所致，食少胃空，蟲蟻五臟故，唇口生瘡，虫食其藏，則上唇生瘡，為惑虫，食其肝，則上清熱，黃連，犀

殺虫，雄黃，銳散，為

多眠，太陽脈細，病多眠，外已解也。小柴胡湯
尺寸沉細，但欲寐者，少陰證也。四逆
陽脈浮滑，陰脈濡弱，多汗，或發汗後，身猶

灼熱，喘息多眠，風溫也。姜糖

不得眠，眠安，吐下後，不眠，酸漿吐下後，懊憹不眠，恍惚大熱，嘔語不眠，黃連解，少陰病二三日已上，心煩不眠，黃連
太陽大汗，胃乾不眠，欲飲水者，少與之，下後渴而不眠，諸苓，脈浮，小便不利，不眠，豉，下後復發汗，不眠，無表

證脈沈乾薑附子湯

短氣呼吸短促不能接續似喘汗出不徹故短氣葛根加腹滿短氣邪在表為虛甘草附風溼相搏汗出短氣小便不利

利惡風不欲去衣甘草附水停心下短氣五苓散乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和射漿太陽下之早心下硬結胸

短氣胸滿

蛇厥即吐蛇也胃中虛冷理中丸或四逆湯吐蛇而渴理中湯加大

百合病必寒無寒似熱不熱飲食不食欲臥不臥欲行不行黑不通用小柴胡湯加百合血熱百合地一月不解而

渴百合一斤水二十

陰陽易男病新瘵女與之交曰陽易女病新瘵男與之交曰陰易細考之即女勞復也有謂男病愈後因交而女病女病愈後因交而男病理未明古今未嘗見此證也證狀體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不

欲舉眼中生通用燒散取女人視襠近處男視及新瘵後大虛因交復作垂死獨參湯調燒根散多有古用藥湯

寒者當歸白

勞復非但強力持重若捕沐脈虛者補中益氣湯挾外證者則謂之復非為勞也小柴

食復新產胃虛食稍多則腹滿脈虛煩熱便秘大柴胡湯輕者仁陳湯消導後熱不退補中益

通經不解則再傳是為通經潮熱者實也已解如芒硝外嘔微煩胡蘆過經譫語脈實當下調胃承

汗後不解或表邪未盡或邪傳汗後大如瘧狀再汗之麻黃汗後心下痞鞭嘔吐不和大柴大汗大渴煩而脈大加人

與之若脈浮小便不利微熱消渴五苓散汗後脈洪數煩渴五苓散汗後脹滿厚朴生薑汗過多心悸發顛桂枝甘

寒表虛也脈細神倦芍藥甘草太陽汗出不解發熱心悸肉瞤真武汗後身痛脈沉桂枝加芍

肢疼下利惡寒四逆汗後臍下悸欲作奔豚桂枝甘草

下後不解下後熱不去心中結痛乾薑下後心煩腹滿臥起不安梔子厚太陽桂枝證誤下之利不止脈促汗出表未

解葛根湯黃陽明下心下懊憹有燥屎承氣湯太陽下後脈促胸滿桂枝芍大下後脈沉遲厥逆下利咽嗑不利吐

膿血麻黃汁