

增廣驗方新編

印行

上海錦章圖書局

癰疽論	癰毒治法	癰毒諸症	疔毒
瘡毒	癰毒	疔毒	瘡
麻瘋	遊風丹	瘡風	瘡
癰毒治法	癰毒諸方	陰疽	瘡
內外備用諸方	急救	瘡	疔
解救諸毒	誤吞諸物		
煙酒醉傷	戒洋煙癮		

(五)

附王洪緒先生全生集自序 幷凡例

明劉誠意伯言藥不對症枉死者多余曾祖若谷公秘集云癰疽無一死症而諸書所載患生何處病屬何經故治乳巖而用羚羊角用治橫痃而用生地防已治療應惡核而用夏枯連翹概不論陰虛陽實惟以引經藥倍以致乳巖構瘡成功不較瘰癧惡核潰久成怯全不悔引經之藥慎又諉言曰疽百人百可到泉鄉夫紅癰乃陽實之症氣血熱而毒滯白疽乃陰虛之症氣血寒而毒凝二者以開腠理為要腠理開紅癰解毒止痛即消白疽解寒化凝立愈若憑經而失症治者藥之對經而實背症也世之患陰疽而斃命者豈一人乎如以陰虛陽實別治癰疽無犯症之語確矣余曾祖留心此道以臨危救活之方大患初起立消之藥一一筆之於書為傳家珍寶余幼讀之與世諸書治法迥別歷症四十餘年臨危者救之初起者消之疼痛癢極者止之潰爛不堪者斂之百治百靈萬勿一失因思癰疽憑經並治久遍天下分別陰陽兩下惟余一家且余之治止於村境若遍通邑分身無術偶聞枉死無不痛惜特以祖遺之秘自己臨症並藥到病愈之方精製藥石之法和盤託出盡登是集並序而梓之以質諸世之留心救人者依方修合依法炮製依症用藥庶免枉死使天下後世知癰疽果無死症云爾

又全生集凡例

一癰與疽之治截然兩途世人以癰疽連呼並治夫癰疽二字即夫妻二字之連呼也若以癰藥治疽猶以安胎之藥治其夫矣是集以癰疽分別兩治皆執症執方之治法如照法炮製照症用藥救人之功余不敢分害人之罪余當獨認情願萬劫拔毛甘受屠家誅戮

一輯是集專論陰虛陽實認定紅白兩色是癰是疽治即全愈所載諸方皆藥到病愈切勿增減並貴重之物少分逐症治法開卷一目了然不必授師人人可精此道

一諸書惟馮氏錦囊附陰疽論與余家遺祕相符獨無消疽之方惟以溫補兼託為法且疽初起即如平塌安可用託託則難消余家之治以消為貴以託為畏即流注瘰癧惡核倘有潰者仍不敢託託則潰者雖斂增出者又何如耶故以消為貴也

一外科之虛實發現在患治患之法集中詳細即不諳脉息儘可救人故痘症之險悶順逆眼科之心肝脾肺腎皆現於外故亦不診脉也好學者察患色則知症照症治無不痊

一醫可寄生死開坊刻外科妄稱正宗載云症現七惡即死又載以桐油燒紅衣針針入瘻塊半寸用降藥為一條挿入針孔七日塊自開裂再以條挿七日其核自落又稱毒在皮裏肉內刀割深要寸許方能洩毒殊不知毒在皮裏膜外或應開刀尚忌深過三分恐傷內膜若深入寸許傷透內腑病人何能堪此極刑七惡之現頃刻世之宗其法治盡屬創徒此集惟疔用刺其外概不輕用刀針並禁升降痛爛三藥

一遍身患止有紅白兩色紅色癰白色疽癰疽即其名也有謂無名腫毒因未識症而云

一是書無論背項腰腹色白者言疽以疽藥愈之紅腫者言癰以癰藥愈之坊刻書稱以其藥與服不應再易某藥豈非以人試藥乎倘患在要緊穴道安可遭醫試望高明詳之

一世無爛久之癰惟疽初起失消或遭降炙針割以致年久不斂治之方藥集中詳細

一此集早到之處好學者自然以初起者消潰者斂余恐遲到處醫未經目人未習見是以任憑書坊翻刻速徧海內庶醫有生人之治而患無枉死之人遂余願矣

一載癰疽喉疔毒結毒諸瘡痔漏等症皆藥到病愈之方另有雜症五十方專愈五十病一服即效者之方另有雜症五十附梓集中無以人試藥之悞望有力者照方令就遇病施送或止取藥本如抄方傳人謗法製一是書所有之藥悉登末卷法製處不可忽略宜細心照法精製藥純效速

一傷寒症有轉經傳變故有醫不執方之說至如外科雜症全賴識症執方余年七十有二治病經歷四十餘年用藥從無一錯故敢輯是集以公諸世因名症治全生

增廣驗方新編卷十一目錄

痘毒

癰疽論

癰毒諸症

癰毒治法

膿癰

肺癰

懸癰

腸癰

肚癰

發背

搭手

魚口便毒

遍身肢節生瘡

筋骨疼痛潰爛生瘡

疔瘡

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢

身上疮瘡如塊如核

疔瘡

頭面諸疔

紅絲疔

刀鏟疔

拔疔根法

羊毛疔瘤

疔瘡出血不止

疔瘡走黃

羊毛疔

楊梅瘡

避楊梅瘡法

瞎眼瘡

貓眼瘡

天蛇毒

蛇形瘡

纏蛇毒又名纏腰龍

魚脊瘡

魚膽瘡

蜂窠瘡

蜘蛛瘡

蚯蚓毒

螞蟻瘡

蠅蠍瘡

葡萄毒

瓜藤瘡

癰疽瘡

天疱瘡

黃水瘡

熱瘡

癰疽瘡

凍瘡

小兒乳癬

皮症

漆瘡

疹子

大麻風

遊風丹毒

疥瘡

凍瘡

大麻風

遊風丹毒

血瘡

粉瘤

疖子音沸

斑症

白癥風

紫癥風即汗斑

漏瘤

肉瘤

血瘤

肉核

疣瘤

肉瘤

腋下癰瘡

疣瘡

疣瘡又名瘊子

肉瘡

血痣

癰毒雜治

癰毒宜戒

毒氣攻心

瘡痛不寐

瘡癢難忍

瘡自走動

趕移瘡毒

瘡毒腫痛不破

瘡口出血

瘡肉飛落

瘡生箭肉如飯如菌

瘡中生管

瘡中生蛆

諸物入瘡

驢馬糞入瘡

瘡口堅硬疼痛

瘡口潰爛不堪

瘡不收口

瘡愈復發

瘡毒腹脹如鼓

癰毒諸方

隔蒜灸法

隔蠟灸法

桑木灸法

豆豉灸法

葱熨法

葱薑膏

糯米膏

神燈照法

麻油飲

菜油飲

護心散

爪蒂散

菊花飲

水仙膏

鳳仙膏

芙蓉散

馬鳴膏

大蒜膏

肥皂膏

赤豆散

石灰散

松香散

牛肉散

牛糞散

雞腰膏

雞蛋飲

雞蛋油

燕泥散

鯉魚膏

蛤蟆散

蛤蟆膏

蛤蟆拔毒法

蜈蚣膏

紅膏藥

白膏藥

綠膏藥

綠雲膏

綠蠟膏

黃明膏

紫蘆散

銀青散

玉紅膏

金素丹

金花散

洞天膏

洞天嫩膏

洞天散苦膏

醒消丸

三黃丸

五通丸

五寶散

珍珠散

神仙東

愈瘡棗

大棗丸

山連散

代刀散

咬頭膏

繁藥

麻薦

藥綫

仙方活命飲

降癰活命散

黃芪湯

托裏解毒湯

千金內托散

二陳膏

保元湯

四物湯

摩風膏

黃連消毒飲

化堅二陳丸

橘皮竹茹湯

生軍散

二味拔毒散

貝葉膏

蘆薈散

蟾酥丸

繕蠅丸

皮金膏

梅花點舌丹

萬應紫金膏

陰疽症

陰疽治法

陰疽論名

惡核

失榮

陰疽論

遮腮

瘰疬

落頭疽

骨槽風

乳巖

井泉疽

甲疽

背疽

少腹疽

小腸疽

多骨疽

附骨疽

咬骨疽

刺骨疽

鶴膝風

橫痃

陰疽諸方

陽和湯

陽和解凝膏

犀黃丸

流注

子龍丸

拔毒法

回陽玉龍膏

真君妙貼散

陽和湯

小金丹

上海錦章書局石印

鐵熨法

風溼灸法

趕毒散

陰疽治驗

內外備用諸方

觀音救苦膏

回生再造丸

太乙紫金錠

青金鍊

平安萬應丸

金絲萬應膏

萬應神龜糕

金剛丸

大還丹

彭祖接命丹

無價保真丸

延壽丹

蒸膾補氣散

陰虛無上妙方

人乳膏

三黃寶蠟丸

班龍散

草霧丹

五香丸

七製固脂丸

扁鵲玉壺丸

九製硫黃丸

九製黃芪

七製香附丸

代參膏

湧泉膏

附桂膏

法製陳皮

羊腎酒

神仙粥

甘露茶

羊肉湯

烏雞湯

種子兜肚方

七味鴨

神仙鴨

固脂鴨

天然透邪丹

開闢散

土燮法

仙拈散

左歸丸

十全大補湯

補中益氣湯

逍遙散

金匱腎氣丸

左歸丸

右歸丸

六味地黃丸

八味地黃湯

元參地黃湯

涼血地黃湯

藿香正氣散

六一散

益元散

甘桔湯

荆防敗毒散

黃連解毒湯

龍膽瀉肝湯

五苓散

新增徐氏行軍萬應膏

王洪緒曰癰疽二毒由於心生益心主血而行氣氣血凝滯而發毒其性借名於西名藥宗經治而誤

患盤而踰徑寸者紅腫稱癰癰發六腑若其形止數分乃吉小癧按之陷而本即高頭雖溫而不甚熱者膜尚未成按之隨指而起頂已軟而熱甚者膿已滿足無膿宜消散有膿勿久留雖消一品立能消腫止疼為

療癰之聖藥白陷稱疽發五臟故疽根深而癰毒淺根紅散漫者氣虛不能拘血緊附也紅活光潤者氣血拘毒出外也外紅裏黑者毒滯於內也紫點不明者氣血不充不能化毒成膿也膿色濃厚者氣血旺也

膿色清淡者氣血衰也未出膿前癰有腰裏火毒之滯疽有腰裏寒瘀之凝即膿出後癰有熱毒未盡宜託疽有寒凝未解宜溫即患寒疽酷暑仍宜溫暖如生熟毒嚴冬尤喜寒涼然陰虛陽實之治迥別明古書總

未詳因立其旨備覽焉諸疽白陷者乃氣血虛寒凝滯所致其初起毒陷陰分非陽和通腠何能辟其寒凝已潰而陰血乾枯非滋陰溫暢何能厚其膿水益氣以成形血以華色故諸疽平塌不能逐毒者陽和一

轉則陰分凝結之毒自能化解血虛不能化毒者尤宜溫補排膿故當清膿毒氣未盡之時用其腰裏之功仍不可緩一谷一縱毒即退還一解一逐毒即消散開腠裏而不兼溫補氣血虛寒何以成膿猶無米之炊

也滋補而不兼開腠僅可補其虛弱則寒凝之毒何能覓路行消且毒盛者則反受其助猶重粟以助盜糧矣滋補而不兼溫暖則血凝氣滯執作釀膿之具猶之造酒不暖何以成漿造飯無火何以得熟世人但知

一概清火以解毒殊不知毒即是寒解寒而毒自化清火而毒愈凝然毒之化必由膿膿之未必由氣血氣血之化必由溫也豈可涼乎况清涼之劑僅可施於紅腫癰癰若遇陰寒險穴之疽溫補尚虞不暇安可妄

行清解反傷胃氣甚至陽和不振難消毒攻內腑可不畏與蓋脾胃有關係生死故首貴止痛次宜健脾痛止則惡氣自化脾健則肌肉自生陽和轉盛紅潤肌生調和補氣養血之劑仍以犀角羚羊連翹等性寒

之藥始終咸當禁服之

癰之與疽截然而途陽症為癰陰症為疽治法迥別世人以癰疽連呼並治貽害無妨古今方書雖有陰陽虛實之分治法難期盡善惟王洪緒先生

別號林屋山人所著外科全生一書乃世傳秘

本剖析陰陽虛實之理至精且備不施升降不用刀針經歷四十餘年用藥從無一誤開卷瞭如指掌可以不學而能書口前後兩集其價甚廉板存江南省城湖南湖北坊間亦有賣者各宜購置一部不惟自便亦可濟人留心瘍醫者尚勿忽諸

癰毒治法 凡患色紅腫痛根盤寸餘者是癰毒發三四日尚未作膿以洞天嫩膏貼之內服醒消丸熱陳酒送下三錢即止其痛夜間得睡次日皮卽起皺再服全消如過四五日將要作膿亦服醒消丸腫消痛止如作膿腫脹未破者用代刀散酒服卽穿外貼洞天膏數日收功如根盤數寸者在背心腦後腰腹肚臍陰囊等處險要之地用五通九醒消丸早晚輪服一次湯送下皮皺痛息若已穿破用託毒散醒消丸早晚輪服自有奇效如根盤不滿一寸亦紅腫者名癰用蟾酥丸梅花點舌丹卽愈此林屋山人經驗方也

癰毒諸症

肺癰 方見肺部

腸癰 腸癰有生於腸內者腹內脹急大小便牽痛如淋轉側搖之如水聲滑後則膿從大便出有生腸外者肚臍腫痛作脹或一足彎曲口有臭氣或膿自臍出甚則腸穿有蟲自臍中出勢難為計初起宜用牡丹皮散以消之潰爛則用參芪內託之劑○牡丹皮散 丹皮五錢苡仁一兩爪蔓仁去油二錢桃仁去皮尖研水煎服此係真人千金方也○又方 多服六一散用諸方見內外備膿血從大便出膿盡即愈至神至穩之方也○又方 皂角刺一兩至少酒煎至七分溫服膿血從大小便出而愈不飲酒者水煎亦可○又方 大黃炒朴硝鎔一丹皮 白芥子 桃仁各二錢心煎服小腹堅硬而熱按之則痛肉色不變或紅赤微腫出汗畏寒小便亦多脉緊實而有力服此神效

肚癰 肚腹生癰即腸癰也照上腸癰各方治之

臍癰 方見肚腹部

懸癰 方見頸項部

對口

發背 搭手 均見背部

魚口便毒 方見陰疽門橫痃症

遍身肢節生瘡 此名疳飲因風寒所搏血氣凝滯故也用質蠶每繭一個入白礬五分火煅過之後每繭一

兩另加陀僧五 白芷一錢研末用蜜調敷

筋骨疼痛滑爛生瘡 此因誤服輕粉及丹石諸藥以致毒凝筋骨日久不愈查解救諸毒門輕粉毒方治之

身上忽然紅腫遊走不定或痛或癢 此丹毒也照後蓮風丹毒各方以治之

身上疙瘩如塊如核

○此流注也與上遊風丹毒忽然而生者不同照陰疽門流注之方治之

疔瘡

人疔瘡好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根深難治有拔疔根法隨後

疔瘡發之最速有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死

至一月半月而終死者其毒最烈或發寒熱或發麻木或嘔吐或煩躁或頭暈眼花或舌硬口乾或手足青黑或心腹脹悶或精神沈困或言語顛倒此皆生疔之症其形或大或小或長或圓其色或白或黃或紅或紫或有紅絲名色甚多治法則一倘辨別不清以生黃豆令本人嚼之如無豆腥之味即是疔瘡 痛瘡多

生暗處或痛或不痛或癢或不癢發時人多不覺若不早治最易誤事有發寒熱數日而後生者有當時生者初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐等症即於遍身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻肩下兩腋手甲縫糞門陰戶等處更宜細看一日湏看數次有則照方醫治若前心坎後背心有紅點者即照後羊毛療方治之如尋覓不見取瓶中氣垢少許納口中必有一處痛甚即知疔瘡所在湏急宜刺出惡血以見

好血而止諸瘡及刀鎌疔忌用刀鍼餘疔不忘如毒重者卽服護心散

見癰毒或藥方或菜子油一碗

亦可

以免

毒氣攻心若服菊花飲亦可

○蜘蛛咬毒法 先將疔頭用磁片刺破尋活蜘蛛一个

越大越好

放疔瘡上蜘蛛

一見自能奔往吸拔其毒少時蜘蛛不動卽取放冷水中自活如疔未愈可用蜘蛛再行吸拔或另取蜘蛛

用之以毒盡為止無論疔在何處雖毒重痛極不省人事命在垂危立可回生此急救第一良法凡手指生

蛇頭瘡及毒蛇蟲蟲咬傷皆可照此拔毒 菊花飲

連根掘取自然汁一茶鍾滾酒兑服用酒

煮服亦可

不如生汁為妙

重者宜多服

渣敷患處留頭不敷益被睡卧出汗其毒自散無論生在何處雖飲氣絕亦可起

死回生至穩至便至霧清方皆不及此不可遲疑自慎無葉用根如無根即用藥店中乾白菊花四兩少甘草四錢酒煮溫服亦可。大戟膏見癰毒敷之即愈再發再敷無不神效。地丁飲 紫花地丁一兩白藜散 明礬三錢研細葱白廿二味共研爛分作七塊每塊以熱酒一鍾送下服完卽睡益被取汗如無汗再服葱頭湯一鍾少項汗出如淋其病若失此方不但治療一切惡症皆可治初起未成膿者更妙。烟油膏 用烟桿中烟油厚敷四圍留頭不敷少刻疔破出水而愈奇效如有紅絲者用烟油離絲三分處敷之絲即不走。又方 黃色糖雞糞厚敷四圍將疔頭挑破不敷極效。又方 生黃豆嚼爛敷之極效。

頭面諸疔 救唇湯 紫花地丁 金銀花各一兩 白蘿蔔二十個 桔梗 生甘草 知母 銻三水煎服至重三劑必愈。此方治頭面口角疔瘡俱效唇疔更妙。又方 一人唇口生疔七个頭腫如斗心悶神昏百藥不效後有人云此名七星攢月用蛔蟲搗爛敷之頃刻瘡口出黃水腫消神清次日全愈如無蛔蟲以五穀蟲一錢瓦上焙乾研末白礬三分蟬酥三分以燒酒溶化調勻敷疔上少刻疔亦破流毒水而愈矣。又方 凡口瘡生疔看大脈管中如有紫筋用銀針刺之出血即愈有人不知疔在何處但唇內癢極須臾半面腫硬痛甚見腿後起有紫筋刺之立效。又方 雄雞冠血點上其效如神。又方 大蝦蟆一個取肝貼之立消兼治面上生疔對口疔等症。又方 生蠅去壳搗融敷之即效。又方 烏色草魚去鱗取皮切片貼之隨貼隨乾乾則另換至數十次即破口而愈矣。

紅絲疔 此疔流走極快生於足者其紅絲漸長至臍生於手者其紅絲漸長至心生於唇面者其紅絲漸長至喉至則不可救矣手足兩處可用頭髮離絲一二寸遠緊緊捆住並將絲頭刺破或用燈火或用艾火在絲頭燒之絲即退散而愈不散再燒以散為度其效如神或照各前方治之亦可。

刀鎌疔 疗形如韭菜寬長一二寸肉色紫黑者是忌用針刺用前煎礬散服之並塘雞糞敷之即愈違則

毒歸心腑

羊毛疔 初起頭痛身發寒熱前心坎後背心有紅點如疹子形先用鐵桃破取出羊毛再用明雄末二錢青

布包紮綢熱燒酒於前心坎瘡上一二寸外四圍圍裹擦之漸漸擦入瘡眼其毛卽奔至後背心再於背心照前擦之其羊毛俱拔於布上卽埋入土中內服菊花飲或葱白飲地丁飲俱見護心散見護心散諸方毒俱可。

羊毛疔瘤此症忽起一泡其形如瘤內有羊毛亦名羊疔初起或頭痛或發寒熱即是用黑豆蕎麥各等分研末挑破敷之即愈內服菊花飲亦可。

疔瘡出血不止飲真麻油一大碗即止或飲菜子油更妙。

疔瘡走黃凡疔毒腫痛神昏甚至不省人事謂之走黃急用芒桂根搗汁服之立可回生或照前菊花飲地丁飲服之均妙。

拔疔根法疔毒重者好而復發此疔根未出故也若不急治再發則根愈深而難治矣草麻子一粒去油乳香一分去油共搗爛用飯和為餅貼之少時疔根自出又方葱白加蜜搗融將疔刺破敷之如人行五里其根自出入癰毒諸方門紅膏藥方拔疔最妙。

楊梅瘡此瘡最毒治不得法多致纏綿不救且最忌服輕粉則毒流筋骨難以斷根抑且不能生子如已服者可用解輕粉方見鮮枝諸毒內治之○紅棗丸紅棗三斤以杉木作柴煮之煮熟剥皮去核多取燒過杉柴枯炭磨細末和棗肉搗勻為丸如彈子大每日任意食之不可間斷雖瘡毒滿周身或服過輕粉及一切丹石隱藥致成結毒穿頂穿鼻潰爛不已多年不愈者服之大有奇效至穩至霑此治楊梅結毒第一方也愈後再服一兩月斷根紅棗能解丹石之毒杉木專祛溼熱之侵是以奏功如反掌也忌醋與辣椒青椒及一切發物半年外用蝦蟆散又方土茯苓兩木通白蘚皮防風錢一宣木瓜薏苡仁金銀花錢二皂角子細水煎服每日服一劑以愈為度外用蝦蟆散見癰毒敷之無論久近輕重潰爛穿頂屢試如神百發百中最忌食茶不服藥則不忌並忌醋與辣椒及一切發物半年終身戒食蝦蟆如不服藥即服前紅棗九外用蝦蟆敷之亦可又方大黃一錢山甲炒川厚朴白芷大楓子仁花椒甘草錢三水煎兑酒服毒氣從大便出七日全愈忌食一切與上同惟不忘茶與蝦蟆無論輕重屢試神驗不可輕視又洗藥方生甘草金銀花蒼朮白芷藿香槐花錢各三共煎水洗輕者內服前方外用此藥洗之即愈。

避楊梅瘡法 凡生楊梅瘡者在旁伺候親近之人難免傳染用

雄黃

川椒

去子各研末

杏仁

百粒蒸熟研

末燒酒打麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸開水送下於病人初發時服即可免也

瞎眼瘡

上高下深顆顆紫垂如瞎眼其中帶青頭上各露一古者是也用回陽王龍膏真君妙貼散

見陰毒門治之或後陰疽方更妙

方敷之必效如仍不愈用蝦蟆散

見陰毒門諸方門治之

或後陰疽方更妙

貓眼瘡

瘡似貓眼有光采無膿血痛癢不常飲食減少名曰寒瘡照上瞎眼瘡治之

天蛇毒

有人偏身潰爛似癩非癩呼號不已一僧視之曰此天蛇毒非癩也用秦皮又名松皮又名石櫟又名檉皮又名苦樹又名

滲

苦煮汁一斗日服十餘碗三日全愈

又草花間蜘蛛人為露水所濡乃生此瘡者亦名天蛇毒瘡可用

前方治之

天蛇大如箸而扁長三四尺色黃赤人遭其蠻不治必死

蛇形瘡

一人生瘡如蛇長數寸外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲即愈

纏蛇瘡

腰臍名纏此丹毒也生腰下長一二寸或碎如粟或紅腫堅硬用燈火向兩頭燒五次並用雄黃外敷

內服極效

又方 陳石灰麻油調敷即愈 又方 舊蠱桶瓶燒灰麻油調敷其效尤速或照遊風丹

毒各方治之

魚脊瘡

多生筋骨之間堅凝作痛初起白泡漸長狀如魚脊破流黃水此陰症也初起時無論已潰未潰宜

用隔蒜灸法

見癩毒門以通陽氣外用回陽玉龍散真君妙貼散

見陰門敷之或用後陰疽諸方更妙

魚臍瘡

窄而長腫此因風毒織結或氣血凝滯或誤食人汗所致用蠟猪頭骨燒灰研末生雞蛋白調搽敷

日即愈

蜂窠瘡

不拘何處形如用罐鑿一小孔納碎布數團火燒取烟從小孔出向患處熏之二三次即愈 又方

愈而復發者用鉛粉硃砂和蜜調敷神效

蜘蛛瘡

形如蜘蛛網不可忍用豆腐衣又名豆皮燒枯存性香油調搽

蠅蠍毒

形如珠顆成片成串或紅或白破則流水好而復發用穿山甲瓦上焙香油調敷雖多年不愈者無

不神效

蚯蚓毒 此症鬚眉皆落形似麻瘋或夜間身上有蚯蚓盤用食鹽數斤熬湯洗身數次內服淡鹽水一二碗極效不可悞為麻瘋如真是麻瘋令病人站立打銅鐵之風爐火傍望其臉紅者是麻瘋臉綠者非也兩手平指者亦是

指合處肉平指者亦是 蠼螋瘡 蠼螋又名搔甲俗名偷油婆又名解蟬其瘡初起如粟米漸大如豆更如火烙紫泡疼痛至甚者以春茶研末麻油調搽神效 又方 燕子窠泥和猪胆加酒調搽或照後漂疽毒各方治之

葡萄毒 小兒年五六歲額上忽起一顆紫色光亮形如葡萄頃刻周身皆有一老醫見之云此乃葡萄疔毒一見鼻血卽死因小兒飲食言笑如故病家不信至夜半忽鼻中血如湧泉而死○又一男子手腕上忽起一粒如紫葡萄半日亦見鼻血而死俱無藥救附錄於此以俟博識者立方施治○又一女子年十四手腕軟處生物如豆半在肉中紅紫色痛甚百方不效後用銀四兩白紙二張將銀揉熱擦之三日自落合而觀之前症似可照此施治 再前症即名疔毒又見鼻血其為熱毒內蘊無疑水銀擦之如不見效應即照前癰毒諸方門內 菊花飲菜油飲二方治之或可救也並用吳茱萸熱醋調敷兩脚心一日一換此引熱下行至妙法也

瓜藤瘡一身十餘個 即是尖尾芋 茄子葉 五月艾 葱薑 共搗爛醋煮敷擦

瘰疬瘡 手足肩背繫繩如豆如米大者如梅如李或赤或黑或白或青初生有痂一層痂內有核核有深根能爛筋骨 毒入臟腑卽死此熱毒也先將冰桃破用醋和微溫淘米水洗滌以芙蓉散諸方門治之自流毒水內服真菜子油亦可極效 又方 燕子窠連泥帶糞和初生百日內男孩糞調搽或真菜子油或麻油極效此系真人千金方也○又方 猪膽汁敷之流出毒水極效○又方 鯽魚長三四寸者一條亂髮一團如雞蛋大 猪油半斤同煎膏用罐裝好放水中拔其火氣三日後敷之極效○又方 男子尿桶中白霜敷之立刻清涼止痛乾則再敷○又方 鍋黑煙以燒草者佳燒炭者不可用 桐油麻油菜油均可 調搽卽效○又方 照遊風丹毒門防風升麻湯菜子油六安州茶葉各方治之至穩至效

天泡瘡 形如水泡者是用蓮蓬即蓮房 燒枯研末并泥調敷神效或用荷花瓣貼之或照後黃水瘡各方及癰

蟲諸方門松香散雞腰膏治之更妙人偏身生瘡泡如甘棠梨破則水流復

生內有小石一片方見卷十六奇病門

苗水瘡初如粟米瘡而兼痛破流黃水浸淫成片流處卽生由脾胃溼熱外受風邪相搏而成發於心下者。

若不早治則難救宜用青蛤散

蛤粉一兩真青黛鐵熟石膏二兩輕粉

黃柏錢五共研細末先用香油調

成塊次用涼水調稀塗之神效並治鼻中生蟲

又方蠶豆殼

及上焙未加黃丹少許以真菜油調敷麻油

亦可乾則再敷三日卽愈屢試如神

又方紅棗燒炭八錢飛黃丹

松香枯礬錢四共研為末麻油調

搽立效○又方輕粉樟腦錢二

大楓子去川椒各四十粒杏仁錢一并為細末和柏油燭搗勻敷之功效如

神柏油又名捲油又名白油即烏柏子油也或用癩毒門松臘散蘆薈散燕泥散雞腰膏均極神效

熱瘡其色紅而痛者是用男子尿桶中白霜敷上立刻清涼止痛乾則再敷或照上療疽瘡各方治之亦可。

漆瘡杉木屑煎水洗用

研末活螃蟹黃滑石和蜜調敷甚效此林屋山人方也有漆之處先嚼川椒敷鼻

孔可免漆瘡○又方晉眾培

柏木香油調敷或用韭菜搗汁敷或用白羊乳搽之均效○又方白蘿蔔葉

煎水洗立刻消三次全愈或用新荷葉煎水洗亦極神效

又方以活螃蟹搗汁滴入使毒水流出自愈

如已腫爛取生蠔黃塗之其爛更甚數日卽愈若再不效更用生大黃等枳壳錢水煎服二劑腹瀉而愈

不瀉再加芒硝

二以瀉為度緣漆瘡火盛則重非瀉不能愈也

癬瘡凡癬內有蟲治好復發非藥不靈蟲未盡也復發再治無不愈矣頭面生癬如入眼內卽成大瘻瘍矣

宜急治之新鮮皂角刺搗爛一二斤熬至將成膏時加好醋熬成稠將癬割破敷之日利日敷自有毒水流

出流盡再敷十日雖數十年陰頑惡癬無不斷根此林屋山人屢試神方

又方斑蝥五分生半夏末錢雞

蛋油調搽數次則痛必愈再發再搽雖多年惡癬無不斷根取雞蛋法見癩毒諸方

又方青藜粉成研細末加豬胆汁和融再炒再研用老薑一塊切開調藥搽之大痛卽愈再發再搽雖多年頑癬亦可除根

又方大蜂窩一个以白藜末填孔內火煅以藜融化為度研勻將癬扒破以牙硝水調搽一二二次痛則必愈

再發再搽必能除根○又方荔枝核磨醋將癬扒破搽之雖痛不妨數日卽愈再發再搽斷根○又方

用新棉花扯成如紙薄一層量癬寬大將棉花鋪貼用火向花上一點項刻燃盡當卽止癬而且並不焦痛

不須用藥極簡易效驗。只須一次全愈。倘次年再發照治一回斷根。又方 珠蘭花葉時時擦之。半月斷根。小兒乳癬 小兒初生症類疥癬先起手足次偏腹背纏綿不已先用瘡牽不拘多少去嘴研末煎湯浴之。或一日一次或一日二次毒出再用 真青黛 黃柏 枯礬 雄黃 百藥 煎硫磺各等研末溼則乾擦乾則香油調搽以愈為度名換形散。

皮疽 杏仁炒黑去皮尖研如醬搽上即愈或照癬瘡各方治之。

疥瘡 疥有五種乾疥溼疥蟲疥灰疥膿疥俗名臘泥瘡是也由各經蘊毒日久生火兼受風溼而成數日延及偏身最易傳染或癢或痛癢者內必有蟲不獨蟲疥然也治法雖多有效有不效有此用之而效彼用之而不效者後列各方五種疥瘡皆治古方有煉鴉一法瘡雖易愈然毒盡歸腹定成臌脹危症切宜戒之。如已成臌脹查癬毒雜治門本方治之。○黃香散 硫黃 川椒錢五共研末加葱薑頭各五錢和生豬油搗融用布包好烘熱時時擦之其效甚速。○又方 整塊川厚朴以真香油磨膿如醬加枯礬少許擦之數日盡退此膿窠疥瘡神方也。○合掌散 硫黃一鐵鎊一紅砒六共研極細如灰皮蔥汁調敷大碗內勿厚勿薄勿以碗覆瓦上取艾放碗下燒燻至药乾敲之如空碗聲為度取藥再研細末每藥一錢可敷數次臨用以右手中指粘滿香油再粘藥搽入左手心合掌磨擦止有藥氣不見藥形然後以兩手擦瘡每日早晚二次三日擦光再擦三四日即不發矣屢試如神並治陰囊溼瘡。○二美散 吳茱萸 硫黃 各等分研細如麪粉照上合掌散法摩擦每日二次愈後再擦三四日專治膿疥神效此方與上合掌散均林屋山人經驗方也。○又方 油胡桃又名紅棗肉各一水銀伍水片多少真小磨麻油 猪油四錢共搗融用網包裏擦之擦過即能止癢痛時向鼻中聞之數日即愈屢試如神。○又方 田螺煮熟酒炒食可除一身疥瘡。○又方 硫黃一鐵鎊一枯礬 五桔子各一以上共研末加頭髮錢生豬板油錢用青布包好向燈火上燒之有油用碗接住候冷用鍼挑破疥瘡將膿擠出用茶洗淨勿沾生水候乾取油搽抹不過三日全愈永不再發。○又方 硫黃一鐵鎊一松香三枯礬 五桔子各一以上共研末加頭髮錢生豬板油錢用青布包好向燈火上燒之有油用碗接住候冷用鍼挑破疥瘡將膿擠出用茶洗淨勿沾生水候乾取油搽抹不過三日全愈永不再發。○又方 硫黃一鐵鎊一核桃一核桃仁連皮用一水銀三共搗融用網包裏擦過即愈簡便而極效驗。○又方 核桃仁連皮用一水銀三共搗融用網包裏擦過即愈簡便而極效驗。○又方 核桃仁連皮用一水銀三共搗融用網包裏擦過即愈簡便而極效驗。○又方 大楓子仁五鐵水銀三共搗融用網包裏擦過即愈簡便而極效驗。

可太多放在手心中擦。习將左手心在肚臍眼上順着摩擦不可倒擦。擦至手心發熱即止。再用此藥一二錢。放右手心中擦匀。在肚臍眼上照前摩擦。擦至肚腹滾熱即止。每日一次。瘡上不擦。輕者二日即愈。至重三日斷根。有人遍身臘疥時發時愈。纏延三載。百藥不效。用此三日而愈。從此斷根。此治五種疥瘡第一神方。一切溼熱瘡疾皆治。珍之寶之。愈後宜食愈瘡棗。見後。療以補脾土。或另服健脾之藥亦可。如恐水銀入腹為害。病愈體壯之後。每早用真川椒要開七粒。滾水空心吞服。連服三日。其水銀自入川椒內。由大便而出。或用真川椒研末鋪牀上。蓋被睡臥。水銀即由毛孔而入川椒內矣。此法最妙。

凍瘡 橄欖核燒灰存性研末加輕粉少許。香油調搽神效。○又方 以蚶子殼煅煉極細。以麻油調搽。溼則乾擦。數日全愈。此秘方也。蚶子即反楞子。○又方 陽和解凝膏見陰疽門貼。一夜即愈。潰爛者貼三張。收功。此林屋山人方也。○又方 白芨磨敷即愈。○又方 馬糞黃水泡之。半日即愈。又方 蘿蔔菜橘皮煎湯先洗。用蠅殼燒灰研碎。麻油調敷。○又方 暑伏時搗大蒜為泥敷之上。年生過凍瘡之處。過一日一夜洗去。連三四日再敷一次。若連日敷之。則肉上起泡破皮矣。本年冬雖極寒。亦不再生凍瘡。凡小兒手足各處。雖未凍過。亦敷兩次。可以耐寒。此法可傳船夫腳夫。亦一德也。

大麻瘋此症各方凡殺蛇治愈者。皆能全愈。 麻瘋者。身上必有麻木之處。鍼之不痛。然後發現於外。若不麻木。則非麻瘋。遍身雖麻木數月。即發現於外。雖重易治。若年久病深。壞形變貌。鼻塌肉崩。手指脫落。足底穿爛。則難治矣。江西蕭曉亭著有麻門全書二本。專治麻瘋。所論病源最為透徹。其治法亦極神妙。板存廣東省城雙門底刻字店。麻瘋誘云正報似非妄談。若自信罪愆難逃。果能矢念為善。人力可以回天。即自信並無過惡。亦當力行善事。所謂善事者。守禮守法。常存善念。見善必為尤宜。謹戒殺生。並須放生。果能如此。不但病易愈。且為後嗣種福。所益多矣。曾在克廣五服方。昔在萬安縣百嘉地方遇一良醫。善治瘋癲惡疾。活人甚衆。余甚奇之。具金百餘求得此方。歸家後。適鄉隣有患此症者。依用此方。數月而愈。頃年以米。遠近用此方者。十愈八九。屢試屢驗。真神妙方也。○初服方 羌活 蒼朮 荆芥 防風 銀柴胡 元參 赤芍 黃芩 白鮮皮 枳壳 銀花 甘草 水煎服四劑 次服方 羌活 細辛 白芷 生地 防風 知