

本草醫方合編

柴胡苦平微寒味薄氣升為陽主陽氣

醫方集解卷二

下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之

邪熱肝胆心包三焦相火時珍曰行少陽黃芩為佐行厥陰黃連為佐

宣暢氣血散結調經昂按人第知柴胡能發表而不知柴

胡最能和裏故勞為足少陽經表藥胆為

藥血藥往往用之清淨之府無出無入其經在半表半裏法當和解小柴胡湯之屬是也若病在

太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

治傷寒邪熱仲景有大小柴胡等湯痰熱結實虛

勞肌熱冠宗頤曰柴胡本經並無一字治勞藥性論曰羣子皆言補勞

傷醫家執而用之貽誤無窮時珍曰勞有五若勞在肝胆心包有熱則柴胡

發表之劑發者升之散之汗之也表者對裏而言也三陽為表三陰為裏而太陽為表之清陽

明為表之裏少陽為半表半裏也邪之傷人先中于表以漸而入于裏始自太陽以及陽明少陽乃入陰

經由太陰少陰以及厥陰六經乃盡也治病者當反其在表而汗之散之使不至于傳經入裏則病易已

矣若表邪未盡而遽下之則表邪乘虛入裏或候補之則內邪壅閉不出變成壞症者多矣經曰善治者

治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也

麻黃湯仲景

治傷寒太陽症邪氣在表發熱頭痛身痛腰

痛骨節痛項背強惡寒惡風但有一毫頭痛惡寒尚為在表無汗而喘

脉浮而緊寒邪外束陽不得越故鬱而為熱經曰人之傷寒則為病熱寒初中人必先表即足太

陽寒水之經太陽為諸陽主氣乃一身綱維本經之脉起目眚上腦下項循脊抵腰行于身後故所過之

草

麻黃湯

麻黃湯

乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃
有熱或陽氣下陷則柴胡為升清退熱
必用之藥惟勞在肺腎者不可用耳寇
氏一繫攢斥殊非通論昂按楊氏秦尤
扶羸湯治肺痿成勞咳嗽聲啞體虛自
汗用柴胡為君則肺勞亦有用之者矣
嘔吐心煩邪在半表半裏則多嘔吐諸瘧寒熱東垣曰諸
瘧以柴胡為君佐以引經之藥李士材
曰瘧非少陽經慎用喻嘉言曰瘧發必
有寒有熱蓋外邪伏于半表半裏適在
少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出
與陽爭陰勝則寒即純熱無寒為瘧瘧
溫瘧純寒無熱為牝瘧要皆自少陽而
造其極偏補偏救弊亦必返還少陽之
界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼
他經則有之謂他經而不涉少陽則不
成其為瘧矣脉縱屬遷而弦之一字實
貫徹之也昂按瘧之不離少陽猶咳之
不離肺也

處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒惡風者當風而治
惡之故惡寒必兼惡風惡寒有陰陽之分惡風惟屬陽
經故三陰無惡風之症風為陽邪寒為陰邪也原病或
曰身熱惡寒熱在表也熱在表而淺邪畏正故病熱而
反惡寒或言為寒在表及熱在皮膚寒在骨髓者誤也
凡人之傷風暑溫皆有汗惟傷寒獨不汗出寒能滯血
又表實也氣上逆故喘邪在表故脉浮傷寒脉繁而傷
風脉緩者寒動急而風緩散也喻嘉言曰冬傷寒春傷
溫夏秋傷暑傷濕此四時正病也然夏秋亦有傷寒冬
春亦有傷暑傷濕乃四時之客病所謂異氣也冬春正
病有汗為傷風無汗為傷寒即夏秋
正病有汗為傷暑傷濕無汗仍為傷寒亦治太陽陽明合
病喘而胸滿表邪壅盛陽氣不得宣發故逆而作喘若
去表甚近非裏實雖有陽明然與太陽合病尚為在表
宜汗不宜下經曰陽明病脉浮無汗而喘者發汗則已
宜麻黃湯又曰陽明病應發汗反下之此為大逆或問
兩經合病當用兩經之藥何以偏用麻黃湯耶蓋邪自
太陽而來仍當提出太陽不欲
亦治哮喘症哮喘中風寒

時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益感于寒而作此湯散寒利肺病

甚孫琳投以小柴胡湯三服脫然琳曰哮喘者雖服麻黃而不作汗

此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈

虧熱有在皮膚在藏府在骨髓在骨髓

者非柴胡不可若得銀柴胡只須一服

南方者力減故三服乃效也時珍曰觀

此則得用藥之妙矣呂按據孫頭眩

氏之說是柴胡亦能退骨蒸也

目赤胸痞脇痛凡脇痛多是肝木有餘

宜小柴胡湯加青皮川

芎白芍又左脇痛宜活血

行氣右脇痛宜消食行痰口苦耳聾

肺之婦人熱入血室衝為血海即血室

邪在藏主血胎前產後諸熱小兒痘疹

在經主氣此足太陽藥也麻黃中空辛溫氣薄肺家滯藥而走太

五疳羸熱散十二經瘡疽血凝氣聚功

陽能開腠散寒

同連翹治血熱柴胡

陰虛火炎氣

之邪達之肌表

麻黃三兩桂枝二兩杏仁七十枚甘草一兩

數沸去沫內諸藥煎熱服覆取微汗中病即止不必盡

劑無汗再服凡用麻黃去節醋湯畧泡曬乾備用庶免

發汗為先汗出則愈活人云凡發汗病症仍在者三日

內可二三汗之令腰以下周徧為度王海藏曰表症當

汗脈浮急汗之脈沉緩汗之裏症當下脈浮緩下之脈

沉急下之三陽汗當急而下當緩三陰汗當緩而下當

急按汗有大汗解表微汗解肌之殊下有急下少與微和滲利之別

此足太陽藥也麻黃中空辛溫氣薄肺家滯藥而走太

陽能開腠散寒從此入仍從此出桂枝辛溫能引營分

本草

表

麻黃湯

二

升者禁用。銀州者根長尺餘。微白。治

勞瘵良。北產者。如前胡而軟。並良。南產

者強硬。不堪用。外感生用。內傷升氣酒

炒用根。中及下降用。稍有汗咳者。蜜水

炒。前胡半夏為使。惡皂角。

前胡辛以暢肺。解風寒。甘以悅脾。理胸

腹苦泄。厥陰肝之熱。寒散太陽肺之邪。

微寒一性。陰而降。功端下。氣氣下則火

降而痰消。氣有餘便是。能除實熱治痰

熱。孝慈家較品。古。西。高。霍亂小兒。甘氣

氣甘草甘平。發散而和中。經曰。寒淫于內。治以甘熱。佐

以苦辛是已。喻嘉言曰。麻黃發汗。其力最猛。故以桂枝

如駁馬。防其放逸耳。李士材曰。古云。冬不用麻黃。夏不

用桂枝。蓋以冬主閉藏。不應疎泄。夏令炎熱。不宜辛溫。

經所謂。必先歲氣。毋伐天和是也。又云。夏月不用麻黃。

兩說相反。何耶。或舍時從症。或舍症從時。臨時變通。存

乎其人耳。李時珍曰。仲景治傷寒。無汗用麻黃。有汗用

桂枝。未有究其精微者。津液為汗。汗即血也。在營則為

血。在衛則為汗。寒傷營。營血內滯。不能外通。于衛氣。氣

閉固。津液不行。故無汗發熱。而惡寒。風傷衛。衛氣外泄。不能內護。于營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱。而惡

風。然風寒皆由皮毛而入。皮毛肺之合也。証雖屬太陽

然面赤。怫鬱咳嗽。有痰喘。而胸滿。非肺病乎。蓋皮毛外

閉。則邪熱內攻。故用麻黃。甘草同桂枝。引出營分之邪。

達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。

加石膏。活人書。夏至後。加石膏。知母。是皆泄肺火之藥。

是麻黃湯。雖太陽發汗。重劑實致肺經火鬱之藥。理

有推陳致新之績明目安胎無外感者

忌用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降為不同肝胆經風痰

非前胡不能除皮白肉黑味甘氣香者良半

夏為使惡皂莢忌火

麻黃辛溫微苦僧繼洪云中牟產麻黃地冬不積雪性熱故過

服泄入足太陽肺兼走手少陰陽明心

腸而為肺家常藥發汗解肌去營中寒

邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治

中風傷寒中猶傷也頭痛溫瘧咳逆上氣風

鬱于肺經經曰諸痰哮喘喘哮喘宜瀉肺氣雖用

本意黃要草前胡麻黃

甘草外散風邪以救表代肝木以防脾伐以助胃

本而固脾使以薑棗行脾之津液而和營衛下後微喘

益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以泄肺熱也是桂

枝湯雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也王履曰

傷寒即病者謂之傷寒不即病者謂之溫暑其原不殊

故一稱為傷寒其類則殊施治不得相混仲景之書專

為即病之傷寒設不兼為不即病之溫暑設也今人或

以傷寒法治溫暑不過借用耳三陰傷寒寒症十居七

若溫暑但一于熱耳後人誤為通治遂疑諸熱劑不

敢用是未悟仲景立麻黃桂枝湯之有所主有其時矣

大苟知非治溫暑之劑則羣疑冰釋矣又曰傷寒即發于

甘

本

益

枝

傷

故

以

若

大

傷

大

麻黃而不出 赤黑斑毒 胃熱一曰斑症 寒之症故仲景曰大陽病發熱而渴不惡寒者為溫病 汗本草未載 表虛不得再汗 溫病如此則知熱病亦如此而不渴惡寒者非溫熱病

非使閉亦不可下 毒風癰痺皮肉不仁 矣或有不因新中風寒亦見惡風惡寒之症者蓋因表 虛熱達于表而傷表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒

目赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽 耳非傷風惡風傷寒惡寒也溫病熱病亦有先見表症 而後傳裏者蓋鬱熱自內達外外不能泄還復入裏而

夏月禁用 汗者心之液過汗則心血為 成可政之症非如傷寒從表而始也每見世人治溫熱 病誤攻其裏亦無大害誤攻其表變不可言此足明其

人參麻黃同用亦攻補法也東垣曰十 熱之自內達外矣間有誤攻致害者乃春夏暴寒所中 之疫症邪純在表未入于裏不可以溫病熱病同論夫

客皮毛腠理閉拒營衛不行故謂之實 秋冬傷寒真傷寒也春夏傷寒寒疫也與溫病熱病自 二葉輕清可以去之時珍曰麻黃太陽 是兩途豈可同治况傷寒直中陰經與太陽雖傷不及

經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經 鬱熱即傳陰經為寒症而當溫者又與溫病熱病大不 同其可混治乎一陽子曰傷寒傳足不傳手非窮理之

散而所入不同王好古曰麻黃治衛實 言也草薢劉子指足經所屬水土木水遇寒而酒水土 桂枝治衛虛雖皆太陽經藥其實營衛 遇寒而圻裂木遇寒而凋枯故寒喜傷之手經所屬金

藥也心主營為血肺主衛為氣故麻黃 與火金遇寒而愈堅火體極熱寒不能襲故寒不能傷 為手大陰肺之劑桂枝為手少陰心之 昧者奇之將人身營衛經絡上下截斷不相聯絡失血 劑時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有 氣周流瞬息罔聞之旨矣大寒邪襲人必先皮毛灼熱 汗用桂枝未有汗其精微者津液為汗 鼻塞息粗肺主皮毛是手太陰肺受病矣海藏

汗即血也在營則爲血在衛則爲汗寒有傷寒自皮毛入之語先師有桂麻羌芍之說雖太陽傷營營血內澇不能外通示衛衛氣閉表之表之劑然汗法舍皮毛何自而解更衣悖常結閉固津液不行故無汗發熱而惡寒風傷潛泄手陽明大腸庚金病矣先師有硝黃朴實之用雖衛衛氣外泄不能內護于營營氣虛弱兼正陽三陰裏之裏之劑然下法舍大腸何自而通劉津液不固故有汗發熱而惡風然風寒子謂金遇寒而愈堅信乎陽氣怫鬱舌胎言妄手少陰皆由皮毛而入皮毛肺之合也蓋皮毛心丁火病矣先師有瀉心數法亢極動血上下煩蒸手外閉則邪熱內攻故用麻黃甘草同桂厥陰心胞火手少陽三焦火病矣治有三黃柴芩數條枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁小便癰閉手太陽小腸丙火病矣治有五苓藳赤之例泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加石劉子謂火熱寒不能傷信乎經又云人之傷寒則爲病膏活人書夏至後加石膏知母皆泄肺熱既云病熱則無水冰土拆木枯之說而有金燄火亢火之藥是麻黃湯雖太陽發汗重劑實之徵矣劉子何人敢特管見惑世誣人哉機要云有厥散肺經火鬱之藥腠理不密則津液外陰經下利不止脉沉而遲手足厥逆唾涕膿血此難治泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同宜麻黃湯小續命湯汗之此有表邪縮于內當瀉表而甘草外散風邪以鼓表內伐肝木以防愈張子和曰飧泄以風爲根風非汗不出有病比者腹脾佐以芍藥泄水而固脾使以薑棗行中雷鳴水穀不分小便滯澁服瀉藥溫藥不效炙中脘脾之津液而和營衛下後微喘者加厚劑下數十燥熱轉甚津液枯竭近余視之脉浮大而長朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加身表微熱用桂枝麻黃湯加薑棗煎連進三大劑汗出人參以益肺氣也活人書加黃芩爲陽終日至旦而愈次以胃風湯和其藏府食進而安經曰旦湯以瀉肺熱也是桂枝湯雖太陽春傷于風夏必飧泄故可汗而愈按風屬木脾屬土木解肌輕劑實爲理脾救肺之藥也

發汗用莖去節煮十餘沸掠去浮沫或

甘草各一兩桂心七錢半桃仁廿一枚治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂破棺千金湯苦參一兩酒煮取吐

用醋湯略泡曬乾備用亦有用蜜炒者

治天行熱毒垂死水解散防風通聖散見表裏門

庶免

太發

止汗用根節無時出汗為自汗屬陽虛夢中出汗為盜

本方除桂枝加石膏名麻黃杏仁甘草石膏湯仲景治汗

汗屬陰虛用麻黃根蛤粉粟米等分為

下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者

或問發汗後不可更

能禦根節止汗效如影響物理不可測

行桂枝湯桂枝既不可行麻黃可行耶無大熱石膏可

如此自汗有風溫傷風風溫氣虛血虛

行耶喻嘉言曰治傷寒先分營衛桂麻二湯斷無混用

脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔瘕等

之理此症太陽之邪雖從汗解然肺中熱邪未盡所以

症皆可加用蓋其性能行周身肌表引

熱雖少止喘仍不止故用麻黃發肺邪杏仁下肺氣甘

諸藥至衛分而回腠理。汗雖為心液草

緩肺急石膏清肺熱即以治足太陽之藥通治手

然五藏亦各有汗經曰飲食飽甚汗出

太陰經也倘誤行桂枝寧不壅塞肺氣而吐癰膿乎亦

于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗

治溫瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯金匱治濕

出于腎疾走恐懼汗出于肝搖體勞苦

治溫瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯金匱治濕

汗出

于脾

厚朴白微為使惡辛更石膏

家身體煩痛宜發汗本方去桂枝杏仁加附子名麻黃

一名

辛苦而溫芳香而散入肝經附子湯金匱治脉沉虛脹者為氣水屬少陰發其汗即止

荆芥主之非若防風能入骨肉也

連穗用

穗在于莖表益虛熱愈甚而生風故變疾少陰病脉沉細數病故善升發為在裏不可發汗少陰病但厥無汗而強發之必動

治血炒黑用

凡血藥用山梔乾薑地榆椶櫚五靈脂等皆應炒黑

其血或從口鼻或從目出是名上厥下竭難治脉動數微弱者不可發汗脉沉遲為在裏反發其汗則悞

者以黑勝紅也

反魚鱗河豚驢肉

液越出大便難表虛裏實必譫語汗家重發汗必悞惚心亂汗者心之夜心亡血液故乱腹為上下左右

通

微寒升浮形似心

安似蓮房有辨

苦心

有勁氣者不可發汗

故入手少陰厥陰

心包

氣分而瀉火兼傷寒傷風辨

傷寒鬱而後能發熱傷風即能發熱傷寒無汗傷風有汗傷寒無涕傷風有涕傷大

除手足少陽

三焦

手陽明經

大腸

氣分濕

手足微厥傷風手足背皆溫傷寒脉緊傷風脉緩

熱散諸經血凝

氣聚

營氣壅遏衛氣鬱滯遂成瘡腫利

陰陽表裏辨

手足溫之表發熱惡寒頭痛脊強便清不渴手足溫和陽症之表無熱惡寒面淡息冷

水通經殺蟲止痛消腫排膿

皆結者散之凡腫而

手足厥逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣湯手攣足大便秘結小便赤澀爪甲紅活身輕易于轉側脉浮洪數

痛者為安邪腫而不痛為虛邪腫而為赤者為結熱腫而不赤為留氣停痰

使清白爪甲青黑身重難以轉側脉沉細數惟腹痛與

十二經瘡家聖藥

經曰諸瘡痛癢皆屬心火

以熱在皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝湯九味

紫蘇味辛入氣分色紫入血分香溫散

寒通心利肺開胃益脾氣香入脾解肌

和血下氣寬中消痰祛風定喘止痛安

胎利大小腸解魚蠱毒多服泄人真氣

時珍曰同陳皮砂仁行氣安胎同霍香

烏藥溫中止痛同香附麻黃芥汗解肌

同芎藭當歸和血散血同桔梗枳殼利

膈寬腸同藟子杏仁消痰定喘同木瓜

厚朴散溫解暑氣香者良宜橘皮忌

治霍亂脚氣氣香者良宜橘皮忌

有蘇子梗下氣稍緩虛者宜之葉發汗散

降氣湯寒梗順氣

羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱在府為裏

以熱在肌肉目痛不眠在經為表葛根解

背寒為熱漸入裏白虎加參湯若自汗狂

府為全入裏調胃承氣湯少陽以胸脇之間為半表

裏表多小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆發熱太

陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也大抵陽症多

得之風寒暑濕邪生于太陽也陰症多得之飲食起居

七情邪生于少陰也故曰傷寒內傷者十居八九也

桂枝湯

仲景

治太陽中風陽浮而陰弱發熱頭痛自汗惡

風惡寒鼻鳴乾嘔

閉前為陽衛亦陽陽以候衛閉後為

風也閉脈弱者營氣弱也傷于風者頭先受之故頭痛

經曰陽浮者熱自發陰弱者汗自出風併于衛營弱衛

強故發熱自汗也衛虛則惡風營虛則惡寒自汗則皮

腠疎故惡風復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛實之分無

汗惡寒為表實宜發汗汗出惡寒為表虛宜解肌鼻鳴

乾嘔者風壅氣逆故息有音而作嘔也喻嘉言曰風寒

並舉義重惡風惡風未有不惡寒者所以傷寒及陽明

亦云云惡風後人謂傷寒惡寒傷風惡風誤矣

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

安胎子降氣開鬱消痰定喘表氣炒研用

病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗脉遲汗多屬陽明症

薄白辛能散涼能清本經溫蓋体升浮

以微惡寒尚兼太陽仍當從外解肌斷其入胃府之路

能發汗搜肝氣而抑肺盛消散風熱清

桂枝芍藥生薑甘草三二兩大棗十二枚熱服須

利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口更啜稀熱粥以助藥力溫覆取微似汗不可令如水淋

噤語瀉舌胎含眼耳咽喉口齒諸病

漓汗出病差停後服服一劑盡病症猶在者更作服

通竅而散風熱皮膚癰癤瘰癧瘡疥驚熱

此足太陽藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風不可

驚藥俱宜薄荷湯調骨蒸破血止痢

大汗汗過則反動營血雖有表邪只可解肌故以桂枝

辛能散涼能清虛人不宜多服

湯少和之也經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘

氣蘇產氣芳者良薄荷猫之酒也犬

緩之以酸收之桂枝辛甘發散為陽臣以芍藥之酸收

之酒也桑椹鳩之酒也茜草魚之酒也食之皆醉

佐以甘草之甘平不令走泄陰氣也薑辛溫能散散寒

名龍腦薄荷 辛而微溫清肺下氣 藥甘溫能利此不流于發散又以行脾之津液而和營

理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血 衛者也麻黃湯治于發散故不用薑棗而津液得通矣

痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病 局方有龍

腦雞 蘇丸 方莖中 虛似蘇葉而微長密齒

面鰓氣甚辛烈

木賊溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形

性亦能發汗解肌升散火鬱風濕入足

厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜

翳乃肝邪鬱遏不能上通于目及疳痛脫肛腸風瘰癧

赤痢崩中諸血病

麗安時曰若無汗小便數或手月逆身冷不惡寒反惡熱者悞不可用又自汗小便數者不可服自汗為陽虛小便數為下焦虛寒初病表裏俱虛病不在表服此重汗竭其津液是虛虛也經曰脈浮緊發熱汗不出者不可與脈緊為傷寒與之則表益實而汗愈難出矣傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡周揚俊曰風既傷衛則衛氣疎不能內護于營而汗自出矣汗者血之液也苟非用血藥以桂枝和營散邪以芍藥內營固裏則不但外邪不出且入而為裏患矣然後知和營則外邪出邪出則衛自密更不必用固表之藥而汗自止矣仲景曰病當自汗出者此為營氣和營氣和者外不諧以衛氣不共營氣和諧故耳以營行脉中衛行脉外復發其汗營衛和則愈宜桂枝湯王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為

本草 薄荷雞蘇木賊浮萍 表 桂枝湯

桂枝湯 辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚

邪汗 丹溪曰浮萍發汗甚于麻黃 **止搔癢消渴** 搗汁服

生子水又能下 水氣利小便治一切風

濕癰痲 浮萍一味蜜九酒服治三十六種風濃煮汁浴治惡疾瘡癩遍

身 **燒煙辟蚊** 紫背者良

蒼耳子 一名萁耳 即詩巷耳 **苦甘性溫善發汗散**

風濕上通 腦頂下行足膝外達皮膚治

頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛癰癰瘡

疥 采根葉熬 **遍身搔癢** 作浴湯佳 **去刺酒**

拌蒸 猪肉 聖惠方云葉搗

營弱衛弱陰虛陽必痿之故用桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多則桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能開汗孔也李東垣曰仲景治表虛製此湯用桂枝為君桂枝辛熱發散體輕助陽芍藥甘苦佐之若腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君芍藥酸寒主收補中桂枝甘草佐之一治表虛一治裏虛又曰以桂枝易肉桂治感寒腹痛之神藥如中熱腹痛去桂加黃芩許叔微曰仲景一百一十二方桂枝獨冠其首今人全不用何也昂按仲景治傷寒用麻黃桂枝而全不用羌活防風是古人亦有所未備也故潔古製羌活湯黃耆湯川芎湯海藏製神木散白朮湯皆用羌活防風以代之黃耆川芎湯附補門神木白朮湯見後

本方加白朮川芎羌活防風飴糖名疏邪實表湯 節治

同 陶氏製此以白朮為君以代桂枝湯喻嘉言曰坐令外感內傷混同論治矣昂按節菴之君白朮亦做潔古之黃耆湯海藏之白朮湯而來又按節菴所醫傷寒

天麻立湯。月經氣分益氣強陰通血。

脉強筋力疎痰氣治諸風眩掉頭旋眼。

黑語言不送風濕痛。音頑痺小兒驚癇諸風。

眩掉皆屬肝木肝病不能榮筋故見前症。天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸

疾自瘳。血液衰少及類中風者忌用。風藥能燥

血故也。昂按風藥中須兼養血藥制其燥也。養血藥或兼搜風藥宜其贊也。古

云治風先治血。根類黃瓜莖名赤筋有

風不動無風反搖。名定風草。明牙堅實

者佳。濕紙包煨熟。切片酒浸一宿。焙用。

秦艽苦燥。濕燥散風去肝胃之熱。益肝能轉側。不嘔不渴。脉浮虛而濡。

仲景以節菴為捷徑以仲景為畏途節菴之書行而仲景之書晦如節菴者可謂潔古海藏輩之功臣而在長沙實為操莽也本集採節菴方論頗多然不能無遺議者以節菴之功罪本方去芍藥生薑名桂枝甘草湯。仲景

治發汗過多又手冒心心下悸欲得按者。汗多則亡陽而耗血故心

虛悸而又手冒心也桂枝益氣固表甘草補時助陽本方加附子名桂枝加附子

湯。仲景治太陽病發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急

汗多亡陽無以衛外故惡風汗多則便自少兼膀胱無陽不能化氣故便難汗多則無液以養筋兼有風入而

增其動故四肢微急與桂枝湯以和榮衛加附子以助元陽本方去芍藥加附子名

桂枝附子湯。仲景治傷寒八九日風濕相搏身體痛煩不

八九日再經之時邪多在裏而復身體痛煩者

五音本草 蒼耳子天麻秦艽 桂枝湯

膽之氣養血榮筋風藥中潤劑治風寒

散藥中補劑

濕痺經曰風寒濕三氣雜至合而為痺

風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝為

着痺痺在于骨則体重在脉則血畜

兩名桂枝新加湯仲景治傷寒汗後身痛脉來沉遲沉遲

身攣急血不榮筋虛勞骨蒸時珍曰手足陽

明經藥兼入肝

以解未盡之邪加芍藥人參斂陰以益營血本方減甘

胆陽明有濕則手足酸痛寒熱有熱則

草一半加芍藥一倍名桂枝加芍藥湯仲景治太陽訪下

日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦

腹痛屬太陰症表症未罷而誤下表邪乘虛而太裏當

錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦芩炙

滿是邪已入太陰經然但腹滿時痛尚非大實本方加

甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢

之痛故但用桂枝以安太陽倍芍藥以和太陰

瀉血口噤牙痛齒下齦屬手陽明大腸

大黃名桂枝加大黃湯仲景治表症誤下大實痛者別見

下牙痛及本經風熱濕勝風淫之症判大小便乳牛

門膏益蠶桂加茯苓白朮名桂枝去桂加茯苓白朮湯

點服兼治黃疸煩渴便赤

形作羅紋相交長六黃

仲景治服桂枝湯或下之仍頭痛身痛發熱無汗心微