

傷寒論註

傷寒論註卷之二

南陽

張機

筆墨錄

慈谿

柯琴

韵伯編註

崑山

馬中驂驤北較訂

麻黃湯證上

太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。

太陽主一身之表。風寒外束。陽氣不伸。故一身盡疼。太陽脉抵腰中。故腰痛。太陽主筋所生病。諸筋者皆属于節。故骨節疼痛。從風寒得。故惡風。風寒客于入

則皮毛閉故無汗。太陽爲諸陽主氣。陽氣鬱于內。故喘。太陽爲開。立麻黃湯以開之。諸症悉除矣。○麻黃八症。頭痛發熱惡風。同桂枝症。無汗身疼。同大青龍症。本症重在發熱身疼。無汗而喘。

本條不冠傷寒。又不言惡寒。而言惡風。先輩言麻黃湯主治傷寒。不治中風。似非確論。蓋麻黃湯大青龍湯。治中風之重劑。桂枝湯葛根湯。治中風之輕劑。傷寒可通用之。非主治傷寒之劑也。

脉浮者。病在表。可發汗。麻黃湯。脉浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。

前條論症。此條論脉。言浮而不言遲弱者。是浮而有
力也。然必審其熱在表。乃可用。若浮而大。有熱屬藏
者。當攻之。不令發汗。夾若浮數而痛偏一處者。身雖
疼。不可發汗。

數者急也。卽緊也。緊則爲寒。指受寒而言。數則爲熱。
指發熱而言。辭雖異而意則同。故脉浮緊者。卽麻黃

黃症

脉浮而數。浮爲風。數爲虛。風爲熱。虛爲寒。風虛相搏。則
洒淅惡寒也。

脉浮爲在表者。何以表有風邪故也。邪之所湊。其氣

必虛。數本爲熱，而從浮見，則數爲虛矣。風爲陽邪，陽浮則熱自發，數爲陽虛。陽虛則畏寒。凡中風寒，必發熱惡寒者，風虛相搏而然也。

諸脉浮數，當發熱而洒淅惡寒。若有痛處，飲食如常者，畜積有膿也。

浮數之脉而見發熱惡寒之症，不獨風寒相同，而癰瘍亦有然者。此浮爲表而非風，數爲實熱而非虛矣。發熱爲陽浮，而惡寒非陽虛矣。若欲知其不是風寒，當以內外症辨之。外感則頭項痛，身痛，骨節痛，腰脊痛，非痛偏一處也。外感則嘔逆或乾嘔，不得飲食如

常如此審之。有畜積而成癰膿者。庶不致誤作風寒治。則舉瘡家一症例之。治傷寒者見脉症之相同。皆當留意也。

瘡家身雖疼。不可發汗。汗出則瘕。

瘡家病與外感不同。故治法與風寒亦異。若以風寒之法治之。其變亦不可不知也。瘡雖痛偏一處。而血氣壅遏。亦有徧身疼者。然與風寒有別。汗之則津液越出筋脉。血虛攣急而爲瘕矣。諸脉症之當審。正此故耳。

脉浮數者。法當汗出而愈。若身重心悸者。不可發汗。當

自汗出乃解。所以然者。尺中脉微。此裡虛。須表裡實。津液自和。便汗出愈。

脉浮數者。于脉法當汗。而尺中微。則不敢輕汗。以麻黃爲重劑。故也。此表指身裡。指心有指營衛而反遺心悸者。非也。身重是表熱。心悸是裡虛。然悸有因心下水氣者。亦當發汗。故必審其尺脉。尺中脉微爲裡虛。裡虛者。必須實裡。欲津液和。須用生津液。若坐而待之。則表邪愈盛。心液愈虛。焉能自汗。此表是帶言。只重在裡。至于自汗出。則裡實而表和矣。

寸口脉浮而緊。浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衛。寒則傷

營營衛俱病。骨肉煩疼。當發其汗也。

風寒本自相因。必風先開腠理。寒得入于經絡。營衛俱傷。則一身內外之陽不得越。故骨肉煩疼。脉亦應其象而變見于寸口也。緊爲陰寒而從浮見。陰盛陽虛。汗之則愈矣。

緊者急也。卽數也。緊以形象言。數以至數言。緊則爲寒。指傷寒也。數則爲熱。指發熱也。辭異而義則同。故脉浮數浮緊者。皆是麻黃症。

脉法以浮爲風。緊爲寒。故提綱以脉陰陽俱緊者名傷寒。大青龍脉亦以浮中見緊。故名中風。則脉但浮。

者正爲風脉。宜麻黃湯。是麻黃湯固主中風脉症矣。
麻黃湯症發熱骨節疼。便是骨肉煩疼。卽是風寒而
傷營衛俱病。先輩何故以大青龍治營衛而傷麻黃
湯治寒傷營而不傷衛。桂枝湯治風傷衛而不傷營。
曷不以桂枝症之惡寒。麻黃症之惡風。一反勘耶。要
之冬月風寒。本同一體。故中風傷寒皆惡風惡寒。營
病衛必病。中風之重者。便是傷寒。傷寒之淺者。便是
中風。不必在風寒上細分。須當在有汗無汗上着眼
耳。

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍

在此當發其汗。麻黃湯主之。服藥已微除。其人發煩目
瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。

脉症同大青龍而異者。外不惡寒。內不煩躁。耳發于
陽者。七日愈。八九日不解。其人陽氣重可知。然脉緊
無汗。發熱身疼。是麻黃症未罷。仍與麻黃。只微除在
表之風寒。而不解。內擾之陽氣。其人發煩目瞑。見不
堪之狀可知。陽絡受傷。必逼血上行而衄矣。血之與
汗。異名同類。不得汗。必得血。不從汗解。而從衄解。此
與熱結膀胱。血自下者。同一局也。

太陽脉從自目內眦。絡陽明脉于鼻。鼻者陽也。目者

陰也。血雖陰類。從陽氣而升。則從陽衰而出。故陽盛則衄。陽盛則陰虛。陰虛則目瞑也。

解後復煩。煩見于內。此餘邪未盡。故用桂枝更汗。微除發煩。是煩于外見。此大邪已解。故不可更汗。仲景每有倒句法。前輩隨文衍義。謂當再用麻黃以散餘邪。不知得衄乃解。句何處著落。

傷寒脉浮緊者。麻黃湯主之。不發汗。因致衄。

脉緊無汗者。當用麻黃湯發汗。則陽氣得泄。陰血不傷。所謂奪汗者無血也。不發汗。陽氣內擾。陽絡傷則衄血。是奪血者無汗也。若用麻黃湯。汗液脫則斃。

夫言不發汗因致衄豈有因致衄更發汗之理乎觀少陰病無汗而強發之則血從口鼻而出或從目出能不懼哉愚故亟爲校正恐誤人者多耳

太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

汗者心之液是血之變見于皮毛者也寒邪堅斂于外腠理不能開發陽氣大擾于內不能出玄府而爲汗故逼血妄行而假道于肺竅也今稱紅汗得其旨哉

衄家不可發汗汗出必額上脉緊急目直視不能眴不得眠

太陽之脉起自目內眥上額已脫血而復汗之津液
枯竭故脉緊急而目直視也亦心腎俱絕矣目不轉
故不能瞬目不合故不得眠

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不
可發汗以營氣不足血少故也

脉浮緊者以脉法論當身疼痛宜發其汗然寸脉雖
浮緊而尺中遲則不得據此法矣尺主血血少則營
氣不足倘發汗決不能作汗正氣反虛不特身疼不
除而亡血耗精液之變起矣○假令是設辭是深一
層看法此與脉浮數而尺中微者同義陽盛者不妨

發汗。變症惟衄。衄乃解矣。陰虛者不可發汗。亡陽之變恐難爲力。

太陽與陽明合病。喘而胸滿者不可下。麻黃湯主之。
三陽俱受氣于胸中。而部位則屬陽明。若喘屬太陽。嘔屬少陽。故胸滿而喘者。尚未離乎太陽。雖有陽明可下之症而不可下。如嘔多。雖有陽明可攻之症而不可攻。亦以未離乎少陽也。

陽明病。脉浮無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

太陽有麻黃症。陽明亦有麻黃症。則麻黃湯不獨爲太陽設也。見麻黃症卽用麻黃湯。是仲景大法。

右論麻黃湯脉症

太陽病十日已去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。

脉微細但欲寐。少陰症也。浮細而嗜卧。無少陰症者。雖十日後尚屬太陽。此表解而不了了之。謂設見胸滿嗜卧。亦太陽之餘邪未散。兼脇痛。是太陽少陽合病矣。以少陽脉弦細也。少陽爲樞。樞机不利。一陽之氣不升。故胸滿脇痛而嗜卧。與小柴胡和之。若脉浮而不細。是浮而有力也。無胸脇痛。則不屬少陽。但浮而不大。則不涉陽明。是仍在太陽也。太陽爲開。開病

反閤故嗜卧與麻黃湯以開之使衛氣行陽太陽仍
得主外而喜寤矣與太陽初病用以發汗不同當小
其制而少與之

右論麻黃湯柴胡湯相關脉症

麻黃湯

麻黃

二兩去節

桂枝

二兩

甘草

炙一兩

杏仁

七十

個去尖

水九升先煮麻黃減一升去沫內諸藥煮二升半溫服
八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

麻黃色青入肝中空外直宛如毛竅骨節狀故能旁

通骨節除身疼直達皮毛爲衛分驅風散寒第一品藥然必藉桂枝入心通血脈出營中汗而衛分之邪乃得盡去而不留故桂枝湯不必用麻黃而麻黃湯不可無桂枝也杏爲心果溫能散寒苦能下氣故爲驅邪定喘之第一品藥桂枝湯發營中汗須啜稀熱粥者以營行脈中食入于胃濁氣歸心淫精于脈故耳麻黃湯發衛中汗不須啜稀熱粥者此汗是太陽寒水之氣在皮膚間腠理開而汗自出不須假穀氣以生汗也

一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也