

傷寒雜論卷下

短氣

胃中虛寒。則陽氣鬱伏不伸。故短氣。

跌陽脈緊而浮。浮爲虛。緊爲寒。浮爲腹滿。緊爲絞痛。浮緊相搏。腸鳴而轉。轉則氣動。膈氣乃下。少陰脈下出其陰。腫大而虛也。

膈中之水氣。因火擊動。所以腸鳴轉而下泄。則脾胃虛寒。可知。若少陰脈不至。則下焦虛寒。不能運行水氣。必致留結。陰分而爲陰腫。虛大也。

跌陽脈浮。浮則爲虛。浮虛相搏。故令氣削。言胃氣虛竭也。脈滑則爲嘔。此爲醫咎。責虛取實。守空迫血。脈浮。鼻中燥者。必衄也。

脉滑爲藏者胃虛不能散水。水結中焦逼虛火上逆故爲噦也。脉浮必衄者。浮爲表邪不散邪鬱上焦必迫血上行而爲衄也。胃氣素虛之人誤施辛溫發散則虛陽將欲外亡。所以脉浮鼻燥皆緣責虛取實之故也。此與誤發少陰汗者同科而減等。少陰少血動其血則下厥上竭而難治。陽明多血但釀患未已耳。

寸口脉浮大而醫反下之。此爲大逆浮則無血大則爲寒寒氣相搏則爲腸鳴醫乃不知面反飲冷水令大汗出水得寒氣冷必相搏其人則餒。寸口脉浮爲表邪而反下之爲逆矣以其人陽氣

下陷故不爲痞結而但腸鳴卽當將差就錯內和其氣而反與之水寒其胃致水氣相搏且夾帶濁飲上干清氣故令飢也。○胡其章曰大則爲寒寒字當作邪字看

寸口脉微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成營盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩此言衛虛營盛氣衰血熱三焦之火失其常度併熱於守經之血而妄行故爲崩下不止耳

寸口諸微亡陽諸瀉亡血諸弱發熱諸緊爲寒諸乘寒者則爲厥鬱胃不仁以胃無穀氣脾瀉不通口急

不能言戰而慄也

口急不能言是脾藏血少不能上通於心氣也

亡口脉微尺脉緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽也

陽微陰勝加之多汗陽氣愈虛也

少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲屍厥當刺期門巨闕

腎中真陽之氣不能統於周身則陰氣上迫於陽位所以宗氣鬱聚血結心下陽氣因而不伸陷入至陰之地周身有陰無陽遂至不仁而厥也治當

刺期門以下結血刺巨關以行宗氣宗氣布而陽氣自復厥自退矣

寸口脉浮而大浮爲虛大爲實在尺爲關在寸爲格

關則不得小便格則吐逆

跌陽脉伏而漐伏則吐逆水穀不化漐則食不得入名曰關格

上條以脉之虛大倍常爲關格見於尺部爲關見於寸口爲格故知凡言寸口皆統三部而言也○下條以關部伏漐異常爲關格蓋伏則氣滯漐則血寒也上條乃正衰邪實不治之證下條是寒邪悶拒可治之證不可不察

跌陽脉不出脾不上下身冷膚鞭

身冷者胃氣不溫膚鞭者營血不濡以營衛氣衰故跌陽脉不出脾不上下竟成藏厥之證也寸脉下不至關爲陽絕尺脉上不至關爲陰絕此皆不治

關爲陰陽之交界關上脉絕則陰陽離決故不治寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下焦陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強脛攣腰痛脛痠所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄足膝逆冷使溺妄出表氣微虛裏氣微急

三焦相溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷
也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中爲滿營衛不
通血凝不流若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因
熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則爲癰膿若
陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣內入嚏而出
之聲嗝咽塞寒厥相逐爲熱所擁血凝自下狀如豚
肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下
重令便數難臍築湫痛命將難金嚙音銀
此下五條俱論陰陽錯雜之邪所謂三焦相溷內
外不通爲時行疫癘之總訣而傷寒壞證溫熱夾
陰亦往往有內外合邪者此條言寸口脉陰陽俱

緊者邪氣乘虛初犯中焦內外受傷未變爲實也
寸脈浮而緊者清陽霧露之氣傷於陽故曰清邪
中於上焦尺脈沉而緊者濁陰寒濕之和傷於陰
故曰濁邪中於下焦清邪中上則發熱頭痛項強
脛變等證皆是外感表證濁邪中下則陰氣爲悞
言身不戰而但心惕惕然內慄足膝逆冷等證皆
邪客陰經之證今表氣微虛則陽氣內入裏氣微
急則陰邪上逆由是三焦溷亂內外不通矣鬱於
上焦則斷傷不能斂物中焦不治則不能運行水
穀營衛不通而血凝不流若陽氣前通膀胱之邪
欲散故小便亦黃邪熱遊溢經絡則爲癰膿也設

陰氣前通者則陽氣厥微不能衛外寒氣內客於肺噎而出之以寒氣客於肺故聲啞咽塞言聲塞不能出也寒者外邪也厥者內邪也內外之邪合併相逐爲熱所擁則血凝自下也陰陽俱厥者言脾胃之氣不相順接胃中陽氣不行不能敷布申外故四肢逆冷脾中陰氣孤弱不能約制下焦故五液注下固便頻數下重而難也脾爲生氣之源脾築湫痛則生氣欲絕蓋邪氣傷犯中焦清濁相瀾三焦俱病汗下兩難治稍失時則變證百出矣脉陰陽俱緊者日中氣出昏日乾燥蹇臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日已來其人微發熱

手足溫者此爲欲解若到八日已上反大發熱者此爲難治設使惡寒者必欲嘔也腹內痛者必欲利也此脉此證表裏陰陽溫清木的疑似之間慎勿妄投藥餌徐而俟之若七日之外當解之候微熱手足溫則爲邪氣解而目愈矣若致八日已上當解不解反大發熱此爲逆證不可治也然仲景止言難治非直不治也故下文言設寸脉浮緊惡寒者必嘔清陽霧露之邪溢上焦也尺脉沈緊而腹痛者必利濁陰寒濕之邪走下焦也邪氣既得上下消散即可從其勢而治之矣

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去人安此爲

欲解者脈遲至六七日不飲食此爲晚發水停故也
爲未解食自可者爲欲解

脈陰陽俱緊內外皆邪至吐利後邪氣已泄脈緊
當去也若吐利後緊獨不解反不飲食皆爲脾胃
氣虛水飲停畜爲晚發變證也若到七日脈緊漸
退人安能食方爲欲解

傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來
太漸漸小更來漸漸大是其候也惡寒甚者翕翕汗
出喉中痛熱多者目赤脈多睛不慧醫復發之咽中
則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱多者便
膿血若重之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者

可救之小便難者爲危殆

脉來厥者如厥逆之寒熱交勝也初來大者爲邪氣鼓動漸漸小爲正氣受傷更來漸漸大爲邪氣復進也蓋緣其人正氣本虛不能主持隨邪氣進退故其脉亦隨邪氣進退是以忽大忽小經云不大不小雖因可治其有大小者爲難治是也惡寒甚者則發熱翕翕汗出喉中痛以少陰之脉循喉嚨故也熱多者太陽多也目赤脉多睛不慧以太陽之脉起於目故也發汗攻陽則少陰之熱因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪因虛而內陷故兩目閉也邪下行為寒多必便清穀陽邪

下行爲熱多必便膿血熏之則火熱傷表身必發黃裂之則火邪內逼必爲咽燥小便利者津液未竭猶可救之小便難者津液已絕爲危殆也

傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃衄不可制食水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉食永者下之其脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩燥脉數實不大便六七日後必便血若發汗則小便自利也

發熱口中勃勃氣出邪氣變熱衝於痛上也頭痛

目黃衄不可制者執鬱於經也貪水者爲無陰邪
氣併於上焦故必嘔惡水者爲無陽邪氣併於中
焦故厥逆也若下之裏虛熱結必咽痛厥逆假令
手足不厥則熱邪不行而協熱利也若頭痛目黃
者爲邪在太陽下之熱氣內伏則曰閉也貪水者
熱在上焦下之傷陰必脈厥聲嚶咽喉閉塞汗之
傷陽則陰陽俱虛而戰慄惡水者爲陽虛下之則
裏冷不食完穀不化汗之虛陽上乘口傷舌上白
胎煩燥若目黃漱水不大便者六七日後必便血
若發其汗則小便當不利今反自利者太陽之痰
熱結於膀胱而小便偏滲也瘀血爲陰邪雖有如

任實證而不能消耗津液故小便自利耳○下之
其三字從玉雨經增入

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下
弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛
不可發汗發汗則寒慄不能自還欬者則劇數吐涎
沫咽中必乾小便不利必中饑煩躁時而發其形似
瘡有寒無熱虛而寒慄刻而發汗跪而苦滿腹中復
堅

脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下
弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛
虛者不可下也微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而

利因不休利不休則胸中如蟲嚙粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若水眼睛不慧語言不休而穀氣多入此爲除中口雖欲言舌不能前

此二條言尺中微弱者不可汗下也觀其意欲得溫一語可以灼見病情上條言寸口微見弦脈而欬劇吐涎等證知爲胃氣本虛而挾寒飲速宜溫養中上悞發汗則胃中陽氣愈傷客邪固結愈甚或因刻而復汗之遂至蹇而若滿腹中復堅皆陰邪水飲否塞之象也下條言寸口微見弦脈而欬吐涎沫等證仍爲胃氣本虛亦宜培理中土若誤