




增訂本草集要目錄

二卷

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草子

澤蘭蘭草

白微

艾

延胡索

紅花臘脂

葶藶

紫葳葶

凌霄花

大小薊

三七

地榆

蒲黃

卷柏

蘭茹

菴蘭子

鬱金

黃芩

莪朮

荆三稜

白茅根針

蘆根

葶根皮

薤白根管實

黃蘗

芭蕉根

大黃

蓼

黃連

胡黃連

苦參

知母

龍膽草

青黛

大毒

牽牛

防己漢已

厚朴甜

甘遂

大戟

商陸

葶花

葶花

澤漆

常山蜀

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前草

燈草

瞿麥

扁蓄

天仙籐 地膚子葉 石韋瓦 海金砂 茵陳 香需膏 青蒿屑

附子烏頭 天雄 側子 烏附尖 草烏頭 白附子 破故紙 肉苁蓉 瑣陽

巴戟天 胡盧巴 仙茅 淫羊藿 蛇麻子 鬼絲子 覆盆子葉

蒺藜沙苑 刺蒺藜 使君子 益智子 砂仁 白豇蔻 肉豇蔻

草豇蔻草 香附 木香 藿香 茴香大小 八角 甘松香 山柰

良薑紅 薤 薤芡 煙草 金銀花膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山豇根 牛蒡子根 山慈菰 漏蘆 貫眾 射干

續隨子 馬藺子根 葉 蓖麻子 白頭翁 王瓜子子 王不留行 冬葵子春 葵

子蜀 白鮮皮 葶藶拔契 土茯苓赤 白 白斂赤 斂 預知子 旱蓮草膏

寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 決明子 蓼實馬勃 木鱉子 終

增訂本草備要卷之二

休寧汪 昂初菴著輯

男汪

弟汪 桓殿武恭訂

姪汪惟寧錫

同鄭曾慶賢署訂

姪婿 潘天一同較

草部

牡丹皮

瀉伏火而補血



辛甘微寒入手足少陰心厥陰肝包  
瀉血中伏火丹色

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人時以黃相治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸和血涼血而生血血熱則枯破積血積瘀不去則新血不生

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅治中風五勞驚癰瘰

癰筋脉伸縮捕掣為癰癰或手足捕掣舌眠喎邪卒然眩化吐涎除煩

續斷  
補肝腎  
理筋骨

執療癰瘡

涼血

下胞胎退無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸  
骨皮治有汗之骨蒸神不足者手

少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足  
也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為志故腎藏神

單瓣花

紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母免絲大黃忌蒜胡荽伏砒

時珍曰花

白者補赤者利人所罕悟宜分別之



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷已

補不足

經疏云味甘故然

煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏

懷妊瀝血

崩帶遺精腸風痢

是齋方平胃散一兩川續斷二錢半每服二錢

米飲下治時痢亦驗

癰痔腫毒

又主金瘡折跌

以功命名

止痛生肌外科需為上

齊

川產良狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

閉也前

陰利水

後陰利

殼

益母草

一名菴

蔚

通行瘀

血生新

血



蒸



苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研末入猪腎煨熟空

心食之腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

傳傷牙痛炒黑為末擦下亦良

又八厥陰

心包能破血止血

入血行傷故治折

傳粥和末裏傷虛

根似薑而扁長去毛用或蜜拌

辛微苦寒入手足厥陰

肝心包

消水行血去瘀生新調

經解毒

治血風血運血痛血淋胎漏產難崩

中帶下

帶脉橫于腰間病生于此故名為帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升提血虛者

養血滋陰而兼調氣

為經產良藥消疔腫乳癰

癰亦取其散瘀解毒

通大小便然辛散之藥

瞳子散大者忌服

益母子主治畧同調經益精明目

血滯病目者則宜之活血

澤蘭  
通行血  
消水



順氣逐風

氣行則血行  
血活則風散

行中有補治心煩頭痛

血虛而熱之候

胎產帶崩

有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益母根莖

花葉專手行于則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末蜜丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良

思鐵子微炒用

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰

肝脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫

防已為使

治產後血滯腰痛

瘀行吐

血鼻洪目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥

古方

澤蘭丸  
甚多

時珍曰蘭草澤蘭二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

葉對節着細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微有節短葉

有毛者為澤蘭嫩時並可接音而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥溫不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼為香葦俗

名孩兒菊夏月採置髮中則髮不腫浸蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫塗癰毒破瘀除癥而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考衆說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經聞產者力勝李

士材云蘭葉實金水之氣故入肺藏東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢曉之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

建蘭矣

諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或

以為猗蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳止齋云客蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草

騷經矣

俗名孩兒菊菊今之所謂蘭其葉如茅者根名上續斷因花馥郁故得

蘭名楊升菴云世以如蒲管者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬言

種多有

蘭說云蘭為醫經上品有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖

未確故  
陳文燭  
作正楊  
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊  
非夫騷經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其  
種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨折乎此世俗至今猶以非蘭  
為蘭何其惑之甚也昂按朱子為蘭援離騷網佩以為證竊謂紉佩亦  
騷人風致之詞耳如所云飲水蘭之墜露餐秋菊之落英豈真露可飲  
而英可餐乎又云製芰荷以辨衣集芙蓉以為裳豈真芰荷可衣芙蓉  
可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭  
明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭  
無疑也然離騷不常曰春蘭兮秋菊乎不又曰結幽蘭而延芳乎不又  
曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又  
不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列  
之梅菊之前今反屈于孩兒菊之下以為盜龍葵名世間至賤之草皆  
收入本草獨山蘭清芬佳品檳葉不錄何其不幸若斯之甚也本草殺  
蠱之藥良多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉力所優為者也  
蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併  
騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂合蘭草無復有用之者不思若以為  
一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭  
止為中品乎況一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五  
除不蘭人所不識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特  
二重一類且四重一類夫以名之區區豈足以蔽其真乎

幽字何  
可當也

白微

瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草非用藥而用其花也馬經諸樹蘭所以別  
乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是  
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也  
寇氏朱氏之論又安可全非乎姑附愚說以諮多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱步滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯白微當歸各一兩參

五錢甘草錢熱淋溫瘧洗洗寒熱酸痛婦人傷中淋

半每服五錢能內營故酸痛

露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

廷孔女人產虛煩嘔仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

溺孔也子往往用之益不孕緣手血熱血少而其源起于似牛膝而短


真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血  
自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥  
小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸棗

艾葉

宣理氣

血燥逐

寒濕



苦辛生溫熟純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠膠湯良治吐血崩

帶治帶要藥腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐殺蛇治癰

醋煎外科有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後敷藥以之灸音火

者益人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺蟲也

能透諸經而治百病血熱為病者禁角灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

濕脚氣亦宜以此夾入襪內

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片同研則易細煎服宜鮮者苦酒醋也香附

為使艾附丸謂婦人諸病宗時重湯陰艾有明成化來則以蘄州艾為勝云炙酒燂一炙便透其家發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

重艾

延胡索

宜活血  
利氣



辛苦而溫入手足太陰脾厥陰肝經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結下內外

諸痛通則不痛癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而凝滯不以時至產後

血運暴上衝折傷積血瘀氣危急為活血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通紅墜胎血熱氣虛者禁用根如半夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒上血生用破血炒用調血

紅花一名

紅藍花  
通行血  
潤燥



辛苦甘溫入肝經而破瘀活血瘀行則血活有熱結于中暴吐紫黑

血者吐出為好吐未盡如桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫止痛凡

熱血瘀則治經閉便難血運口噤胎死腹中非活血行血不作腫作痛

能痘癰本草不候痺不通又能入心經生新血須兼補血藥為佐使俗用

染紅併作胭脂

胭脂活血解毒疔挑破以油胭脂傳之良

少用養衆則行血過用能使

血行不止而斃

血生于心包藏于肝属于衝任紅花汁與相類故治血病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢

婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

色赤

營氣

溫行滯味酸走肝而鹹走血本經

苦寒入厥

莖草

通行血

陰血分

能行止血

能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血消痰

通經

酒煎一兩通經甚効

治風庫黃

疸有黃疸五黃疸穀疸酒疸黃汗疸女勞疸此益蓄



血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱例治當用四物知相壯其水參耒培其氣隨症而加利濕清熱藥

損瘡瘡癰少者忌用

紫草

瀉血熱

甘鹹氣寒入厥陰血分

心包

涼血活血利九竅通二



便

鹹寒治心腹邪氣即熱

水腫五疸癰瘡瘡癰

反痘瘡血熱毒盛二便閉澀者血熱則毒開得此草涼之則血行而毒出大便利者忌之活切心書云紫草性  
 寒小兒脾胃實者可用脾胃虛者反能作瀉古方准用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者忌用

去頭鬚澀

凌霄花

一名紫

葳

瀉血熱



甘酸寒入厥陰血分心包能去帶伏火破瘀

瘀主產乳餘疾婦常癥瘕腸結不大閉淋悶風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌

本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也。肺癰有用之為君藥者

凌霄花為末和蜜陀僧唾調敷酒齙甚驗

藤 花開五瓣葉赤有刺不可近鼻蘭傷腦

大小薊

瀉涼血



甘溫大明皆能破血下氣行而帶補治吐血腸癰女

子赤白沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新葆精養

血復執補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁服立瘥

兩薊相如花如髮大薊莖高而葉皺小

薊莖低而葉不皺皆用根

三七名亦

山漆 瀉毒 止痛



甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰

腫醋磨塗即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心

杖後敷之去瘀消腫易愈大抵陽明厥陰血分之藥故治血病此藥近時始出軍

中特之從廣西山洞來者略似白及地黃有節味微甘頗似人參以未

摻猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤紐可受而氣不

香根大如牛蒡味甘極易熟衍云是三七治金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆

瀉止血



苦酸微寒性沉而瀉本草未嘗言瀉然能收入下焦

除血熱治吐血崩中血虛腸風血鮮者為腸風隨感

本草綱目

經

蒲黃

生滑行

血炒澀

止血

卷栢

生用破

血炙用

止血

毒積久不發也。黃蘗為近血。血痢。藕頭白。古方斷下多用之。效宗。出腸胃。後為遠血。出肺肝。血痢。與白。虛寒。瀉痢。及初起者忌用。似。柳根外黑裏紅。最上截炒黑。用稍反行。血得。髮。食。黑。麥。冬。



甘平。厥陰血分藥。心包。生用。性滑。行血。消瘀。通經。脉。

利小便。祛心腹膀胱寒熱。同五靈脂。治心腹。血氣痛。名失笑散。療。攪打。

損傷。瘡。癰。諸。重。二。婦。舌。脹。滿。口。以。滿。黃。類。摻。此。曉。乃。愈。宋。度。宗。苦。脹。滿。黃。御。醫。用。滿。黃。乾。

葛素等分。擦之。愈。時珍曰。觀此。則蒲黃之涼。血活。血可知矣。少。黑。性。澀。甚。舌。為。心。苗。心。包。相。火。乃。其。臣。使。得。乾。葛。黃。陰。陽。相。濟。也。

止一切虫。朋。帶。泄。精。香。蒲。花。中。葶。屑。湯。或。入。藥。

生用。辛。平。破。血。通。經。治。癰。癢。淋。結。炙。用。辛。溫。止。血。治。

腸。風。脫。肛。生。石。上。拳。纒。子。如。雞。足。俗。呼。萬。年。松。凡。使。

鹽。煮。半。日。井。水。煮。半。日。焙。用。



蘭茹

瀉破血



辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥虫除熱痺破癰瘰

內經同烏雞骨  
治婦人血枯

根如蕪荏皮黃白葉長微潤折

之有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

菴蘭

瀉行水

散血



苦辛微寒別錄微溫入肝經血分行水散血散中有補治

陽痿經滯腰膝骨節重痛產後血氣作痛閉折傷

撲打方能制蛇見之  
多用之能制蛇則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗以薏為使

鬱金

宜行氣

解鬱

涼血破

瘀



辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包絡蕪

入肺經涼心熱散肝鬱氣破血行滯氣亦不損正氣破瘀血亦能生

新治吐衄尿血婦人經時逆行經不下行上為吐衄諸症用鬱金未加非

汁薑汁童便服其血自  
清痰中其血者加牛膝  
血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心顛多主喜笑