

陳修園醫書五十種

主一

R2-51
34-4

內經
外驗
方古
病

經驗百病內外方

時疫結喉經驗良方 原序

喉間起白如腐一症。其害甚速。乾隆四十年前無此症。近來患此頗多。小兒尤甚。且易傳染。誤治不救。雖屬疫氣。究醫之未當也。按白腐即白癰喉。諸書未載。惟醫家心悟言之。症發於肺腎。凡本質不足。遇燥氣流行。多食辛熱。感觸而發。初起如發熱。鼻乾咳嗽等症。鼻通者輕。鼻塞者重。聲音清亮。氣息調匀。易治。音啞。氣急難治。有無知輩遇症。於喉間妄刮其白。並亂用刀針。益傷其喉。豈不謬哉。治法總不外肺腎二經。宜以養陰清肺爲主。

養陰清肺湯。

此方屢試屢效。始見功效。切勿遷就。自服數

大生地二錢

炒八分
麥冬二錢

元參一分

丹皮八分

生甘草五分

貝母八分

薄荷五分

白芍五分

加連翹。去白芍。

燥甚加天冬茯苓。

小便赤加木通。

數日

體虛加熟地。熱

加連翹。

去白芍。

燥甚加天冬茯苓。

小便赤加木通。

數日

不大便。加元明粉。

如有內熱及發熱。

切忌發表。

即照此方連服。

其熱自除。

症重酌加分兩藥味平淡。

用當通神。

吹藥方。

磁瓶收固。切勿走氣。

青果炭

二錢

黃柏

一錢

兒茶

一錢

薄荷

一錢

川貝母

二錢

冰片

五分

鳳凰衣

五分

小劑

之雞
衣殼
內

右藥共研細末。再加冰片細杵。臨症吹患處。

喉間起白。用藥切忌者。如麻黃、桑皮、防風、杏仁、牛蒡、山豆根、黃芩、射干、花粉、羌活、荆芥。皆大苦寒涼表散下降之藥。切不可服。最能誤病。又凡喉症最不可發表而虛弱者尤不宜破血。是在臨症三思。

乙丑年余家患喉症死者十人。後得劉仙舟兄此方。服之甚效。因鈔傳親友家皆驗。不敢自祕。敬刊濟世。兼廣仙舟兄之德云。

同治五年春月大興周敬一印送

丁
月卯

刻重

續刊喉症祕方

丙寅春得劉仙舟錄傳養陰清肺湯諸方。刊印行世。救人頗效。今復出原本見示。書名重樓玉鑰。係古歎鄭淵樞扶氏所撰。余喜仙舟公世之誠。亟欲全刻廣傳。惟集方甚多。力所不及。茲擇簡便者續刊十餘方。以爲救時之助。使治方愈備。疫氣全消。誠所願也。至刊布全書。更所望於同志者與。有力諸君子。丁卯孟冬月周敬一又誌。

紫正散。

紫金皮

二分

荆芥穗

八分

北防風

八分

北細辛

四分

地黃散。

小生地

二錢

京赤芍

八分

蘇薄荷

六分

牡丹皮

八分

苦桔梗

八分

引

加燈心

二十節

以上紫地二散。每症合用勿煎。用開水泡藥蒸服。

如熱盛加連翹犀角。頭痛鼻塞。

加開關散。即白芷一錢。撫芎一分。

煩渴加銀鎖匙。即花粉八分。

元參一錢。

潮熱加柴胡黃芩。

咳嗽加麥冬。

知母。小便濁加木通。大便祕加元明粉。

熟壅肺閉氣喘加麻黃。

沫五分。

先用

水煎去

疾。

稠加貝母。孕婦去丹皮加四物湯。

辛烏散。

聚散
一名角

收入磁瓶。勿走藥氣。

赤芍梢

一兩

草烏

一兩

桔梗

五錢

荆穗

五錢

小生地

五錢

赤小豆

六錢

甘草

五錢

柴

胡

五錢

連翹

五錢

紫荆皮

一兩

細辛

五錢

皂角

五錢

捷妙丹。治單雙蛾神效。

牙皂打碎絲瓜子二錢。新瓦文火炙乾爲細末。加冰片少許。用時吹鼻中。患左吹右。患右吹左。鼻中雙患。並吹取嚏。數次即消。

嚴氏赤麝散。

專治一切喉痺。喉單雙蛾。又喉惡症。吹之立吐痰涎。取效如神。只虛

症喉癰嚥瘡不治。

眞血竭 五錢 巴豆 七粒去殼 明礬 一兩

用新砂鍋煉至礬枯。加梅冰片 三分 硼砂 二錢

共研極細末收固。臨用時冷茶嗽口。吹患處立效。

雄黃解毒丸。治一切喉痺極危症。

明雄黃 一兩 川鬱金 一兩 巴豆 十四粒去油去殼

共研細醋煮糊爲丸綠豆大。每服七

丸。清茶送下。吐出痰涎立效。如至死者。心頭猶熱。撬口灌之下。嚥可活。

火刺仙方。治一切喉痺纏喉。命在頃刻。急須製用。能起死回生。

用巴豆油塗紙上。撲作條子。於火上點著。煙起即吹滅。令病人張口。急刺於喉間。俄然吐出紫血。即時氣寬能言。並可立啖粥飲。蓋咽喉一症。最爲危險。頃刻腫閉。水米難下。雖用針刺吹藥。恐一時難瀉毒熱。惟此巴油火刺。可救危急。因熱則宣通。故以火治之。火氣熱處。使巴油可到。以火散結。以巴油瀉邪熱。以煙吐出痰涎。此誠一舉三善之捷法也。病輕可卽愈矣。症重亦可容再服諸藥。

絳雪丹。治喉腫喉癰。口舌生瘡。

寒水石 二錢

硼砂 一錢

辰砂 三錢

大梅片 三分

兒茶 三錢

共研極細末。用少許放

舌上。津液嚥之。或吹患處。

金鎖匙。治喉痺纏喉。痰壅。口不開。水不下。

焰硝一錢 硼砂五錢 片腦三分 雄黃二錢 白僵蠶一錢 共研極細收固臨用少許
吹患處。

真功丹。凡孕婦患喉症宜此。

大梅片一片 實熊膽一錢 蘆甘石七錢 用羌活煎湯燶
細吹患處。如遇平卽去牙硝 研

萬益丹。誤用刀致血流不止。宜敷此。

滴乳香一兩 去油真血竭一兩 硼砂一兩 沒藥一兩

研細用少許吹刀患處。

附刻

孚佑帝君救喉痛方。

陳皮 貝母 竹茹 木通 當歸 連翹 炙甘草 乳香 沒藥 防風
引燈心三支 水煎。

治纏喉風滴水不入奇效方。

明雄黃 白礬 牙皂去皮 藜蘆去心各一兩 共研細末。先令病人含水一口。用藥少

許吹鼻內。卽將水吐出。少時涎出立愈。

黃瓜霜。專治喉症奇效。

牙硝八成 白礬二成 將大黃瓜瓢取出。納硝礬於內。懸風處。俟霜出刮下。加冰片少

許研細用時吹患處立愈。

吹藥時不可
眼別藥

普濟散方。

倭硫黃五錢 上上猺桂心三錢 母丁香二錢

四十九製香附二錢 當門子一錢

以上各藥共研極細末用磁瓶封藏。

凡患吊脚痧者以此散一分五釐納入肚臍中外用暖臍膏藥封貼如症重逾時不效再用草紙三四張鋪於膏藥面上以微火熨斗熨之或於膏藥面上鋪用食鹽加生薑一片以蕲艾灸之無不立愈此藥峻猛斷不可喫孕婦忌用。

道光初年浙中多患急症俗呼吊脚痧以此散治之立效今歲時疫相似用特刊傳咸豐辛亥秋仲覺因道人識。

神妙經驗痧藥良方。

茅山蒼朮三兩 防米泔浸軟
切片晒乾爲末

麻黃三兩 細剉去根節

切片晒乾爲末

明天麻二兩 六錢

切片晒乾爲末

公丁香六兩 細剉去根節

切片晒乾爲末

真蟾酥九錢 最好

燒酒浸化研爲末

甘草三兩 細水飛研爲衣

錢三錢

者要上好爲末研

雄黃三兩 六錢

透明者研爲末

右藥各研細末以好燒酒勑半和之丸如蘿蔔子大硃砂爲衣候乾磁瓶收貯封固備用能治一切中暑中寒中風瘡瘍及各雜症每服九丸重者十三丸虛人孕婦忌用小兒輕用。

展子明傳接骨方

用旱公牛角一箇

火上夾乾
層刮一層

一榆樹皮白

不拘數

楊樹葉

不拘數

黃米麪

不拘數亦可

蓮花

椒

七粒

共爲細末。以數年陳醋熬成稀糊。青布攤貼薄木片。纏住時刻。聞骨內響聲不絕。俟定卽接。如牛馬跌傷。及樹木被風刮折。亦能接上。

神驗刀瘡藥方。

生白附子

六錢

羌活

五錢

生南星

五錢

天麻子

五錢

白芷

五錢

防風

五錢

共爲細末。過篩。破處敷上。傷重者黃酒浸服五分。重甚者再服五分。青腫白酒調敷。

一切破爛乾敷亦愈。其效如神。

固齒神方。

青鹽

五錢

石膏

五錢

補骨脂

四錢

花椒

一錢五分去目

白芷

一錢五分

南薄荷

二錢五分

旱蓮草

二錢五分

防風

二錢

細辛

一分

共爲細末。每早洗臉後擦牙。用水頻漱吐之。治牙陳方甚多。苦無大效。昔有人四十後病齒。大牙已脫三箇。遇德州盧南石相國之弟。傳此方用之。動者復固。齒病遂除。卽冬月食火鍋並煎炒等物。牙縫裏出疙瘩。用此末多擦一二次。旋卽消滅。眞第一效驗方也。若於三四十歲卽用之。無閒斷。可保至老不脫。永免牙患。有此神方。諸方

可廢矣。

治痔瘡毒方。

翻白草一兩 荷葉一張 煎湯熏洗。

治鼠瘡方。

豆腐灰一錢 黃豆末五錢 水銀五分 人言半分

共爲細末。用香油調擦過六日起去。再貼膏藥。開列於後。

鼠瘡膏藥方。

香油半斤 定粉二兩 頭髮四錢 黃丹四錢

先將油熬滾。再下頭髮煎枯黑。去渣離火。入黃丹。再入定粉成膏。用絹紙上攤貼患處。十八日全好。

猪羊癲瘋奇效仙方。 治猪羊癲瘋。時常跌倒。不省人事。竟成廢人。一料除根。

皂礬一兩
煅紅 薑一兩 切
魚膠一兩
斷續炒 鉛粉一兩
炒黃 硫砂三錢

以上研極細末。每早空心陳酒浸服三錢。自愈。經驗。

千鉗膏。

鮮桃仁一兩 松香三兩 樟腦三錢 硫砂五分
先將桃仁搗碎。入松香再搗。後入樟腦硫砂同搗成膏。遇有大小火瘡。及初起紅腫。

疼痛麻癢之癥。量其大小貼之。一日一換。輕者消化。重者出頭去腐生新。極爲神效。
解吞鴉片生烟毒神方。

凡吞鴉片烟中毒者。用**硼砂**五錢。以涼水調和灌下。輕則一吐而愈。重則從大便瀉出。此方前從陝西傳來。昨嘉興有中鴉片毒者。照服已救數人。眞神方也。

同治十年十一月雪門許瑤光識

哮喘奇方。

貼肺俞穴。背脊中骨第三節風府門。

川烏	大錢	連翹	八錢	當歸	六錢	白芷	八錢	木鱉子	八錢	官桂	八錢	茯苓	錢六
赤芍	八錢	草烏	六錢	白薇	八錢	牙皂	五錢	桑枝	五錢	烏藥	六錢	桃枝	五錢
柳枝	五錢	槐枝	五錢										

右藥同麻油三斤。浸藥一宿。熬焦去渣。入飛黃丹一斤如麥色。急以桃柳棍二根攪至滴水成珠。入乳香沒藥細末各四錢。收膏攤貼。三伏九九。其病可以除根。神效。

仙傳百草霜丸神方。

治一切吐血鼻血及七竅流血失血怪症。遲者不治。

百草霜

三兩

陳墨

二兩

薑黃

一兩

桑葉

二兩

三七

一兩

連翹

一兩

燈心炭

一兩

各爲細末。糯米粥取汁爲丸。如粟米大。每服一錢。白溫水送下。神效。

腹瀉初起方。

陳茶

二錢

燒核桃仁

五箇

生薑

三錢

紅糖

三錢

水煎服。食下即響。而卽瀉。紅柿核紙包水濕灰火煙熟。食四五箇卽止。
又治腹瀉痢疾方。

生車前子 熟車前子 生山查 熟山查

兩各一

共爲細末。用紅白糖。紅白蜜。滾水調服二錢。如白痢用白糖蜜。紅痢用紅糖蜜。若紅白痢。白紅糖蜜均用。若瀉之不出者。多加蜜卽效。

午時茶方。

茅朮 + 十兩	陳皮 + 十兩	柴胡 + 十兩	連翹 + 十兩	白芷 + 十兩	川朴 + 十五兩	枳實 + 十兩	查肉 + 十兩
羌活 + 十兩	前胡 + 十兩	防風 + 十兩	藿香 + 十兩	甘草 + 十兩	陳茶 + 二十	桔梗 + 十五兩	麥芽 + 十五兩
蘇葉 + 十五兩	建龜 + 十兩	川芎 + 十兩					

右研細末拌勻。宜五月五日午時合糊成小塊。每服三錢。專治一切風寒感冒停食。
及不服水土。腹瀉腹痛等症。服時加葱薑少許。煎熱服。汗出卽效。
治瘡方。

當歸 + 一錢	陳皮 + 二錢	草菓 + 一錢	知母 + 一錢	川芎 + 一錢	蒼朮 + 一錢	半夏 + 一錢	真烏梅 + 五錢
打碎燒熟防風 + 一錢	杜仲 + 一錢	常山 + 一錢	甘草 + 一錢	檳榔 + 一錢	荆芥 + 一錢		

共研末。將藥放鍋內炒熟。於瘡未發時。用稀布包裹。捆紮臍上。臍內先以藥末三分
填滿。其發必輕。再炒再捆。無有不效。閉口瘡更效。輕者一服。重者兩服必愈。年老人

不肯服藥用此最效。

萬應琥珀膏。專治一切癬疥結核瘡癧初起已破擦之生肌止痛并治刀傷出血及腐爛者擦之即可合口定痛神效無比。

全當歸

錢五

大黃

錢四

上血竭

錢四

川黃連

錢四

小生地

錢八

黃芩

錢四

眞琥珀

錢四

別研

生甘草

錢四

大楓子肉

錢四

黃柏

錢四

枯礬

錢四

僵蠅

錢四

僵蠅

錢四

僵蠅

用好麻油一斤將藥十味熬枯油色紫紅去渣入琥珀末并黃蠟二兩候化開離火用槐枝一根攪勻冷定成膏不可太老埋入土地退去火毒一月取出用時加黃色三仙丹少許調勻隨時擦之看瘡輕重加之輕以少爲妙重稍多加不可太多金刃傷則不必加三仙丹此膏愈陳愈妙。

化鬱膏。

歸尾

錢六

鱉甲

錢八

巴豆

錢四

研

黃連

錢四

三稜

錢四

莪朶

錢四

山甲

一兩

研

指甲

錢一

以上諸藥用蒜

硼砂

錢四

礦砂

錢四

阿魏

錢六

研

麝香

分一

高麗參

錢四

三七

錢四

肉桂

錢八

研

水蛭

二錢

於黃梅時節令味宜

擗

宜

人收
者不用
有
一種
色
黑
較
螞
蟻
稍
大
者
便
是

右藥共爲細末攪入膏藥內用狗皮攤貼

如布亦可

貼時用皮硝熬水棉花蘸擦患

處令透拭乾再切生薑片擦擦然後貼

忌食一切無鱗魚鱈麥馬齒莧黃瓜生冷

之物如係血塊。另加臭蟲二十個用香油浸透。搗爛和入膏藥內。攤貼無不內消。

治癬方 雌黃爲末。入輕粉和猪膏擦之。

又方 豆腐乾以蔬油煎。取油塗之。

又方 皂筍入醋煎三日夜乾爲末。敷之。

此方得效最速而疼痛無比

又洗癬方。

生地二錢陳皮二錢麥冬二錢赤苓一錢竹茹二錢遠志一錢柳枝十寸甘草一錢
燈心一小扎濃煎頻洗。

治牙疳莧棗散。

白芨菜梗炭三錢兒茶二錢紅棗炭一錢黃豆五分每棗大黃一枚研成硼砂二錢人中白錢一
冰片二分

共研極細末。用瓶封固收存。勿令走氣。每遇牙根腐爛。血肉自落。時時擦之。候滿口涎水。用清水漱去。輕牙根疼痛重。連牙皆落。用此藥上之。神效無比。曾經效驗。因錄出傳之。

擦牙散。

生大黃五錢熟大黃五錢生石膏五錢熟石膏五錢沒石子一對青鹽二兩
共爲極細末。每早擦之。自能治一切蟲牙火牙。久久自有功效。

治疥瘡神效方

硫磺一兩 輕粉三錢

先將硫磺入鍋內鍊化候。起烟將燃。含冷水一口噴之。再鍊候起烟將燃。再用水如前噴之。或三四次。或五六次。然後將輕粉放入攪勻。放地上候冷。卽凝結成塊。研極細末。加冰片三分。麝香半分。用瓶裝好。擦一切疥瘡。神效無比。如畏痛。用麻油調擦亦可。不是真疥瘡。萬不可用。慎之慎之。

倪涵初先生治瘡奇效三方

瘡之爲患。南人患之。北人尤甚。弱者患之。強者尤甚。雖不至遽傷大命。然不治則發無已時。治之不得其道。則惡邪內伏。正氣日虛。久而久之。遂不可藥。倪涵初先生所定三方。甚爲平易無奇。絕不入常山草果等劫劑。且不必分陽瘡陰瘡。一日二日三日。及非時瘡。人無老幼。病無久近。此三方不用加減。惟按次第服之。無不應手而愈也。

第一方。

廣陳皮 陳半夏

蜜透汁

白茯苓

威靈仙各一錢

各一錢

蒼朮

米泔水浸切片炒

一

紫厚朴

蜜炒汁

黃芩

分各八

青皮 檳榔

各六分

炙甘草

三分

右咀片如法炮製。加薑三片。井水河水各一鍾。煎九分。飢時服。其渣再煎服。如頭痛。加白芷一錢。此方平胃消痰。理氣除濕。有疏導開導之功。受病輕者。二劑卽愈。勿再

藥可也。若三劑後病勢雖減而不全愈必用第二方少則三劑多則五劑而已。

第二方

何首烏生用三錢陳廣皮 白茯苓 柴胡 黃芩各八分白朮炒一錢威靈仙各二錢知母二錢

當歸

一錢

鱉甲

醋炙二錢研粉

炙甘草

三分

右藥加薑三片井水河水各一鍾煎八分加無灰酒五分再煎一滾空心服二煎三煎并服此方妙在補瀉互用虛實得宜不用人參黃耆屏去常山草果平平無奇卻有神效卽極弱之人纏極重之病十劑後立有起色定奏萬全所云加減一二卽不靈應者正在此方也。

第三方

人參

一錢

炙黃耆

二分一錢

白朮

炒一錢

廣陳皮

八分

炙甘草

三分

柴胡

六分

升麻

四分

或加何首烏二錢

炒知母一錢或加青蒿子八分

麥芽一錢

右藥加薑一片棗二枚水二鍾煎八分半飢時服用三五劑元氣充實永不發矣。方雖有三第二實爲主方既不刻削並可峻補功獨歸之其第三方專爲有力者及虛極者而設貧家只多服第二方可也。

久癰全消力

威靈仙

蓬莪朮

醋炙

麥牙

炒各一兩

何首烏

生用二兩

青蒿子

五錢

金毛狗脊

去毛大根八錢

穿山

甲 炒水黃切細

黃丹錢各

鱉甲四兩酒炙

以上九味共爲細末聽用如小兒加黃雞肫

以上九味共爲細末聽用如小兒加黃雞肫

皮炙末五錢外用山藥粉一兩餳糖一兩。

右加水一小碗爲糊擣藥丸如棗豆大每半飢時薑湯送下二三錢。

凡處暑後冬至前或間日或非時纏綿日久並治瘧母予嘗酌定此方服不半料遂全愈收功

倪涵初先生治痢奇效三方。

痢爲險惡之症生死所關不惟時醫治之失宜而古今治法千家多不得其道是以不能速收全效今立方何以爲奇不泥成法故奇也立論何以爲妙不謬成說故妙也然其藥品又不外乎常用而已有識者切不可更改勿爲庸醫所誤遵而用之百試百效者也。

初起煎方。

川黃連去蘆條黃芩去蘆白芍錢半山楂肉各一錢半陳枳殼去穠厚朴去皮薑炒檳榔汁拌青皮錢研如粉

八分當歸五錢

甘草各五分

地榆五分

木香五分

紅花酒炒五分

桃仁去皮尖一錢研如粉

右咀片如法炮製用水二碗煎一碗空心服渣再煎服。

此方或紅或白裏急後重身熱腹痛者俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅五分。木香可用三分如帶滯澀甚者加大黃二錢用酒拌炒服一二劑仍除之若用一劑