

外台秘要

(三)

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第八目錄

痰飲胃反噎
鯁等三十門

痰飲論二首

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

懸飲方二首

溢飲方三首

支飲方九首

留飲方二首

酒癖飲方三首

留飲宿食方七首

痰癖方二首

飲癖方二首

癖飲方七首

冷痰方四首

痰結實及宿食方三首

胃中痰滯方三首

痰厥頭痛方八首

風痰方五首

療諸痰飲方四首

胃反方二十首

脾胃弱不能食方三首

尚振
今有方
六首

尚德
今有方

脾胃病日漸瘦困不食方三首

胃實熱方二首

胃虛寒方七首

五膈方八首

七氣方三首

氣噎方六首

諸噎方一十二首

卒食噎方九首

五噎方三方

諸骨哽方三十五首

雜誤吞物方一十七首

正氣散三首

平食散六首

黃連散六首

承氣散六首

大承氣三首

正氣散八首

胃氣散六首

胃氣散六首

胃氣散六首

唐王燾先生外臺秘要方第八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣王燾等謹進

新安後學程衍道敬通父訂梓

痰飲論二首

兩德按
病源
作府
又按飲
病源作

病源痰飲者由氣脉閉塞津液不通水飲氣停在胸臍結而成痰又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲其為病也胃脅脹滿水殺不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胃背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得臥其形如腫是也脉偏弦為飲浮而滑為

飲其湯熨針石別有正方補養宜導今附于後養生方導
引法云左右側臥不息十二通療痰飲不消右有飲病右
側臥左有飲病左側臥又有不消氣排之左右各十二息
療痰飲

出第二十卷中

千金痰飲論問曰夫飲有四何謂師曰有痰飲

一云留飲

有懸

飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素
盛今瘦水走腸間漑漑有聲謂之痰飲飲後水留在脅下
欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗
出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形
如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人

高德按
聖千金
作金下
同

眩而癰先寒卽爲虛先熱卽爲實故水在於心其人心下
堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲
水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支滿噎
而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食
少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆
大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支
飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱
脉微煩滿不能飲食脉沉滑者留飲病病有留飲者脅下
痛引缺盤欬嗽轉甚一云其人欬而不得臥引項上痛欬
者如小兒掣癇狀夫胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷

節痛心下有留飲其人背寒冷大如手病人胃息上引此
皆有溢飲在胃中久者缺盤滿馬刀腫有劇時此爲氣飲
所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣出
其人振振身瞶劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在
一臂其脉沉細此非風也必有飲在上焦其脉虛者爲微
勞榮衛氣不周故也

出第十八卷中通按形不發作謂表無病狀也

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫痰水結聚在於胃膈膀胱之間久而不散流行於
脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛
滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也

出第二十卷中

廣濟療心頭痰積宿水嘔逆不下食前胡丸方

前胡

白朮

甘草

炙各五分

旋復花

豆蔻人

各三分

人參

麥門冬

去心各六分

枳實

炙

大黃

各四分

右九味搗篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十九

漸加至三十九日再服不利忌桃李雀肉海藻菰菜熱

麪炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心胃中痰積氣噎嘔逆食不下方

柴胡

橘皮

各六分

茯苓

十分

人參

麥門冬

去心

雞蘓

各八分

生薑

二十分

檳榔人

四分末湯成下

金三
作二
兩
三
兩
一
兩

右八味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服
服別相去如人行七八里進一服未差三日更服一劑
以利爲度忌酢物生冷油膩粘食

並出一卷中

千金療痰飲飲食不消乾嘔湯方

澤瀉

杏人

去尖皮

枳實

炙

白朮

各三兩

茯苓

柴胡

生薑

芍藥

各四兩

旋復花

人參

橘皮

細辛

各二兩

半夏

四兩洗

右十三味切以水九升煮取二升七合分爲三服忌桃

李雀肉大酢生菜羊肉鰾等物

高麗參 千金橘 十二 救生薑 四兩半 姜八兩

又療胃中痰飲腹中水鳴食不消嘔吐水湯方

大腹楨榔

四十枚

生薑

八兩

半夏

半升洗

杏人

四兩去尖皮

橘皮

三兩

茯苓

五兩

白朮

四兩切

右七味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌羊肉餛

大酢桃李雀肉等

古今錄驗同並出第十八卷中

范汪薑椒湯主胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆

吐哕方

半夏

三兩洗

生薑

汁七合

桂心

附子

炮

甘草

炙

茯苓

桔梗

各一兩

蜀椒

二合汗

橘皮

二兩切

尚德按
煮取二
升半內
薑汁七
合煎取
四升半
可疑千
金及翼
並四作
二為當

右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取四

升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先

服此方及進黃耆九葦必佳忌海藻菰菜羊肉飴生葱

豬肉冷水酢物 千金翼深師同

又白朮茯苓湯主胷中結痰飲澹結臍下弦滿嘔逆不得

食亦主風水方

白朮 五兩 茯苓 三兩

橘皮 當歸

附子 炮各二兩 生薑 半夏各四兩切

桂 四兩

細辛 四兩一作人參

右九味切以水一斗煮取三升分三服服三劑良忌羊

肉錫桃李雀肉豬肉冷水生葱生菜醋物等

千金翼同

又旋復花湯主胃膈痰結唾如膠不下食者方

烏頭

五枚去反熬

旋復花

細辛

前胡

甘草

炙

茯苓

各二兩

半夏

一兩洗

生薑

八兩

桂心

四兩

右九味切以水九升煮取三升分爲三服忌羊肉錫海

藻菰菜生葱酢物豬肉冷水等

並出第十六卷中

延年茯苓飲主心胃中有停痰宿水自吐水出後心胃間

虛氣滿不能食消痰氣令能食方

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

三兩

生薑

四兩

枳實

二兩

橘皮

一兩半切

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如

人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等

仲景傷寒論同出第十七卷中

古今錄驗療胃膈痰飲食噉經日則併吐出食皆不消出如初空腹一兩日聚食還復吐之極不便此由痰飲聚下絕不通服此丸宣通下氣方

吳茱萸

澤瀉

芍藥

白朮

漢防己

赤茯苓

各二兩

蜀大黃

二兩

有七味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服二十五丸忌桃

李雀肉酢物

出第十九卷中

懸飲方二首

病源懸飲謂飲水過多留在脅下令脅間懸痛欬唾引脅

痛故云懸飲

出第二十二卷中

范汪大耳遂丸療久澼留水澼飲方

芫花

熬

耳遂

葶藶子

熬

大黃

苦參

大戟

芒消

貝母

桂心

各一兩

杏仁

三十枚

巴豆

三十枚去心皮熬

烏喙

三分炮令折

右十二味擣篩其巴豆杏仁擣如膏合以蜜和丸如大

豆許服二丸日三服不知稍加以意將息之大佳療大

水飲病忌食蘆筍豬肉生葱等

出第十六卷中

千金療懸飲十棗湯方

芫花

甘遂

大戟

右三味等分擣篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取一錢匕羸人半錢匕頓服之平

旦不下者益藥半錢下後以糜粥自養

此本仲景傷寒論方出第十八

卷中

溢飲方三首

通按
溢飲當

汗出而
不汗出

身六如
腫人云

多汗不

卜何故

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也

出

第二十卷中