

卷一

徐
君
謨

蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洄溪著

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便濕家之為病一身盡疼發熱身色如黃黃也此黃與黃濕各別濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔或胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口煩燥也濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈納鼻之藥金匱本載後廣求其法以補之亦不過牙皂瓜蒂之類

濕方

麻黃加朮湯金匱

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

二兩

杏仁

七十個

白朮

四兩

右五味以水九升先煎麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯金匱

風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己

一兩

甘草

半兩

白朮

七錢

黃耆

一兩一分

去蘆

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩

胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

加桂枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

麻黃杏仁薤白甘草湯金 病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

麻黃半兩 湯兩 甘草一兩 薤白半兩 杏仁十個 去炒 右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服有微汗避風

桂枝附子湯金 傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濡者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝四兩 去皮 生薑三兩 附子三枚 泡去 甘草二兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯金 白朮二兩 附子一枚 泡去 甘草一兩 生薑半兩 切 大棗六枚 右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服

服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪即是木附並走皮中逐水氣未得除故耳

甘草附子湯金 風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之

甘草二兩 附子二枚 泡去 白朮二兩 桂枝四兩 右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙此風濕而兼寒者 二妙散丹 治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黃柏炒 蒼朮炒去

右為末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之在表之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義

黑地黃丸方見

陽

至遺

太陽中暈發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細孔遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚此中暈乃中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

暈方

白虎人參湯金匱 太陽中熱者暈是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 人參三兩 右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劇則立危矣

一物瓜蒂散金匱 太陽中暈身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂二十 右剉以水一升煮取五合去滓頓服之此方服之當吐

香薷飲局方 治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩燥口渴腹滿吐瀉者

香薷一斤 厚朴半斤 白扁豆炒各半斤 右水煎浸冷服此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

干味香薷飲 即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白木茯苓

黃連香薷飲 即香薷飲加黃連同炒黃色

枇杷散局方 治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈

枇杷葉

陳皮

丁香

厚朴

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

一兩

香茹

七錢

右為末

每二

錢薑三片

煎湯調服

溫服亦可

如煩燥

并水調下

小兒三歲以下

服五分量

大小加減

蟾酥丸

方秘

茅朮

雄黃

一辰砂

五錢

麝香

一錢

丁香

牙皂

各三錢

蟾酥

五錢

右用火酒化

蟬酥打丸

如鳳

仙子丸

辰砂為衣

放舌底化下

重者二三丸

千金丹

秘方即人

馬平安散

麝香

冰片

各二錢

硃砂

五錢

雄黃

硼砂

硝

各一錢

金箔

一百張

或

右七味為末

或水服二三

或嗅少許於鼻內

入刮痧法

用薄錢蘸香油

刮胸背及臂股灣

令色紫痧起為度

或用婦人縛髮油

繩蘸油刮亦可

紫金錠

蘇合丸

藿香正氣散

生脈飲

六一散

以上俱

見通治

核瘰

素問

瘰癧

黃帝問曰

夫瘰癧皆生於風

其畜作有時者何也

岐伯曰

瘰癧之始發也

先起於毫毛

伸欠乃作寒慄

鼓頤腰脊俱痛

寒去則內外皆熱

頭痛如破

渴欲冷飲

帝曰

何氣使然

岐伯曰

陰陽相移也

陽升於陰

則陰實而陽虛

陽明虛則寒慄

鼓頤也

巨陽虛則腰背痛

三陽俱虛則陰氣

勝陰氣勝則骨寒而痛

寒生於內

故中外皆寒

陽盛則外熱

陰虛則內熱

外內皆熱則喘而渴

故欲冷飲

也此皆得之夏傷於暑

熱氣盛藏於皮膚之內

腸胃之外

此榮氣之所舍也

此令人汗孔疎

腠理開

因得

秋氣汗出遇風

及得之以浴

水氣舍於皮膚之內

與衛氣并居

衛氣者

晝日行於陽

夜行於陰

此氣得陽

氣

而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循脊而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍稍益晏其出於風府日下一節二十五日下至胛骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循脊而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧而論此等極多不獨論瘧為然故學者當以意會也岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅求其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日

者邪氣與衛氣客於六腑。而有時相失不能相得。故休數日乃作也。其以秋病者。寒甚。以冬病者。寒不

甚。以春病者。惡風。以夏病者。多汗。瘧脈緩大虛。便宜用藥。不宜用鍼。凡治瘧。先發如食頃。乃可以治。過

之則失時也。諸瘧而脈不見。刺十指間出血。血去必已。先視身之赤如小豆者。盡取之。瘧疾藥當在未來時前服刺瘧之法

簡易可學不必習鍼法皆能之亦治瘧之要訣也

風瘧。素生氣通天論。魄汗未盡。形弱而氣燄。穴腠以閉。發為風瘧。又云夏傷於暑。秋為瘧瘧。二日一發者為

瘧瘧瘧與瘧同

似瘧。素生真要大論。帝曰。火熱復惡寒發熱。如有瘧狀。或一日發。或間數日發。其故何也。岐伯曰。勝復

之氣會合之時。有多少也。陰氣多而陽氣少。則其發日遠。陽氣多而陰氣少。則其發日近。此勝復相搏。盛

衰之節。瘧亦同法。瘧亦同法則非瘧可知

金匱

師曰。瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者。下之。差。弦遲者。可溫之。弦緊者。可發汗。針灸也。浮大

者可吐之。弦數者。風發也。以飲食消息止之。但熱不寒者。邪氣內藏於心。外舍分肉之間。令人消燂肌肉

壯瘧。瘧多寒者。名曰壯瘧。似當作壯字諸本皆作壯存考

瘧方

蠶甲煎丸。金匱病瘧以月一日發。當以十五日愈。設不差。當月盡解。如其不差。當云何。師曰。此結為癥瘕

名曰瘧母。急治之。宜此方。

蠶甲十一分烏扇三分黃芩三分柴胡六分鼠婦三分乾薑三分大黃三分芍藥五分桂枝

葶藶一分石韋三分厚朴三分牡丹五分瞿麥二分紫威三分半夏一分人參一分廬蟲五分

去毛

阿膠三分蜂巢四分赤消十二蜣螂六分桃仁二分右二十三味為末取煅竈下灰一斗清酒一

斛五斗浸灰候酒盡一半著蠶甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁納諸藥煎為丸如梧子大空心服七

丸日三服

白虎加桂枝湯金溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時吐此湯主之

知母六兩甘草二兩石膏一斤粳米二合桂枝三兩右剉每五錢水一盞半煮至八分去滓溫服

汗出愈內經以先熱後寒為濕

蜀漆散金瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之壯宜

蜀漆洗去雲母燒二日夜龍骨等分右三味杵為散未發前以漿水服半錢七溫瘧加蜀漆半分臨

發時服一錢七

柴胡去半夏加栝蒌湯金治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩人參黃芩甘草各三栝蒌根四兩生薑二兩大棗十二右七味以水一斗二升煮

取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂薑湯金治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤桂枝三兩乾薑二兩栝蒌根四兩黃芩三兩牡蠣二兩甘草二兩右七味以水一斗二

升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆九金主瘧瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆知母白薇地骨皮麥門冬去心升麻各五恒山半兩石膏二兩香豉一合姜豉烏

梅肉龍甲甘草各一右十三味搗篩為末煉蜜和丸如桐子大空腹飲服十九日再加至二

三十九丸 此方治三日瘧為宜

陵鯉湯 千金主瘧疾江南瘧瘧方

陵鯉甲 四十枚炙烏賊魚骨 附子 泡各一兩去皮 恒山 三兩

之勿絕吐之并塗五心一日斷食過時久乃食 用生藥探吐法

瘧瘧病醫不能救者方 千金外治截瘧法 以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量

繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定候至過發

一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足

療瘧常山湯 外臺吐法

常山 三兩 右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生蔥生菜

牡蠣湯 外臺治壯瘧

牡蠣 四兩 麻黃 四兩去節 甘草 二兩 蜀漆 二兩

藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服 右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升納諸

消脾湯 生濟治熱多陽瘧

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮 草果 煨 右九味加薑三片水

煎服

常山飲 方局治痰瘧

常山 大酒 知母 貝母 草果 檳榔 各一錢 烏梅 三個

面東溫服 右六味加薑棗煎瘧未發時

烏梅引子 療溫瘧勞瘧

烏梅 七個 桃柳心 各七葉 白豆豉 一合 甘草 四分 柴胡 四分 知母 四分 大黃 三分 右八味各

細剉以童子小便兩茶碗宿浸明旦早煎三二沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻菰菜

集驗瘧必從四肢始療方 先其時一日頃用細左索繩繫束其手足十指過發時乃解之 此即內經之法

四獸湯 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生薑 烏梅 大棗

甘草 各等 右以鹽少許淹食頃濕紙厚裏慢火煨香熱每服四錢溫服

小柴胡湯 見傷寒 治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日用溫

補以扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼使血何如歧伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如歧伯曰脈沉則生脈浮則死帝曰腸澼下膿何如歧伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如歧伯曰滑大者曰生懸澼者曰死以臟期之 氣厥論腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治 大奇論腎脈小搏沈為腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈澼為腸澼其身熱者死大陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不時臥上為喘呼入五臟則填滿閉塞下為飧泄久為腸澼 此俗所謂腸紅病也

金匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五臟氣絕於內者痢不禁下甚者手足不仁下痢脈沈弦者下重脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順也下痢有微熱而渴脈弱者令自愈下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也下痢脈數有微熱汗出令自愈設脈緊為未解下痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也下痢氣者當利其小便下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿下痢脈沈而遲其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面帶陽下虛故也下痢後脈絕手足厥冷時時脈還手足溫者生不還者死下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表以上諸證皆屬陰寒之痢非暑毒之痢也治法大相懸殊

病源

痢而赤白者是熱乘於血血滲於腸內則赤也冷氣入腸搏腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂魚腦痢也血痢者熱毒折於血入大腸故也休息痢者胃腕有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也痢如膏由臟腑虛冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛滑脂凝如膏也蟲蛀痢毒氣侵於臟腑如病蟲蛀之家痢血雜膿痰黑有片如雞肝與血俱下是也雜痢謂痢色無定或水穀或膿血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也按熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故變易

痢方

桃花湯金匱下痢使膿血者此湯主之

赤石脂一斤一半 乾薑一兩 粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合納赤石脂

末方寸七日三服若一服愈餘勿服此治下焦滑脫之痢

白頭翁湯金匱 熱痢下重者此湯主之

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮各三兩

紫參湯金匱 下痢肺痛此湯主之

紫參 半斤 甘草 三兩 右二味以水五升先煮紫參納甘草煮取一升半分溫三服紫參疑即燭上染紅色者

訶梨勒散金匱 治氣痢

訶梨勒 十枚 右一味為散粥飲和頓服

甘草瀉心湯傷寒論 傷寒中風醫反下之其人下痢日數行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩

不得安此湯主之

甘草 四兩 黃芩 乾薑 各三兩 半夏 半升 黃連 一兩 大棗 十二枚 右六味以水一斗煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三服此治上焦不和之痢

黃芩湯傷寒論 太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯 若傷寒本自寒下

醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

黃芩 三兩 甘草 芍藥 各二兩 大棗 十二枚 右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一

服此熱痢之主方

黃芩加半夏生薑湯傷寒論 即前方加半夏 半升 生薑 三兩 煎服法同

乾薑黃連黃芩人參湯傷寒論

乾薑 黃連 黃芩 人參 各二兩 右四味以水六升煮取二升分溫再服瀉心湯以下四方皆以黃芩為

主而因證加減此痢疾之正方也

赤石脂禹餘糧湯傷寒 傷寒服湯藥下痢不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之痢不止醫以理

中湯與之痢益甚論 理中者理中焦此痢在下焦此湯主之

赤石脂碎 禹餘糧碎各一斤 以上二味以水六升煮取二升去滓三服下焦乃大腸之底也

雄黃丸 夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方一紙讀之數

遍其詞曰毒暑在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和約甘草作湯服之安樂別作治

瘧醫家大錯如方製約服之逐愈此方治暑毒痢

柴胡加芒硝湯鵠寒 治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱已而微痢先以小柴胡解外後以此主之即

柴胡湯方加芒硝二兩 右先煎柴胡湯去滓納芒硝分溫再服不解更作

瓜蒌散 治五色痢久不愈者

瓜蒌一個以炭火煨存性蓋地上出火毒 右研細溫酒服盡

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方外臺

升麻 地榆 葛草 黃連各六分 犀角四分 生地 八分 梔子 薤白 香豉各二 右

九味以水六升煮取一升五合分溫三服日再此血痢之主方

主赤白痢方外臺

黃連二兩 阿膠四片 右二味以酒二升合黃連煎十五沸去滓然後納阿膠令烊溫服三升此治血熱之痢

療五疳蒸下痢方外臺

苦參 青箱 甘草炙各三兩 右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服地汁即差

此藥治蟲

薤白湯 活人書 傷寒下痢如爛肉汁赤白帶下伏氣腹痛諸熱毒並皆治之

致 半斤 薤白 一把 梔子 七枚大者破之 右剉如麻豆大以水二升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升許

下致煎取一升二合去滓每服一湯盞

訶梨勒丸 方 治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度

肉豆蔻 去皮 木香 乾薑二兩各十 縮砂仁 訶梨勒皮 川烏頭 泡去 白礬 煨各十 龍骨 洗

赤石脂 各十 右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十九至三十九溫粟米飲下食前服甚者

可倍加丸數 此溫瀉之劑

葛根湯 葛根黃芩黃連湯 當歸四逆湯 大承氣湯 小承氣湯 四逆散

四逆湯 白通加猪膽汁湯 白通湯 四逆加人參湯 通脈四逆湯 猪膚湯

陽毒升麻湯 以上十三方俱見傷寒門 生薑瀉心湯 見嘔吐門 烏梅丸 方見蟲門 威喜丸 方見通治此方和劉名感應丸

癰狂癰

靈素

靈癰狂篇 狂自生先自悲也喜忘苦怒喜恐者得之憂飢狂始發少卧不飢自高賢也自辯智也自尊貴也善言罵日夜不休狂言驚善笑好歌樂忘行不休者得之大恐狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也狂者多食喜見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜

骨癰 靈癰狂篇 骨癰疾者頤頤諸腠分肉皆滿而骨居汗出煩悅嘔多沃沫氣下泄不治

筋癰疾 靈癰狂篇 筋癰疾者身倦攣急嘔多沃沫氣下泄不治

脈癰疾 靈癰狂篇脈癰疾者暴仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血嘔多沃沫氣下泄不治
素生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂 宣明五氣論五邪所亂邪入於陽則狂 調經論血
并於陰氣并於陽故為驚狂 至真要大論諸躁狂越皆屬於火 通評虛實論帝曰癰疾何如岐伯曰
脈搏大滑久自已脈小堅急死不治帝曰癰疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死 陽明脈解篇
岐伯曰四肢者諸陽之本陽盛則四支實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故
棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲
食不欲食故妄走也

陽厥怒狂 素病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽
厥帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛飲者下氣疾也

胎病 素奇病論帝曰人生而有病癰疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中
時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癰疾也

難經

癰疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也 重陽者狂重陰者癰

病源

風癰 風癰者由氣血虛邪入於陰經故也又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癰其發則仆地吐
涎沫無所覺是也此俗名羊頭癰

五癰 五癰者一曰陽癰發如死人遺尿食頃乃解二曰陰癰初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三
曰風癰發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解四曰濕癰眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦肺未止得之

五曰馬癲發作時時反目口噤手足相引身體皆然

鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜魔或與鬼神交

通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也 十歲以上為癲十歲以下為癇大體不外三

種風驚食是也

千金

驚癇 癇分心肝脾肺腎腸腸之病及馬牛羊猪犬雞之別其象各有所似

癲狂方

生鐵洛為飲開素

生鐵洛即爐冶開鎚落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能降熱開結平水火之邪

故可以下氣疾除狂也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵銹水之類皆同此意此治怒狂之方以鎮肝為主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯傷寒論 治傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者

即桂枝湯去芍藥加蜀漆三兩洗牡蠣五兩龍骨四兩 右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆納

諸藥煮取三升去渣溫服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯傷寒論 治傷寒下之驚煩小便不利譫語身重不能轉側此湯主之

柴胡 龍骨 人參 茯苓 鉛丹 黃芩 桂枝各半 半夏 二合 大黃 二兩

牡蠣生一兩 生薑一兩 大棗 六枚 右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮去滓溫服一升

治癲狂百病千金翼

大麻子四升上好者 以水六升煮令芽生去滓取二升空腹頓服或多言語勿怪但使人摩手足煮法

畏若子散外臺 治五癰

猪卵一具陰乾 莨菪子三斤牛黃八分 鯉魚膽五分 桂心一兩 右五味以清酒一升漬莨菪子暴

令乾盡酒止搗合下篩酒服五分日再當醉不知稍增

肥膽丸方類 治一切癰癰風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪

蘊結

水銀二兩 硃砂二兩細研 黑鉛一兩 乳香一兩 右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂乳香乘

熱用柳木搥研勻丸雞豆大每服一丸井花水吞下病者得卧切莫驚動覺來即安再服一丸除根

琥珀壽星丸方類 治心膽破驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言妄見

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五升於坑內燒紅取出皮掃淨用好酒一斤 琥珀四兩 硃砂一兩 研飛

一半 右和猪心血三個生薑汁打麪糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如桐子大每服五十九煎

人參湯下日三

狂涎丹方類 治諸癰久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏用生半夏湯洗 白礬各半兩 鐵粉三錢 全蠍 甘遂各二錢半 右為細末生薑自

然汁為丸如菜豆大硃砂為衣每服十五丸食後生薑湯下忌食甘草

獨效苦丁香散 治忽患心疾癰狂不止得之驚憂痰氣上犯心包當治其源

以苦丁香即瓜蒂半兩為末每服一錢井花水調滿盞投之得大吐熟睡勿令人驚起

甘遂散方類 治癰狂及婦女心風血邪

甘遂末一錢用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在內合之綿縛外用皮紙