

內科理法後編卷四

虎伯撰

慈谿舒高第口譯

英國茹合

哈來參訂

新陽趙元益筆述

痘疹類病

即發紅發熱病

發明 此為傳染之病大概一生祇發一次以後即無此

病初起發熱定隔若干時皮膚即發紅

分類

痘瘡

牛痘

水痘

西名雞痘

麻子

疹子

爛喉

痧 瘟疫

痘瘡

發明 一種相遇傳染由氣傳染之病初起有重發熱之

證據而後發紅其紅續變斑點水點膿點此在八日內有之

分別

一稀痘

二密痘

三出血痘

四似痘

醫士雪騰海姆

弗蘭克以爲另屬一種謂之不發紅之痘

一稀痘

證據 抽搐乏力頭痛腰大痛背極軟弱舌有白苔作嘔上胃所痛疲倦暈睡如嬰孩則有痼證或羊癲瘋此證據後則有生炎發熱脉滿而數皮膚熱而乾生津液減少不安靜並有昏狂者此證據須至發紅時始退發紅之前有時能得汗大概在此時退熱

從抽搐起至四十八小時以後或更早或遲至第四日面上與額發出紅色其紅有清楚之小點約大如鍼頭在皮膚上覺稜起似小鉛珠

在第三日或第三與第四日之間其紅發滿於面而後至頸骨肩手臂身腿足尋常最多者在身之顯露處遮蔽之處有桃紅色

約第五日有小而圓之水疱其中凹有無色之流質實其中周圍有生炎之邊每點上有之發紅發熱此時卽退盡

約第六日咽喉發腫難咽物失音並流黏膩之涎生炎或發紅沿至口中並咽喉之內皮有小而圓之白點能見之

內科秘傳
二
眼皮亦累及在男子累及冒龜頭皮在女子累及陰戶皮
在第八日上點中無凹處周圍紅暈加大其疱中之質變
膿面腫眼皮脹厚至不能開視眼口鼻咽喉俱有痘
在第八或第九日痘漿已足其中有一紫色之點周圍生
炎紅暈始退面腫亦退手足始腫

自此以後痘粒破其中之漿溢出而乾成痂脫去甚速其
新皮膚有青蓮紅色如是一二十日手足之腫漸退在十
七日上病將全愈重者面上白麻別顯露處亦然

自發小點至漿足之候謂之痘熟候在此層時依其發紅
之多寡而分輕重然而尋常有早至第八日將有第二次

發熱極不安靜。夜不思睡。脉數而滑。舌色乾紫。小便少而色深。昏狂最易者在夜分。大便常秘結。亦有絕無者。內疔二密痘。

證據 此病與上病分別。在其輕重耳。其發紅之發熱。更重。加重至痘熟候。第二層發熱又更重。有時似發熱神昏。常有暈睡與昏狂及重泄瀉病。

發紅之時並其行法。亦有參差。尋常發腫之皮上。先有花斑。從此在第二日。卽有小膿點。似小紅點。其痘熟較早。痘粒不圓。俱扁而不整齊。且有時不變爲漿。但變爲紫色。漬水。其生炎通至近處筋絡薄衣。至末有大爛而脫去者。面

腫流涎早有之亦有極腫者發紅之時其熱雖減而不退盡第九日上病更加重有時得發熱神昏極重之證據紅色變爲烏青而黑將有平斑點而出血溺中有血或爲赤白痢口脣皮牙齒有垢在第十一日之夜間病人有癇證或昏睡而死此病之能愈者其麻較稀痘者更深更廣

三出血痘

又名黑痘

此類之分別在病之第三第四日間身上各處出血同時發出小紅點此發紅點因出血阻之初起皮膚有幾分或全分顯紅之斑點大自鍼頭至半寸徑陰戶腸口鼻內或大出血溺內尋常亦有血罩睛皮全發紅病者心清人亦

安靜其斑點加大變爲暗青蓮色出血因此病卽沈重在第四第五或第六日卽死病者亦不料及

成病之體心之左分常空右分有黑色黏韌之血聚於其處肺脾腸胞膜核俱有血聚內腎之空處有血塊腸內亦然此處之血聚從大出血之處而來大腸常有重血聚其所有斑點與皮膚所發者相同子宮陰戶俱有血塊在清汁皮上亦有出血之處

病勢在每次痘瘡爲時疫之候恒有數人患此病一見卽能知之但因其人死於發紅之前故此病之的確情形時常看錯

與此病相混者爲青蓮病

又名身虛泄血

疹子其皮膚下之血溢

出並內皮汁流出之血令此病似青蓮病其重發熱爲關照之證據並多發顯色之斑點令此病似疹子

醫者用眼與手指細察皮膚與口難於查明者少此病的確之情形數點白膿粒在吊鐘上如皮膚上無清楚之斑點指能按而知之因其點硬而稜起顧此種斑點有數處爲凹者

治法多用行血氣藥並鐵綠水每二三小時服四十滴

四似痘

即輕痘

痘因兩事能輕而變其情形即前患此證並種牛痘如痘

因前時發過或種牛痘而減輕者其情形如下其發紅發熱雖有時重但不過一日或更少在下午時病者先覺不爽夜間不安息明日早起卽發紅其發熱卽退初發紅之處尋常在手肘與鼻旁其鼻旁上有一點卽指出其爲何病所發出之紅亦爲暫有難得密而有參差有數顆痘粒雖小而全中有凹處有幾顆痘粒不成水疱所有成水疱者將乾較久於尋常者且能透光發熱之各層數登時在身之各處能見之且皆不全發紅已現病人卽覺鬆適如證重而引出第二層發熱又當別論

以上言痘瘡分四類以下爲總說

根原 特有一毒物從患此病者之身散出或從其所穿

之衣服已用之器具發出痘瘡之毒物可種于身內或用其痂或用棉花少許醮其漿而塞於鼻內

決病 易愈者痘粒清楚病之行法均勻其種類輕病人強健孩童與少年時不易愈者密痘發熱有神昏之狀痘粒扁烏青色或有青蓮色之斑點紅色忽退面與四肢之腫亦退痘粒變凹之後大乏力全身呆白色人覺憂悶胸膈不適暈絕癰證暈睡昏狂脉至數加多呼吸極難發紅之前嘔吐過多至於發紅之後久不退溺與別種生津液帶血累及身內器具有病卽如腦髓喉嚨氣管肺或養生路生炎並此種器具內或在交節內發爛老年與嬰孩

病者以後如何在第十三日至第十七日可決之初層發熱時難於決斷第二層之發熱有時結於緊要機關之泄瀉

後病 膿瘡潰瘡熱癰頸核變爛皮膚脫皮膚生炎交節爛後變跛眼生炎後因明角罩不透光而瞎出聲處發腫而氣悶胸腹內之清汁皮生炎肺胞膜生炎後成膿水脹肺本體生炎吐血溺血內腎生炎而爛婦女多經孕者小產憂邪病後變發狂痘瘡痊時病者亦能被彼時通行之病所累卽如發熱神昏皮膚發紅醫院死肉證

成病之體 皮膚發紅罩睛皮口舌鼻吊鐘咽喉冒龜頭

皮陰戶皮上俱有假內皮之小塊或有放失小腔塊或內皮汁有露出之處或有成膿之點此種形狀不常通至氣管與全腸身內各器具生炎並變軟死後速爛

病勢忽然得之頭背腰極痛嘔吐並無別種發熱痘疹類有界限之病適在此時痘病甚多遇此傳染之毒此皆指出痘瘡爲病其依次第而發紅可確實定之發紅爲此病之特式發紅之前難決其爲何病一種表著之痘證易與還復發熱病相混已在還復發熱病節內論之一種輕痘證常與腸發熱病相混已在腸發熱病節內論之在第二層發熱時其汗多有酸氣其時全肉筋有痛此兩事相

併將與風濕發熱病相混卽如先有多酸氣之汗四十八
小時以後皮膚發紅後有肉筋條兩日之痛此爲與風溼
病相混之故痘發之前有一種多火紅色細點成幅布散
於身上與四肢之上分在臂與腿之交節變爲大紅色之
斑周圍多有清楚之斑點其餘皮膚暗紅色身上極熱此
爲與腸發熱病相混之故胸上有兩幅桃紅色之點腰痛
極重十二小時後痘將發出其紅色與斑點之紅色不相
關如其痘爲密者初發時幾與發熱神昏相混

哈來補注

痘瘡發紅斑之一層難與疔毒汗癰分辨然而鼻旁上唇
並手腕上之紅斑可定爲痘瘡

死者之數。此與病人之年紀病之輕重與病之已發或否有比例。又與種牛痘或否有相關。嬰孩老人難望能愈。病之危險及此同類之病皆與年紀有相關。醫士馬生云。因密痘而死者。不論其年紀。一百人中死者五十人。痘之稀密適中者。一百人中死者八人。稀痘。一百人中死者四人。

已種牛痘者再發痘瘡較前時已發痘者更能保其性命。每年死者之數多寡頗有參差。卽如一千八百四十年至五十四年。此十五年中在倫敦一兆人內死者之數最多。在一千八百四十四年死者八百九十人。在前一年最少。

死者二百二十五人。在一千八百五十三年。死者八十七人耳。此減少之故意者。國政治民之事。周詳也。

由氣傳染之理。或相遇傳染。或由空氣傳染。或染自生人。或染自死人。從水疱之汁。痘內之漿。乾痂。或從其物浸於痘質內。俱能染之。由氣傳染之相距。約三十尺至五十尺。或有餘。近時尚未查明。病者傳染他人。起於何時。止於何時。一人身內。有此病兩次者。甚少。一百人內。約有一人能發第二次。在胎時亦能患之。病伏之期。約十二日。少至十日。多至十六日。

治法。發紅發熱之前。治法俱同。無論其將來病之輕重。

用吐藥一服

見方二百

速用鹽類輕瀉藥隨之

見方二百三十九

如此

逐出其養生路內阻滯之物減熱氣之飲食此因有重生
炎之據如腦筋疲軟卽用行血氣物腦筋大激動可服鴉
片如有血積聚卽放血用行血氣物使其血行動而減輕
之在發紅發熱時如其發熱之據重卽置病人于涼處並
常用沖淡血之冷飲物卽如檸檬水烘饅頭水荷蘭水等
同時用鹽類輕瀉藥令其大便不難如皮膚大熱則以冷
水布揩之但用冷水布與海絨揩其手與臂更妙
痘瘡明顯所用治法開列於左

第一法如發熱重略減輕之第二法如乏力則補助之第