

福建

位 露 唱

十篇主治

虛寒久治

暫治

傷風 傷暑 傷食 傷濕

遠治

中風 膨脹 瘕症 食炭

近治

猝倒 心痛暴心 腹痛欲死
中惡 中痰 心疹

輕治

小柴胡湯

重治

大渴 大汗 大吐
大瀉 陰陽脫

瘟疫治

瘡瘍治

得治

失治

意治

神治

傷寒相舌治

一五論行

二論臟腑

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

六論氣色

七論脈訣

八論強弱

九論寒熱

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師見科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

岐天師又傳治回毒久不愈方

岐真人傳兒科秘方

長沙張真人傳治小兒感冒風寒方

兒科

驚

症

吐

瀉

生

下

音

食乳

肚

脹

出

出陰陳士

義烏

金以李祖

从治法

論虛寒从治

天師曰从治者日久歲長而治之也此乃虛寒之入不日可斷藥餌如參
芪苓朮之類日日煎飲始好否則卽昏眩怔忡是也方用人參一錢白朮
二錢黃芪二錢茯苓三錢甘草五分白芥子一錢神曲五分肉桂一分麥
冬二錢大五味三分蘇子五分水煎服心不寧加生棗仁一錢不寐加熟
朮仁一錢遠志一錢飽悶加白芍二錢口渴加當歸二錢熟地三錢夢遺
加芡實三錢山藥三錢飲食不聞加麥芽一錢山查三四粒有痰加半夏
五分咳嗽加桔梗一錢有浮游之火加元參二錢頭痛加蔓京子七分或
川芎有外感加柴胡一錢鼻塞加蘇葉一錢目痛加柴胡一錢心微痛加
梔子五分脇痛加芍藥一錢腹痛加肉桂三分此从治之法

張公曰妙極

暫治法

論傷風傷食傷暑傷濕

天師曰暫治者乃強壯之人素不服藥一朝得病用藥暫治之也如人外感傷寒用傷寒專門治之茲不再贅其餘傷風傷食傷暑傷濕俱可以暫治而愈傷風則用柴胡三錢荆芥一錢五分白芍三錢蒼朮五分茯苓一錢炒支子二錢只壳一錢丹皮一錢白芥子一錢水煎服此方發散之藥雖重然因其素不患病則勝理必宛故以重劑散之方中有健脾之藥正不必憂慮藥之大重也○如傷食作痛胸腹飽悶填脹欲嘔而不得方用白朮三錢只壳二錢山查三十粒麥芽三錢牛夕一錢甘草一錢砂仁三粒厚朴一錢水煎服此方純是攻藥而不至消氣妙用白朮爲君故不消氣而轉能消食然亦因其形壯體健而川之倘體弱久病之人不敢以此方投之○傷暑者乃暑氣因其勞而感之必非在高堂內寢之中而得之也方用香薷一錢青蒿五錢石羔一錢干葛一錢車前子一錢茯苓三錢

白朮一錢厚朴一錢陳皮一錢甘草一錢水煎服此方純是解暑之藥亦因其氣壯而用之氣虛人最忌○傷濕之症兩足浮腫手按之必如泥乃濕伎於脾也急用茯苓五錢萊菔三錢白朮三錢澤瀉三錢肉桂三分治之亦因其體壯氣盛而用之倘氣虛還須斟酌此皆暫治之法

遠治法

論中風膨脹痿症食炭

天師曰遠治者病得之年遠而徐以治之也如中風已經歲月膨脹已經年許痿症而臥床者三載如癰癩食炭數年是也此等之症臥床既久起之最難卒效然而治之得法亦可起之於具冬如中風手足不仁不能起立行步者俱得胃氣之健而手足不致反張便足蹙者皆可起之方可人參五兩白朮半觔以仁三兩肉桂三錢附子一錢茯苓一兩半下二兩南星三錢水二十碗煎四碗分作二次服早晨服二碗即臥上以綿被蓋之令極熱汗出如兩半其口呼大熱不可輕去其被一夜必將濕汗冷氣盡行外出三日可恭履矣後用八味地黃丸四料服完永不再發○膨脹經

消腫至
神湯
尚春健
時丹

年而不宛者必非膨水膨之症不能越於兩年未有皮毛不流水而宛者
今二三年不宛非水膨乃氣脹血膨食膨重膨也但得水便利而胃口開
者俱可治方用茯苓五兩人參一兩雷丸二錢甘草一兩萊服二錢白朮
五錢大黃一兩附子一錢水十碗煎湯二碗早服一碗必然腹內雷鳴少
頃必下惡物滿扁急拿出頃去再換桶卽以第二碗繼之又大瀉大下至
黃昏而止淡匕米飲湯飲之不再瀉然人弱極矣方用人參一錢茯苓五
錢以仁一兩山藥四錢陳皮五分白芥子一錢水煎服一劑卽愈忌食鹽
者一月狙則無生稅矣先須斷明然後用藥治之○痠症久不效者陽明
火燒溢腎水也然能不宛長存者何蓋腎水涸而肺金終得胃氣以生
之肺金有氣必下生腎水腎虛乾枯終有露氣夜澗腎經常有生机故存
而不宛也方用麥冬半斤熟地一觔元參七兩五味子一兩水二十碗煎
六碗早晨服三碗下午服二碗半夜服一碗一連二日必能坐起後改用
熟地八兩元參三兩麥冬四兩北五味三錢山茱萸四錢半夕一兩水十

碗煎三碗早晨一碗晚服一碗十日即能行步一日即平復如舊矣蓋大
滋其肺腎之水則陽明之火不消而自消矣。癰癩之症亦累歲經年而
未愈乃痰出於心竅之間而不能出喜食炭者蓋心火爲痰所迷不得發
洩炭乃火之餘與心火氣味相投病人食之竟甘如飴也方用人參一兩
南星三錢鬼箭三錢半夏二錢附子一錢肉桂一錢柴胡三錢白芍三錢
薑卜二錢丹砂末錢五先將煎藥煎湯飲之二碗服作二碗將丹砂一半
調入藥中與病人服之彼不肯服即以炭飴之服了與汝炭吃彼必欣然
服之素炭也不妨仍與之炭第二服亦如前法則彼不若前之欣然當介
人急灌之不聽不妨打之以動其怒氣怒則肝木火起以生心反能去痰
矣皆絕妙奇法世人未見未聞者吾救世心切不覺盡傳無隱此皆遠治
之法最宜熟記

張公曰中風之有胃氣則脾健可知但脾胃俱有根源何難用藥一天
師所用之藥又是健脾之品使脾一旺則氣益旺可知氣則濕目解留

方中又全是去濕之藥濕去則痰消又有消痰之品痰消則塞自失而又有補火之劑所以奏功也然非大劑煎飲則一杯土安能止汪洋之水而重築其堤炭哉○膨脹之病年久不宛原是可效所以用下藥以成功非土鬱之中固有水積若果水症早早宛矣安能三年之未宛也然而雖非水症而水必有壅阻之病方首仍用袪荅爲君以雷丸大黃爲佐不治水而仍治水所以奏功如神也○痰症人不宛雖是肺經之潤亦由腎經之有根也倘腎水無根總肺全有夜氣之生從何處生起吾見立稿而已矣惟其有根所以不宛故用大劑補腎之品因之而病愈亦因其有根再救而救之也 癰癩之病雖時嘗食物腸中有水穀之氣可以養生不宛亦其心之不宛也倘心早晚卽無病之人食穀亦不宛况有癰癩之症吾見其早亡不能待於今日惟其中心不宛不過胃痰一時癰癩其脾胃猶有生氣也故用人參以治心加附子菖卜肉桂溫中以祛邪加柴胡芎蔚平不加南星鬼前半夏逐痰蕩邪加丹砂定

健脾分
水湯

魂鎮魄自然邪氣少而正氣多也皆 天師未言而予發其奧如如
方則 天師至神至奇子不能贊一辭也

華君曰予無此之多各有小弁不必盡書正言昇處可也臟脹方不同
傳余之方乃用甘遂三錢巫午五錢水三碗煎半碗服之則瀉水一桶
瀉極用人參一錢茯苓三錢以仁一兩山藥五錢欠十一兩陳皮五分
白芥子一錢水煎服一劑即愈亦忌監一月○痲症方亦不同用元參
一兩熟地三兩麥冬四兩山茱萸一兩沙參三兩五味子五錢水煎服
十日即可起床予曾親試之神驗不知 天師何故不傳此方而更傳
新方也想天道之薄而人身亦殊用藥更重也○癰瘤余未傳方然別
有治癰之方亦奇妙方用柴胡五錢白芍二兩人參一兩半夏三錢白
芥子五錢南星三錢用牛胆製過者附子一錢茯苓三錢芩卜三錢水
十碗煎二碗先與一碗服之必倦怠急在灌一碗必睡熟有睡至一二
日者切不可驚醒如死人一般任其自醒也來病如失即索飲食說從

前之病不可即與飲食飢半日與之米粥湯內加人參五分陳皮五分白芥子五錢水煎與之彼必欣然自服匕後再睡亦聽其自醒則永不發亦奇妙決矣

天師曰此方未嘗不佳妙

近治法

論猝倒心痛暴亡腹痛欲死
中惡中痰心忪

天師曰近治者一時猝倒之病而近治之也如一時猝倒不省人事一時心痛暴亡一時腹痛手足青而欲死者是也此等之症如風雨驟至如駿馬奔馳不可一時止遏不可少緩須臾以治之也眼花猝倒并中於惡則中於痰然中惡中痰實可同治蓋正氣之虎而後可以中惡中氣之餒而後可以痰迷然則二症皆氣虛之故匕補其氣而中氣止氣自回或加以祛痰之品逐邪之藥無有不奏功頃刻者方用人參三錢白朮五錢附子一錢南星一錢陳皮一錢白微一錢水煎服下喉即愈此方妙在補氣之

白微救

藥多於逐痰祛邪中氣健於中邪氣消於水又何懼痰下不速化哉○心

消水散

救疹至聖丹

仙惡仙丹

正疹仙丹

痛暴也非寒則火治火之法止消二味用炒支子五錢白芍五錢煎湯服之下喉卽愈治寒之藥必須多加方用人參三錢白朮五錢肉桂一錢附子一錢甘草一錢白芍三錢熟地一兩山茱萸四錢良姜一錢水煎服二方各有深意前方因火盛而瀉以肝木也後方因大寒而補腎氣也多寡不同而奏功之神則一耳○腹痛之症一時疼極甚至手足皆青救若少遲必致立亡此腎經治中寒邪也溫當急溫命門之火而佐熱其心包之冷便痛立除而手足之痛亦解方用人參三錢白朮五錢熟地五錢附子一錢肉桂一錢吳茱萸五分乾姜五分水煎服卽愈此方之妙補火於真陰之內自然邪去而痛止不致土犯心而中犯肝也此近治之法當於平日留心不致臨症急遽誤人性命也

華君曰余亦有傳但不同耳中惡中痰方人參三錢茯苓五錢天南星三錢附子一錢虛人多加人參至一兩水煎服卽甦○心痛方始有火者神效杜仲三錢白芍三錢又于三錢甘草三錢水煎服一劑卽止痛

輕治法

論小柴胡湯

天師曰輕者病不重不必重治而用輕劑以治之也如人咳嗽頭疼眼目痛口舌生瘡皆是小症何必用重劑以補陽用厚朴以滋陰哉法當用輕清之品少少散之無不立效如小柴胡之方是也然而小柴胡湯世人不
知輕重之法予再酌定之可永爲式方用柴胡一錢黃芩一錢半夏一錢
陳皮五分甘草一錢此小柴胡湯予更加人參五分茯苓二錢更爲奇妙
蓋氣足則邪易出而汗易發世人見用人參便覺失色匪獨匠者不敢用
卽病者亦不敢服相沿而不可救藥者猶此皆是安得布告天下匠人詳
察其病溥而善用之也此輕治之法極宜究心

張公曰天師言小柴胡湯始外感者也予言治內傷者補中益氣湯
是也然補中益氣湯東垣立方之後世人亂用殊失重輕之法予再酌
定之可傳之千古不做柴胡一錢升麻四分黃芪三錢白朮三錢當歸
三錢陳皮八分甘草一錢人參一錢人氣虛者多加可至一兩看人之

弱強分多寡耳若有痰加半夏一錢有熱加黃芩一錢有寒加枳實一錢頭疼加蔓京子八分或川芎一錢兩脇痛加白芍三錢小腹痛亦加白芍三錢有食加麥芽二錢傷食加山楂二十粒胸中痛加只壳五分神曲五分如此加用自合病機無如人不肯用此方以治內傷也法最宜留心大約右手寸口脉與關脉大於左手之脉者急用此湯無不神效

小柴胡本梘半表半裏少陽經藥內用參苓以病在少陽恐斬逼裏聚之於所勝也故先扶胃氣使邪不入而已入者亦得正旺而自退耳

子未識

重治法

論大渴大汗大吐大瀉陰陽脫

天師曰重治者病出非常非輕但可以奏功或用之數兩或用之半觔一觔而後可以獲效如大渴大汗大吐大瀉陰陽脫之症從前俱已言談而方法亦盡余可不言然而尚未盡者大渴之症往匕用石膏有一晝夜而

用至勦許者蓋熱之極藥不得不用之重此時倘守定不可多與之言反必殺之矣第此等症乃萬人中一有之不可執之以治凡有胃火之人也張公曰大渴之症用石膏以平胃火無人不不知矣倘有未知其故者胃火沸勝奔越不啻如火之燎原必得傾盆之雨始能滂沛而息滅之原取其一時權宜之計故可以暫時用之多能取效必不可久用久用則敗亡

天師曰大汗之症必用參芪往七有用參勦許者然亦偶爾有之不可拘執以治凡有汗亡陽之症蓋陽藥不宜偏多而陰藥可以重用故耳

張公曰大汗勢必用補氣之藥仍恐陽旺而陰消服數劑補氣之後卽宜改用補陰之品況亡陽之後陰血正枯進以補水之藥正投其所好也陰定則陽生而陰陽無偏勝之弊矣

天師曰大吐之症明是虛寒亦有用參至數兩者然而吐不可一類同觀其勢不急不妨少用可以徐加倘寒未深而吐不甚亦以參數兩加之恐