

金匱心典卷下目錄

黃痺病證并治第十五

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

嘔吐噦下利病脉證治第十七

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蚘蟲病脉證治第十九

婦人妊娠病脉證治第二十

婦人產後病脉證治第二十一

婦人雜病脉證并治第二十二

金匱心典卷下

漢張仲景著

吳下尤怡在經集註

黃痺病證并治第十五

寸口脉浮而緩。浮則爲風。緩則爲痺。痺非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。

脉浮爲風。脉緩爲濕。云爲痺者。風與濕合而痺也。然非風痺疼痛之謂。故又曰痺非中風。所以然者。風得濕而變熱。濕應脾而內行。是以四肢不疼而苦煩。脾臟瘀熱而色黃。脾者四運之軸也。脾以其所瘀之熱。轉輸流布。而肢體面目盡黃矣。故曰瘀熱以行。

跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲
滿尺脉浮爲傷腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀卽
眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒
熱流膀胱身體盡黃名曰穀癰

跌陽脉數爲熱者其熱在胃故消穀脉緊爲寒者其
寒在脾故滿滿者必生濕胃熱而脾濕乃黃病之原
也尺脉浮爲傷腎者風傷腎也跌陽脉緊爲傷脾者
寒傷脾也腎得風而生熱脾得寒而生濕又黃病之
原也濕熱相合其氣必歸脾胃脾胃者倉廩之官也
穀入而助其熱則眩穀不消而氣以瘀則胃中苦濁

濁氣當出下竅若小便通則濁隨溺去今不通則濁雖下流而不外出於是陰受其濕陽受其熱轉相流被而身體盡黃矣曰穀痺者病雖始於風寒而實成於穀氣耳

額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞痺腹如水狀不治

得胃氣收矣

胃氣不和

胃氣不和

腎勞而熱黑色上出猶脾病而黃外見也額於部為庭靈樞云庭者顏也又云腎病者顴與顏黑微汗出者腎熱上行而氣通於心也手足心熱薄暮即發者病在裏在陰也膀胱急者腎熱所逼也小便自利病

不在痛也。此得之房勞過度熱。從腎出。故名曰女勞。癰若腹如水狀。則不特陰傷。陽亦傷矣。故曰不治。心中懊懣而熱。不能食。時欲吐。名曰酒癰。

懊懣鬱悶不甯之意。熱內畜則不能食。熱上衝則時欲吐。酒氣熏心而味歸脾胃也。此得之飲酒過多所致。故名酒癰。

陽明病。脉遲。食難用飽。飽則發煩。頭眩。小便必難。此欲作穀癰。雖下之。腹滿如故。所以然者。脉遲故也。

脉遲胃弱。則穀化不速。穀化不速。則穀氣鬱而生熱。而非胃有實熱。故雖下之。而腹滿不去。傷寒裏實脉

遲者尚未可攻。况非裏實者耶。

夫病酒黃痺。必小便不利。其候心中熱。足下熱。是其證也。酒黃痺者。或無熱。清言了了。腹滿欲吐。鼻燥。其脉浮者。先吐之。沉弦者。先下之。酒痺。心中熱。欲吐者。吐之愈。

酒之濕熱。積於中。而不下。出則爲酒痺。積於中。則心中熱。注於下。則足下熱也。酒黃痺者。心中必熱。或亦有不熱。清言了了者。則其熱不聚於心中。而或從下積爲腹滿。或從上衝爲欲吐。鼻燥也。腹滿者。可下之。欲吐者。可因其勢而越之。旣腹滿且欲吐。則可下。

金匱心典 卷下 三
亦可吐然必審其脉浮者則邪近上宜先吐脉沉弦者則邪近下宜先下也

酒痺下之久久爲黑痺目青面黑心中如噉蒜狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

酒痺雖有可下之例然必審其腹滿脉沉弦者而後下之不然濕熱乘虛陷入血中則變爲黑痺目青面黑皮膚不仁皆血變而瘀之徵也然雖曰黑痺而其原則仍是酒家故心中熱氣熏灼如噉蒜狀一如懊懣之無奈也且其脉當浮弱其色雖黑當微黃必不加女勞瘵之色純黑而脉必沉也

師曰病黃瘧發熱煩渴胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之

煩滿燥渴病發於熱而復以火劫之以熱遇熱相得不解則發黃瘧然非內兼濕邪則熱與熱相攻而反相散矣何瘧病之有哉故曰黃家所得從濕得之明其病之不獨因於熱也而治此病者必先審其在表在裏而施或汗或下之法若一身盡熱而腹熱尤甚則其熱爲在裏裏不可從表散故曰當下

脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃腹滿舌痿黃躁

不得睡屬黃家。

脉沉者熱難外泄小便不利者熱之出而之

水與熱相得適足以蒸鬱成黃而已脾之脉連

本散舌下腹滿舌痿脾不行矣脾不行者有濕躁

得睡者有熱熱濕相搏則黃痺之候也

黃痺之病當以十八日為期治之十日以上瘥反劇

難治

土無定位寄王於四季之末各十八日黃者土氣也

內傷於脾故即以土王之數為黃病之期蓋謂十八

日脾氣衰而虛者當復即實者亦當通也治之十日

以上差者邪淺而正勝之則易治。否則邪反勝正而增劇。所謂病勝藏者也。故難治。

瘧而渴者。其瘧難治。瘧而不渴者。其瘧可治。發於陰部。其人必嘔。陽部。其人振寒而發熱也。

瘧而渴則熱方熾而濕且日增。故難治。不渴則熱已減而濕亦自消。故可治。陰部者裏之。臟腑。關於氣。故嘔陽部者表之。軀殼。屬於形。故振寒而發熱。此陰陽內外淺深微甚之辨也。

瘧瘧之病。寒熱不食。食即頭眩。心胸不安。久久發黃。爲瘧瘧。茵陳蒿湯主之。

穀瘁爲陽明濕熱癍鬱之證。陽明旣鬱。榮衛之源。壅而不利。則作寒熱。健運之機。窒而不用。則爲不食。食入則適。以助濕熱。而增逆滿。爲頭眩。心胸不安而已。茵陳梔子大黃。苦寒通泄。使濕熱從小便出也。

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

大黃 二兩

右三味。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利尿。如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

黃家日晡所發熱。而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱急。少

腹滿身盡黃。額上黑。足下熱。因作黑瘰。其腹脹如水狀。大便必黑。時澹。此女勞之病。非水病也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。

黃家日晡所本當發熱。乃不發熱。而反惡寒者。此爲女勞腎熱所致。與酒痺穀痺不同。酒痺穀痺熱在胃。女勞瘰熱在腎。胃淺而腎深。熱深則外反惡寒也。膀胱急。額上黑。足下熱。大便黑。皆腎熱之徵。雖少腹滿脹。有如水狀。而實爲腎熱。而氣內畜。非脾濕而水不行也。惟是證兼腹滿。則陽氣併傷。而其治爲難耳。硝石礬石除熱。礬石除瘰。熱在骨髓。骨與腎合。用以清。

腎熱也。大麥粥和服。恐傷胃也。

硝石礬石散方

硝石 熬黃

礬石 燒等分

右二味為散。大麥粥汁和服。方寸七日。三服。病隨大便去。小便正黃。大便正黑。是其候也。

酒痺。心中懊懣。或熱痛。梔子大黃湯主之。

酒家熱積而成實。為心中懊懣。或心中熱痛。梔子淡豉。徹熱於上。枳實大黃。除實於中。亦上下分消之法也。

梔子大黃湯方

梔子十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

諸病黃家。但利其小便。假令脉浮。當以汗解之。宜桂枝加黃耆湯主之。

小便利。則濕熱除而黃自已。故利小便爲黃家通法。然脉浮則邪近在表。宜從汗解。亦脉浮者先吐之之意。但本無外風而欲出汗。則桂枝發散之中。必兼黃耆固衛。斯病去而表不傷。抑亦助正氣以逐邪氣也。

桂枝加黃耆湯方

見水氣

諸黃猪膏髮煎主之

此治黃瘡不濕而燥者之法。按傷寒類要云：男子、女人黃瘡，飲食不消，胃脹熱，生黃衣在胃中，有燥屎使然。豬膏煎服則愈。蓋濕熱經久，變為堅燥。譬如禽麪熱久，則濕去而乾也。本草：豬脂利血脈，解風熱。亂髮消癩，開關格，利水道。故曰：病從小便出。

豬膏髮煎方

豬膏 半觔

亂髮 如雞子
大三枚

右二味和膏中煎之，髮消藥成分，再服，病從小便出。千金云：太醫校尉史脫家婢黃病，服此，胃中燥糞下，便差，神驗。

黃痺病。茵陳五苓散主之。

此正治濕熱成痺者之法。茵陳散結熱。五苓利水去

濕也。

茵陳五苓散方

茵陳

十分

五苓散

五分

右二味和先食飲服方寸七日三服

黃痺腹滿小便不利而赤。自汗出。此為表和裏實。當下
之宜大黃硝石湯。

腹滿小便不利而赤為裏實。自汗出為表和。大黃硝
石亦下熱去實之法。視梔子大黃及茵陳蒿湯較猛。