

醫宗必讀

(下)

瀛經堂詳校醫宗必讀卷之五

雲間李中梓士材父著 門人黃寅錫清伯父參 姪孫李廷芳衡伯父訂

傷寒

黃帝曰熱病者皆傷寒之類也其死皆以六七日之間其愈者十日以內者回也

之氣感而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變為溫病至夏變為暑病岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也

之長統攝陽分故其脈連於風府故為諸陽主氣也風病腎脈穴太陽經脈覆于諸陽皆其所屬

之傷于寒也則為病熱熱雖甚不死越寒邪束于肌表則玄府閉陽氣不得散其兩感

于寒而病者必不免于死兩感者陰陽俱傷表裏同病也太陽與少陰同病則身熱譫語與腹滿不欲

食少陽與厥陰同病則耳聾與囊縮而厥三陰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊

強足太陽為三陽之表而脈連風府故傷寒者多從太陽始二日陽明受之陽明主

肉其脈挾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也胃不和則三日少陽受之少陽

主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾邪傳少陽者三陽已盡將入太陰故謂半

屬少陽口苦咽乾脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱蓋三陽經絡皆受其病而未入

于藏者故可汗而已

三陽為表屬府邪未入藏可汗而解四日太陰受之太陰脈布胃中絡於噎故腹

滿而噎乾

邪在三陽失于汗解則傳三陰自太陰始也仲景曰脈浮而五日少陰受

之少陰脈貫腎絡于肺繫舌本故口燥舌乾而渴

腎屬水而熱邪因之故燥渴仲景曰少陰為病脈微細但欲寐也

六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡于肝故煩滿而囊縮

至厥陰而六經傳徧邪熱甚于陰分故煩滿仲景曰

厥陰為病氣上撞心中痛飢不欲食食則吐衄下之利不止

按傷寒傳變先自三陽後入三陰此常序也東垣曰太陽經病若渴者自入於本也名曰傳本太陽傳

陽明者名巡經傳太陽傳少陽者名越經傳太陽傳少陰者名表裏傳太陽傳太陰

者名誤下傳太陽傳厥陰者名巡經得度傳節庵曰或自太陽始日傳一經六日

至厥陰而愈者或不罷再傳者或間經傳者或傳二三經而止者或始終則在一經

者或越經而傳者或初入太陽不發熱便入少陰而成陰證者或直中陰經者有二

經或三經齊病不傳者為合病有一經先病未盡又過一經之傳者為併病有太陽

陽明合病有太陽少陽合病有少陽陽明合病三陽合病若三陽與三陰合病即是

兩感三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死矣

傳經已徧邪當漸解若府府不解則深入于藏故五藏六府皆病邪盛于外則營衛不行氣竭于內則五藏

不通所謂其死皆以六七日者如此○劉草窗謂傷寒傳足不傳手其說蓋出此篇而誕妄實甚夫人之氣血通行週身豈邪遇手經而有不入者哉寒之傷人必先皮

毛皮毛者肺之合故外則寒慄鼻塞內則喘嗽短氣非傳肺乎古胎昏亂非傳心與

包絡乎洩瀉秘結非傳大腸乎癰閉非傳小腸乎痞滿上下不通非傳三焦乎且本

文云五藏六府皆病豈手經不在內乎然經言傳變不及手經者何也足之六經可

盡周身之脈絡而手經其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱

已在其內不必復言矣

少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噦十二日厥陰病衰囊從少腹微下大氣皆去病日已矣所謂

其愈皆十日以上者如此又有言傷寒以不服藥為中醫其說本於此不知經文為氣實者言也若正虛邪勝則死譬如八溺洪濤不為援手而聽其自瘦全活者幾希

矣帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已

其滿三日者可泄而已

而愈通者言各明經脈隨證施治也未滿三日其邪在表汗之而愈滿三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳正理

論云脈大浮數在表可汗脈實沉數在裏可下故曰數雖多有表證者必汗日數雖少有裏證者必下第當以表裏為辨不可以日數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷于寒固密者毋勞爾形毋搖爾神形神

並守偕行于閉蟄封藏之本者也一有不謹而犯寒威則殺厲之毒乘于肌體冬月

即發名正傷寒伏而不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂慮治之或差反掌

生殺自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶節庵曰得其要領易

於拾芥脈證與理而已求之多歧則支離繁碎如涉海問津矣脈證者表裏陰陽虛

實寒熱也理者知其常通其變也多歧者蔓衍之方書也余有感於斯言約六法以

盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散寒勝之時陰勝之藏

陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛溫一曰涼解矣熱熾或表裏粘涸陰氣不營亦不能汗宜用辛涼一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍緩但見痞實者攻之更緩或行血畜或逐水停輕重緩急隨證靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣為陽氣虛則寒故溫即是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳今人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可憾已如屢散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不退陰不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不全補正則邪自除溫中則寒自散此必見衰微之陰脈者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知釋其義夫正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈證

之陽者假實也脈之陰者真虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用藥至為穩當不論浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰然則沉小者人知為陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實而病者攻之即愈雖不服藥經盡即安何足慮也所可慮者惟挾虛耳奈何庸淺之輩不察虛實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇東垣丹溪節庵亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也謂傷寒無補法可乎夫實者不藥而愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者握傷寒之要矣何必求之多岐哉

傷寒十六證傷寒者寒傷營血脈浮而緊頭痛發熱無汗惡寒

傷風者風傷衛氣脈

浮而緩頭痛發熱有汗惡風

傷寒見風者既傷于寒復感風邪惡寒不躁其脈浮

緩

傷風見寒者既傷于風復感寒邪惡風煩躁其脈浮緊

以上四證皆冬月即病者溫病者冬

受寒邪來春乃發發熱頭疼不惡寒而渴脈浮數 溫瘧者冬受寒邪復感春寒

風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱自汗身重嘿嘿欲眠語言難出四肢不收尺

寸俱浮 溫疫者冬受寒邪復感春溫時行之氣 溫毒者冬受寒邪春令早熱復

感其邪以上五證皆冬傷于寒而病發于春皆有溫之名也熱病者冬傷于寒至夏乃發頭疼身熱惡寒其脈

洪盛 傷暑者暑熱為邪自汗煩渴身熱脈虛 傷溼者感受溼邪身重而痛自汗

身不甚熱兩脛逆冷四肢沉重胸腹滿悶 風溼者既受溼氣復感風邪肢體重痛

額汗脈浮 瘧者身熱足寒頭項強急面赤目赤口噤頭搖角弓反張若先受風邪

復感于寒無汗惡寒為剛瘧先受風邪復感於濕惡風有汗為柔瘧

類傷寒五證一曰痰中脘停痰憎寒發熱自汗胸滿但頭不痛項不强與傷寒異耳

一曰食積胃中停食發熱頭痛但身不痛氣口緊盛與傷寒異耳一曰虛煩氣血俱

虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳一曰脚氣足受寒溼頭痛

身熱肢節痛便閉嘔逆但脚痛或腫滿或細與傷寒異耳一曰內癰脈浮數當發

熱而惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也胸中痛而欬脈數咽乾不渴濁唾腥臭

肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮甲錯腹皮腫急滑脈而數腸癰也
胃脘痛手不可近胃脈細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而誤認傷寒禁其飲食死
表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胸脇痛耳聾寒熱嘔脈浮而
大或緊或緩有汗脈浮緩無力表虛也無汗脈浮緊表實也

裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞭滿大便不通腹痛腹鳴自利小便如常

譫語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿囊縮而厥唇青舌卷脈沉細或沉實

腹鳴自利不渴唇青舌卷無熱

惡寒下利清穀身痛脈沉微裏虛也腹中鞭大便閉譫語潮熱腹痛不惡寒反惡熱

裏實也表裏俱見屬半表半裏表裏俱無不可

汗下小柴胡湯隨證加減

陰證身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入二便不禁面如刀割

色青黑或喜向壁卧目閉不欲見人鼻氣自冷唇口不紅或白或青或紫手足冷指

甲青紫小便白或淡黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也 陰毒者腎

本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中絞痛眼睛痛身體倦

怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗恍惚身痛如被杖虛汗不止鄭聲嘔逆六

脈沉微或尺衰寸盛五日可治六七日不可治 陰證似陽者煩躁面赤身熱咽痛煩渴脈浮微手足冷大便洩小便清昏沉多眠又有身熱反欲得衣口不渴指甲黑此陰盛于內真陽失守也

陽證身動氣高而喘目睛不了了呼吸能往能來口鼻氣熱面赤唇紅口乾舌燥謔語能飲涼水身輕如常小便赤大便閉手足溫指甲紅 陽毒者熱邪深重失汗失下

或誤服熱藥熱毒散漫舌卷焦黑鼻中如烟煤咽喉痛甚身面錦斑狂言直走踰垣

上屋登高而歌棄衣而走脈洪大滑促五日可治六七日不可治 或昏瞶咬牙見鬼神吐膿血藥入即

吐 陽證似陰者手足冷大便閉小便赤煩悶昏迷不眠身寒却不欲衣口渴指甲紅

脈沉滑或四肢厥冷 陰厥脈沉弱指甲青而冷陽厥脈沉滑指甲紅而溫 此陽極于內真陰失守也

六經證治足太陽膀胱此經從頭頂貫腰脊故頭痛惡寒發熱脊強然風與寒常相

因寒則傷營惡寒頭痛脈浮緊而無汗用麻黃湯開發腠理以散寒得汗而愈風則

傷衛惡風頭痛脈浮緩而有汗用桂枝湯充塞腠理以散風止汗而愈若夫風寒兼

受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠密非辛溫不能發散故宜用也若

春溫夏熱之證皆用羌活沖和湯辛涼解之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯

升麻湯治之

此經有在經在府之別如目痛鼻乾微惡寒身熱脈浮洪病在經也潮熱自汗譫語發渴大便閉揭去衣被手揚足擲發斑發黃狂亂惡熱脈

沉數病在府也

傳至少陽則寒熱而嘔胸痛脇痛口苦耳聾此為半表半裏之經表證多者

小柴胡湯裏證急者大柴胡湯過此不已則傳陽明之府表證悉罷名為入裏惡熱

譫語口燥咽乾不大便脈沉實如痞滿燥實四證皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見

痞燥實三證邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳朴恐傷上焦之氣也但見痞實二證

邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂

喜忘畜血證也宜桃仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腸痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄

面如刀割引衣蹠臥脈見遲軟急宜溫之輕者理中湯重者四逆湯或初病起不發

熱便見寒證者名為直中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證即與汗之

一見裏證即與下之一見虛寒即與溫補但當以脈證為據不可以日數為拘也

可汗頭痛項強肢節腰背俱強身疼拘急惡寒發熱無汗脈浮數或浮緊皆可汗若

汗後不解仍發熱脈浮須再汗之

不可汗無表證者不可汗 脈沉不可汗 尺脈遲不可汗 脈微弱者雖惡寒不

可汗 咽中閉塞者不可汗 諸動氣者不可汗 淋家不可汗 亡血虛家不可

汗 厥者不可汗 汗家不可重汗 太陽與少陽并病頭項強痛或眩冒心下痞

不可汗 脈弦細頭痛而熱屬少陽不可汗 昔范雲患傷寒時武帝有九錫之命謂

氣不足恐二年後不復起耳雲曰朝聞道暮死可矣況二年乎遂以蒸法取汗而愈後二年果卒虛者其可輕汗哉

可吐病在膈上者可吐 汗下後虛煩懊懷者可吐

不可吐脈虛不可吐 厥逆不可吐膈上寒乾嘔宜溫不宜吐

可下汗後不解邪傳胃府可下 潮熱腹痛脈實可下 陽明多汗譫語有燥糞可

下 潮熱手足厥下汗出譫語者可下 吐後腹滿可下 凡臍腹硬或痛不可按

者可下 下後不解臍腹硬痛可再下 結胸脈不浮可下 少陰病下利清水其

色青者心下必痛口乾者可下 太陽證熱結膀胱小便不利小腹結急其人如狂

者血畜也可下 陽明證其人喜忘大便黑必有閉血可下 陽明無汗小便不利

心中懊懷必發黃可下

不可下表未解者不可下 腹脹可按而減者不可下 諸虛者不可下 陽微者

不可下 咽中閉塞者不可下 諸動氣者不可下 脈弱者不可下 脈浮大者

不可下 小便清白者不可下 陽明病面赤心下雖鞭滿不可下

用火法以火燒地布桃葉和葉亦可設席置病人于上即汗出或醋炒香附熱熨胸背即

汗或置火于牀下或艾炷

用水法傷寒惡飲水為欲愈若不與則不愈若恣飲則水停宜以新汲水少與之待

再思再與 熱甚者以青布浸新汲水中置病人胸前熱則易之甚者置病人于水

中或浸手足或漱口若表未解及陰證似陽者忌之

發熱翕翕而熱者表也羌活湯蒸蒸而熱者裏也輕者大柴胡湯重者承氣湯半表半裏者表裏

俱熱而輕于純在裏也胡柴湯至于三陰發熱則有腹痛肢冷脈沉下痢為異四逆湯潮

熱屬陽明一日一發日晡而作陽明內實也大便秘者承氣湯表未罷者小柴胡湯煩熱兼

渴者竹葉石膏湯心煩不眠酸棗仁湯煩而心悸小建中湯煩而悶者梔子散湯熱者白虎湯寒者附子湯

惡寒不見風亦惡寒身雖熱不欲去衣被發熱惡寒者陽也羌活湯無熱惡寒者陰也理中湯下證悉具

微惡寒者表未解也先解表而後攻裏下後不解發熱而渴惡寒白虎湯惡寒而嘔心

下痞者五苓散汗後惡寒虛也芍藥湯背惡寒表未解也葛根湯背惡寒而潮熱柴胡湯

口渴心煩背微惡寒白虎湯背惡寒潮熱腹滿小承氣湯少陰病口中和背惡寒附子湯

汗後不解反背惡寒者虛也芍藥甘草湯

惡風密室無風不惡太陽惡風無汗而喘麻黃湯有汗桂枝湯吐下後不解表裏俱熱時時惡風

燥渴而煩白虎湯汗多亡陽惡風者桂枝湯

自汗惡風寒者桂枝湯惡寒自汗表虛也小建中湯或黃耆建中湯自汗不惡風寒表證罷裏證實

也承氣湯汗多小便利必津液竭大便雖鞭不可攻宜密導用蜜於銅氣中微火煎稍凝攪之勿令焦皂角末少

許和之乘熱捻作棗子樣冷納入谷道中欲大便即去之自汗而渴小便難五苓散汗多不止曰亡陽桂枝湯外用白朮薑

本川芎白芷各一兩牡蠣粉各二兩細末紗囊周身撲之

盜汗在半表半裏膽有熱也小柴胡湯頭汗者熱不得越陽氣上騰謔語承氣湯心下滿頭

汗出水結胸也小半夏湯頭汗出齊頸而還發黃也茵陳五苓散頭汗出小便難者死手

足汗大便燥謔語大承氣湯寒不能食小便不利水穀不分手足汗者理中湯

頭痛

太陰少陰有身熱無頭痛厥陰有頭痛無身熱若身熱入頭痛屬陽經也

頭痛發熱無汗惡寒麻黃湯大便六七日不

通頭痛有熱小便清者不在裏仍在表

羌活湯

頭痛甚者必衄葛根湯少陽頭

痛

小柴胡湯頭痛寒熱寸脈大疾厥也

瓜蒂散

厥陰頭痛嘔而吐沫

吳茱萸湯

厥陰頭痛脈微遲

為欲愈如不愈

小建中湯

陽明頭痛不惡寒微惡熱不大便

調胃承氣湯

身痛太陽脈浮身痛無汗

麻黃湯

陽明下證已見但身痛者表未解也

麻黃湯

發熱有汗

身痛

桂枝湯

陽明脈浮身痛

葛根湯

汗後脈沉遲身痛血虛也

黃芩湯

陰毒嘔逆下利身

痛如被杖唇青面黑

甘草湯

一身盡痛發熱惡寒面寒

桂枝湯

一身盡痛發熱面黃二

便反利

甘草附子湯

一身盡痛發熱發黃頭汗出背強小便不利溼也

茵陳五苓散

一身盡痛

發熱面黃熱結瘀血也

抵當湯

筋惕肉瞤

汗多亡陽筋肉失養故惕惕瞤動

瞤動兼肢冷者

真武湯

輕者

茯苓桂枝甘草白朮湯

汗吐下後見此

者

先服防風白朮牡蠣湯次服小建中湯

胸膈滿胸滿多表證

葛根湯

喘而胸滿

麻黃杏仁石膏湯

脇下痞鞭

中和湯

胸膈俱滿或鞭

痛或嘔或不大便舌上白胎

俱小柴胡湯

邪在胸汗下之而煩熱

梔子豉湯

胸中痞鞭氣上冲

喉寒也散陽明少陽合病下利身熱脇痛大柴胡湯汗後頭痛心痞脇滿十棗湯

結胸病發于陽而反下之熱入裏作結胸脈浮者先以小柴胡解表然後下之按之則痛小結胸也

小陷胸湯不按亦痛大結胸也大結胸懷躁渴實熱結胸也三黃湯血結胸者小腹滿小

便不利抵當湯飲水不散水結胸也小半夏湯用陷胸等藥不效者枳實理中湯煩亂欲死宜

水漬法凝雪湯漬布薄胸中熱除為度

痞滿而不痛病名曰痞病發于陰而反下之因作痞也輕者通用枳桔胸滿脈濡半夏湯手足溫按之濡關上

浮者黃連湯乾嘔有水氣吐薑瀉下利腹鳴心湯胃寒效逆理中湯關脈沉緊大柴胡湯

大腹滿六七日不大便腹滿常痛者承氣湯腹滿時痛者桂枝芍藥湯腹滿吐食枳桔理中湯汗

後脹滿厚朴半夏湯甘腹滿漉漉有聲水與氣也半夏茯苓湯

小腹滿膈下滿也胸腹滿為邪氣小腹滿為有物小腹滿小便利畜血也輕者桃仁承氣湯小腹鞭滿小

便自利發狂者抵當湯腹滿手足厥冷真武不結胸小腹滿按之痛冷結也灸關元穴

腹痛陽邪痛者其痛不常陰寒痛者痛無休歇按而痛甚為實右關脈實腹痛便閉承氣湯下之早因而

腹痛小建陽脈瀉陰脈弦腹痛洩利建中湯或桂枝芍藥湯少陰厥逆或利而效四逆加五苓散

厥陰小腹痛當歸四逆湯

咽痛證也少陰不可汗不可下甘桔湯為陰陽通用之藥脈陰陽俱紫主無汗有汗曰亡陽屬少陰當

咽痛證也猪膚湯陽毒咽痛口瘡赤爛升麻六物湯或發浸黃連汁含非時暴寒附于少陰之經脈弱咽痛

必下利先用半夏桂枝湯次服四逆湯下利咽痛手足微冷無熱證者理中湯

脇痛往來寒熱脇痛胸痛小柴胡湯身涼表證罷乾嘔脇痛有水也十棗湯

呃逆仲景作欬逆即此證也切勿誤作咳脈微細呃逆胃寒也橘皮乾薑半夏湯脈洪大而呃心火上

奔肺不得納心甘草湯服藥無效用輟法疏黃乳香等分失下呃逆大便實者小承氣湯

嘔吐噦嘔者聲物俱出吐者無聲出物噦者有聲無物 太陽陽明合病當自利若

不利但嘔葛根加半夏湯少陽有嘔證小柴胡湯而渴者猪苓湯先渴後嘔水停心下赤茯苓湯先

嘔後渴此為欲解水飲瘧後餘熱在胃而嘔者竹葉加薑汁湯太陽少陽合病自利而嘔黃芩湯

半夏生薑湯寒厥嘔而不渴薑附湯嘔而發熱心下急微煩大柴胡湯胸中有熱胃中有邪陰陽

不交腹痛欲吐黃連湯三陽發熱而吐俱用小柴胡湯發熱六七日不解煩渴欲飲

水食即吐五苓散虛熱少氣氣逆欲吐理中湯不飲而吐理中湯去術加生薑汗下後胃虛冷吐乾薑

黃連黃芩人參湯少陰吐者真武去附子加生薑吐逆二便秘厥逆無脈大承氣湯心下有水氣乾嘔身熱

微喘或自利小青龙湯不發熱不惡寒肋痛乾嘔十棗湯自汗頭痛乾嘔桂枝湯乾嘔自利黃芩

半夏生薑湯裏寒外熱脈微欲絕乾嘔通脈四逆湯

咳嗽有聲無痰曰咳有痰有聲曰嗽太陽證罷表未解心下有水氣乾嘔發熱而咳小青龙湯太陽發熱

咳嗽上方同太陽發熱嘔噦而咳小柴胡湯少陽寒熱往來咳嗽胸脇滿或泄利小柴胡去參棗加五味子

乾薑少陰咳嗽真武湯少陰腹痛小便不利四肢沉重咳嗽者水氣也真武湯加五味子細辛乾薑

喘太陽無汗而喘太陽陽明合病胸滿而喘俱麻黃湯邪氣壅盛而喘雖汗而喘不已

宜再發之麻黃杏仁石膏湯誤下太陽利不止喘而有汗脈促葛根黃連黃芩湯太陽汗後飲多水

停而喘小青龙湯去麻黃加杏仁小腹痛滿加茯苓太陽下之微喘表未解也桂枝湯加厚朴杏仁水停心下腎氣乘

心為悸為喘五苓散陰喘脈伏而逆理中湯四逆湯喘而氣促腹滿大柴胡湯煩躁太陽中風脈浮

緊發熱惡寒身強無汗煩躁大青龙湯煩躁消渴辰砂五苓散下利咳嘔煩躁猪苓湯下利咽痛

胸滿而煩猪苓湯自汗煩躁小便多芍藥甘草湯少陰心煩不卧黃連雞子湯少陰吐利手足厥

冷煩躁欲死吳茱萸湯下後復發汗晝則煩躁夜則安靜不渴無熱乾薑附子湯六七日無