

類
言
登
治
裁
卷
三

類證治裁卷之三

丹陽林珮琴義桐甫著

男 醫 承 校

脾胃論治

脾胃皆屬土

脾為己土。胃為戊土。

而臟腑分焉

脾為臟。胃為腑。脾主通臟。陰而腑陽也。

經

言胃為水穀之海

飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸

於肺。通調水道。下輸膀胱。脾主為胃行其津液者也。故胃主納脾

主運。胃喜涼。脾喜燥。昔人每多混治。惟葉氏醫案謂脾宜升則健

胃宜降則和。太陰溼土。得陽始運。陽明陽土。得陰始安。以脾喜剛

燥。胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在

脾又言五臟以守為補六腑以通為補卓然有見岫雲華氏稱其

議論超出千古其敘葉案曰脾胃論莫詳於東垣其補中益氣調

益胃諸湯以勞倦內傷為主故用人參以補中白朮以溫燥升麻升下

陷之清陽陳皮理中宮之氣滯以太陰惡溼而病人胃陽衰者居

多用之得宜效如桴鼓若脾陽不虧胃有燥火則當用香巖養胃

陰之法凡病後熱傷肺胃津液以致虛痞不食舌絳噤乾煩渴不

寐便不通爽此九竅不和皆胃病豈可以升者治乎故先生必用

降胃之法所謂胃宜降則和者非辛開苦降亦非苦寒下奪以損

胃氣不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰則津液來復使之通降而

已此即宗內經六腑者傳化物而不藏以通為用之理也故治胃

陰虛不饑不納用清補如麥冬沙參玉竹杏仁白芍治胃陽虛食
穀不化用通補如人參益智陳皮厚樸烏藥茯苓治脾陰虛胸膈
便難用甘潤如甘草大麥仁白芍當歸杏仁紅棗白蜜治脾胃陽虛吞酸噎膈用香燥
如砂仁丁香炒朮神麴穀芽乾薑治脾胃陽虛運納俱少食已欲
瀉用升降法如補中益氣湯加茯苓治溼傷脾胃用平胃散或清
治中氣虛用補中益氣湯治饑傷痛而納食稍安病在當甘緩以
養脾營當歸建中湯治食傷傷食惡食當分消胃土用生益智草果廣
查肉神病後調理脾元或六君子湯其分治合治於病情尤為允
恆者矣

白朮炒用則守生用則和甘草炒用則補生用則瀉火右方分列

脾胃大抵脾臟以守為補胃腑以通為補脾宜升運胃宜通降也
其方治與飲食症參觀則備矣

附方

補中益氣湯 見一卷中風

調中益氣湯 即補中益氣湯去歸朮加木香蒼朮

升陽益胃湯 六君子加蒼朮 芍 羌 獨 防 柴 連

四君湯 參 苓 朮 草 加陳皮名異功散 加半夏名

益黃散 陳皮一兩 青皮 訶子肉 炙草各五錢 丁香

平胃散 見一卷溼

清暑益氣湯 見一卷暑

補中 調中 升陽 補脾 脾陽 利溼 祛暑

饑傷病後脾胃腎胃火脾滯和胃

當歸建中湯
芍
桂
飴
草
薑
棗
當歸

參苓白朮散
參
苓
朮
草
山藥
扁豆
蓮子
桔

蟠桃果
芡實
蓮子
核桃
熟地
棗肉
用猪腰子摻

安胃飲
黃芩
石斛
澤瀉
木通
陳皮
查肉
麥芽

半夏枳朮丸
半夏
枳
朮

石膏
生地
麥冬

養胃湯
人參
藿香
厚樸
蒼朮各一錢

茯苓錢二分
加烏梅二个

生薑三片水煎

炙草各六分

生薑 三十九

薑黃 三十九

半夏 三十九

安胃 三十九

翻蘇 三十九

慈木 三十九

青 三十九

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

脾胃

髮音退小兒垂髮

張

髻年寒熱肢冷。食少便瀉。尙作瘧治。遂神疲色慘。脉沈須防。

慢驚。急理脾陽。先用理中湯。少加附子。手足乃溫。專用異功散。

加蓮棗理脾。熱減瀉止。

於

脇痛吞酸已止。肝火悉平。但中脘氣窒。口燥不知饑。右脉欠。

和胃陰未復。用沙參麥冬花粉當歸白芍。栝蔞小麥蔗汁三服得平。

姜

左脉浮而鉤。右弦緩。脘中久痛。納食稍緩。乃饑傷脾絡所致。

經言脾欲緩。急食甘以緩之。勿用平肝。克伐生氣。潞參當歸。白芍。飴糖。紅棗。甘草。牡蠣粉。糯稻根鬚。降香末。數劑而安。

分利者通於世也

財利未始無也

分利者通於世也

財利未始無也

財利未始無也

財利未始無也

財利未始無也



飲食症論治

飲以養陽食以養陰飲食人所以衛生而脾胃實生之本也胃旺

則多食不滯過時不饑脾運則分輸五臟榮潤四肢若生冷戕胃

饑飽戕脾中氣先餒不宜專事消導宜補中益氣湯加茯苓砂仁夫中氣即脾

胃冲和之元氣也然胃氣以下行為順脾氣以健運為能胃強脾

弱則消穀而便溏脾強胃弱則知饑而納少故胃陽虛飽食輒噯

者宜溫通如橘紅厚樸益智枳殼半夏麴草蔻蘇子穀芽若守補則壅忌炙草焦白木炮薑脾陽虛

多食不化者宜香燥如砂仁丁香木香白朮半夏神麴薏苡橘白雞內金若膩補則滯忌地黃黃

等脾胃陰虛不饑不食口淡無味者宜清潤以養之如沙參扁豆

當歸白芍麻仁若消導則耗氣劫液忌枳檳查肉傷飲惡飲傷食

粳米大麥仁飲食

惡食嘔而腹滿為胃寒生痰和胃二陳煎食填太陰腹悶絞痛為木鬱

食厥急吐之用陰陽水燒鹽湯探吐痛定後服藿香散飲食留滯脘痞腹脹者為腑氣

不宜消導之大和飲冷吐利脾元受困者溫其寒理中湯或溫胃飲去黃者食

下氣逆噦呃噎膈者開其鬱神香散加橘皮竹茹半夏食後動怒脇滿而痛者

平肝氣柴胡枳殼香附青皮山梔子生白芍飲酒傷中發熱嘔瀉者利其溼葛花解

肝胃不和脉弦脘痺者泄木安土木瓜吳萸白芍金橘益智良薑紅棗小麥脾腎兩衰

虛寒滑脫者溫中補陽四維散加肉蔻但腎陽衰者二神丸凡嗜熱酒者脘

必瘀血宜鬱金木香丹參當歸降真香喜冷食者症多中寒宜八味理中丸胃虛則嘔悸

動風宜牡蠣白芍茯苓神人參棗仁炙草阿膠胃實則痞滿內熱枳實消痞丸脾虛則

食後反飽異功散去甘草加砂仁穀芽脾痺則口甜畏食佩蘭葉煎湯胃上逆則導

其濁滯

豆豉枳實竹茹栝蒌仁橘皮地栗粉厚樸甚則小承氣湯

脾下陷則升其清陽

舉元煎溼

傷脾胃

腹腫便難

宜兼升降

則運化宜通

半夏砂仁壳茯苓橘白厚樸枳實草蔻煨薑

若飲食不甘口苦不寐膽熱乘脾者宜導痰洩熱則土鬱舒

湯去熟地加丹皮

食已吐酸

肝逆犯胃者宜降火洩濁則木鬱達

山梔桑葉生棗仁

戊己丸加茯苓山梔

脇痞者黃連瀉心湯

其飲食減少有脾胃虛熱

安胃有中氣虛寒

養中

有中寒虛痞

治中有思慮傷脾

歸脾有脾溼水瀉

加味平胃

湯

有胃氣痛逆

調胃平不能食而瘦多脾虛

宜山藥茯苓白朮炙

內金砂仁陳皮蓮

子黃米屑調服

善食而瘦多胃火

瀉黃散或用太清飲一切食

滯成積

消食凡旦晝陽盛穀氣易消食可飽暮則陰盛穀氣難化

食宜少

夏暑秋涼晚餐尤宜簡泊則脾不困胃不滯矣

飲食

飲食

飲食

附方

補中益氣湯 見一卷中風

和胃二陳煎 夏陳苓草炮薑砂仁棗

大和中飲 查樸枳夏陳乾薑澤瀉木香

理中湯 見一卷中風

溫胃飲 白蔻人參澤瀉益智砂仁厚樸甘草

神香散 丁香蔻仁黃耆陳皮

葛花解酲湯 見一卷涇

四維散 人參四兩附子炮薑各二錢烏梅五分炙

二神湯 故紙肉蔻棗肉薑汁加吳萸五味石

補中消痰導溫中去寒開鬱酒傷補陽陽腎陽

溫中痞滿痞熱補脾導滯升陽膽熱吐酸脇痞虛熱

八味理中丸

理中加茯苓

麥芽

神麴

砂仁

枳實消痞丸

枳實 黃連各五錢

厚樸四錢

苓 木

木

生薑瀉心湯

生薑 連 參 草 夏 乾薑 生薑 大棗

異功散

見一卷中風

小承氣湯

見一卷溫

舉元煎

參 者各三錢 水煎

木

草各一錢

升麻五分

薑

溫膽湯

見一卷溫 味溫膽湯

加入參

遠志

棗仁

熟地

名十

戊己丸

黃連 吳萸 白芍

黃連瀉心湯

黃連酒炒水煎服

安胃飲

見本卷脾胃

養中煎
參 苓 薑 草 山藥 扁豆

治中湯
參 朮 薑 草 青 陳 半 加生薑

歸脾湯
見二卷勞瘵

平胃散
見一卷溼 加扁豆 木通 名加味平胃散

胃苓湯
見一卷中風

調胃平氣湯
見一卷中風

瀉黃散
見一卷火

太清飲
知母 石斛 木通各一錢半 石膏三錢 麥冬

消食丸
查肉 神麴 麥芽 蘿蔔子 青皮 陳皮 香

參朮膏
附各二兩 白朮 阿魏一兩

虛寒 虛 痞 思 傷 去 溼 瀉 胃 氣 胃 火 清 胃 食 積 補 元

嘔吐論治

嘔吐症胃氣失降使然也。而多由肝逆衝胃致之。靈樞謂足厥陰所生病者。胸滿嘔逆是也。夫胃司納食主乎通降。其上逆而嘔吐者。乃肝邪犯胃。或胃虛肝乘。故治嘔吐必泄肝。安胃用藥主苦降。辛通。佐以酸泄。其肝陽亢食入嘔吐者。用苦辛降逆。如黃連川楝子吳茱萸半夏厚樸或苦酸泄熱實左金丸戊己湯其胃陽衰風木乘克食入不變者。用溫胃平肝。如烏梅白芍木瓜枳實人參乾薑丁香半夏青皮白芍或吳茱萸湯其脾陽衰不能運化。腹脹痛嘔者。用辛溫行滯。益智厚樸神麴香砂六君湯其胃虛客氣上逆噯噯欲嘔者。用鹹以軟痞。重以鎮逆。旋覆代赭湯加二陳其中陽虛濁陰犯胃吐黑綠苦水者。用辛熱開濁。理中湯加川椒半夏附子茯苓之屬其肢冷脈微

時吐清水者用辛熱扶陽

附子理中湯真武湯

其肝火鬱熱吞酸吐酸者用

辛鹹苦降

左金丸或鹽炒吳茱萸湯去棗

其胸痞痰阻食已漾漾欲吐者用辛泄

生薑瀉心湯或二陳湯加蔻仁吳萸薑汁

其肝厥上逆腕痛嘔涎者用辛通佐以酸泄

如川椒乾薑桂枝烏梅白芍半夏

其因驚怒動肝致脇痛乾嘔而液虛者用辛通

補冬青皮白芍當歸

其支飲湯水下咽嘔吐者用辛泄小半夏湯

其肝陰胃津兩虛肝風擾胃嘔吐者用柔劑滋液熄風養胃

如參白

芍冬冬阿膠小麥冬夏茯苓粳米之屬

其肝風犯胃嘔吐眩暈者用苦酸以和陽

連白芍烏梅牡蠣之屬

其嘔傷胃津熱邪乘胃食入即吐者用辛涼化痰

湯加石斛山梔

其氣衝噎欬吐逆者肝火上凌過胃犯肺用清肅苦降

子杏仁枇杷葉前胡山梔枯藁仁降香末

其氣衝心痛饑不欲食吐虵者用苦辛酸以