

全生集

二

陶節菴傷寒全生集目錄卷二

辨傷寒發熱例第一

麻黃湯

芎蘇散

人參羌活散 即人參敗毒散

羌活沖和湯

正氣散

大青龍湯

羌活神木湯

辨傷寒惡寒例附背惡寒第二

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

黃芪建中湯

人參三白湯

辨傷寒汗後不徹例第三

調胃承氣湯

辨傷寒本熱例第四

五苓散

白虎湯

辨傷寒惡風例第五

參蘇飲

消風百解散

金沸草散

小青龍湯

葛根湯  
即葛根解肌湯

升麻葛根湯

葱白葛根湯

人參白虎湯  
夏季用此方

川芎石膏湯

辨傷寒潮熱例第六

大柴胡湯

調胃承氣湯

小柴胡湯

辨傷寒寒熱往來例第七

柴胡姜桂湯

辨傷寒煩熱例第八

黃連阿膠湯

小建中湯

補中益氣湯

辨傷寒煩躁例第九

當歸補血湯

乾姜附子湯

茯苓四逆湯

黃連解毒湯

竹葉石膏湯

辨傷寒頭痛例第十

辨傷寒目頭眩例第十一

辨傷寒項背強例第十二

辨傷寒頭搖例第十三

辨傷寒無汗例第十四

辨傷寒自汗例第十五

辨傷寒盜汗例第十六

當歸六黃湯

辰砂白芷散

辨傷寒頭汗例第十七

茵陳湯

太陽經藥

茵陳蒿湯

五苓散

辨傷寒手足腋下汗出例第十八

辨傷寒身體痛第十九

辨傷寒舌胎例第二十

辨傷寒動氣例第二十一

李根湯

橘皮湯

辨傷寒口渴例第二十二

辨傷寒口燥舌乾例第二十三

辨傷寒吐血例第二十四

辨傷寒衄血例第二十五

黃芩芍藥湯

三黃補血湯

犀角地黄湯

四生丸

辨傷寒蓄血例第二十六

桃仁承氣湯

抵當湯

辨傷寒嘔吐例第二十七

止嘔吐劫法

加減藿香正氣散

吳茱萸湯

卽吳茱萸  
生姜湯

理中湯

藿香安胃湯

黃連湯

茯苓半夏湯

橘皮竹茹湯

人參養胃湯

茱萸四逆湯

乾葛半夏生姜湯

大橘皮湯

辨傷寒乾嘔例第二十八

姜附湯

辨傷寒噦例噫氣例第二十九

小橘皮湯

旋覆代赭湯

加味竹茹湯

茅根乾葛湯

六君子湯

傷寒全生集卷二目錄終

陶節庵傷寒全生集卷二

長洲葉天士評本

曾孫鍾肇康

朱心傳

元孫潮青來

讀本

門人

顧景文  
張亮撰讀

小門人鍾南紀校讀

吳厚存

門下後學鍾孝存校讀

○傷寒發熱例第一

夫傷寒翕翕發熱者乃風寒客於皮膚邪氣怫鬱於外表熱而裏不熱也此太陽經表證頭疼項強腰背脊痛身體骨節疼或已發熱未發熱惡寒脉浮緊無汗冬月用麻黃湯三時用芎蘇散羌活冲和湯人參

大都勞力感寒

羌活散正氣散選用脉浮緩自汗冬月用桂枝湯三  
時用加減冲和湯神朮湯選用若脉浮發熱煩渴小  
便不利者此熱傳太陽膀胱本病也用五苓散利之  
若陽明經發熱目痛鼻乾不眠微惡寒微有頭額痛  
脉微洪宜葛根湯若表熱未罷邪熱傳裏裏既作熱  
則表裏俱熱口渴飲水脉洪數者宜白虎湯此但輕  
於純在表純在裏也若表証皆除而反見怕熱燥渴  
譫語大便實而脉沉數蒸蒸發熱者此爲裏熱  
邪陷入陰中裏熱甚而達於外也用調胃承氣湯下

之若少陽經耳聾脇痛寒熱嘔而口苦頭角痛脈弦  
數此熱在半表半裏用小柴胡湯和之三陰無表熱  
惟少陰有表熱之証但其脈沉足冷用麻黃附子細  
辛湯或下利厥冷裏寒外熱用人參四逆湯其陰陽  
俱虛熱而不止者汗後復發熱脈躁疾者下利大熱  
不止者皆死症又有三陽傳裏實熱症口必燥渴飲  
水不止揭去衣被揚手擲足胸腹滿痛班黃狂亂譫  
語大便不通脈必沉實有力甚則舌卷囊縮者難治  
但當三乙承氣湯攻裏下之方開別條與前表熱不

同也

麻黃湯 本方自有加減法備開

治冬時正傷寒。頭疼發熱惡寒。體痛腰背項強。拘急脉浮緊無汗。表証當發汗。以頭疼如斧劈。身熱如火熾用。

先發其汗後解其

麻黃上 桂枝上 杏仁中 甘草下 川芎中

防風中 羌活中 若渴加天花粉 惡心加

姜汁半夏。泄瀉加炒蒼朮升麻。元氣虛

加人參去杏仁。骨節煩痛倍加羌活防風

蒼朮有痰加半夏。胸脇滿痛加枳殼桔梗。  
惡寒身熱面赤身痒者不得小汗出故也。去  
杏仁加柴胡芍藥身熱作瀉者內虛故也。惡

寒身熱而喘者緣表邪未解也。若汗後復大

劉云邪未盡者再汗之則

熱脈躁亂者死。此脈不與汗相應也。汗後身

愈

涼脈靜者生。以火邪已去也。水姜葱白加豈

豉一撮煎之熱服取汗中病即止不得多服

復用厚被蓋覆其身及手足不可揭去待汗  
乾方可揭去節庵云傷寒汗下溫藥多服反

加別病極不宜煎查故服半鐘而留半鐘者  
正合曰少與二字之義此乃醫所不知之妙  
若病淺而服藥過者元府何能關鎖若未中  
病則大邪之氣未除故留再服可見其有妙  
用也如此

芎蘇散 本方自有加減法備開

治春夏秋感寒頭疼發熱惡寒脉浮緊無汗表  
証宜當發汗

川芎 中  
枳殼 中  
桔梗 下  
陳皮 中  
半夏 下

蘇葉

上

柴胡

上

乾葛

上

茯苓

上

甘草

下

加蒼

朮十一味

○滿悶

加香附

去甘草

茯苓

○若

天道

尙寒

而欲汗

者加麻

黃桂枝

去茯苓

柴

胡

○嘔吐

加姜汁

體痛

加羌活

瀉加蒼

白木

去枳殼

柴胡

○腹痛

加木香

○夏月

夾暑

加

香茹

水薑

葱白

煎之

熱服

取汗

人參羌活散

本方自有

加減法

卽人參

敗毒散

治四時

傷寒

頭疼

身熱

惡寒

體痛

不分

有汗

無

汗皆可

服之

凡時

氣溫

疫熱

病初

起頭

疼發

熱

惡寒亦皆治之及治咽喉腫痛發斑瘡疹脚氣  
寒熱並宜治之且此湯乃解利傷寒傷風太陽  
少陽陽明三陽經之藥也

人參中羌活中柴胡中獨活中前胡中

枳椇中桔梗中川芎中茯苓中甘草下加蘇

葉蒼朮十味去獨活茯苓○若天道尙寒加

麻黃渴加乾葛○若傷風鼻塞聲重加荆芥

防風○咽痛加連翹牛蒡子桔梗倍若減桔

梗加青皮名清風散治傷寒痰熱之藥也宜