

卷

十二

五

十五

婦人良方

婦人良方卷之十二

薛氏醫按

臨川陳自明編 吳郡薛已註

新都 閔道政校

妊娠疾病門

胎後已明須知妊娠疾病設以次之

妊娠諸病忌毒藥餘當對症依法治之

妊娠隨月服藥將息法第一

千金云妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御

腥辛是謂纔正是月足厥陰脉養不可鍼灸其經此經內屬於

肝肝主筋血一月之內血行否澁不爲力事寢必安靜毋令恐

畏況一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚卒重腰痛腹滿

胞急卒有所下當預安之宜服烏雄雞湯

烏雄雞湯方

烏雄雞如食法

吳茱萸兩茯苓

阿膠各二兩炒

生薑

甘草各一人參

芍藥

白朮各三兩

麥門冬五合

右以水一斗二升煮雞取汁六升下藥煮

取三升內酒三升并膠等取汁三升分三服

補胎湯 若會傷一月胎者當預服此藥

細辛二兩

防風二兩

烏梅一升

吳茱萸

生地黃

白朮各一兩

大麥五合

生薑四兩

右以水七升煮取汁二升半分三服寒多倍細辛茱萸熱多

去細辛茱萸加括蕒根二兩有所思去大麥加栝子仁三合

一方有八參一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物

妊娠二月足小陽脉養不可鍼灸其經此經內屬於膽膽主精

是時兒精成於胞裡當謹護勿驚動況二月始陰陽踞經有寒

不成有熱即卒中風寒有所動搖心滿下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

艾葉湯方

丹參 三兩 當歸

人參

麻黃 六兩 艾葉

阿膠 炙各二兩

甘草 一兩

大棗 十二枚 生薑 六兩

右以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎收三升分三

服忌海藻菜

黃連湯 若傷二月胎者當預服此藥

黃連

人參 各一兩 吳茱萸 五兩 生地黃 五兩 生薑 三兩

右以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日作一劑

若覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水忌豬肉冷

永蕪黃一方加當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操
弓矢欲生女者弄珠璣欲子美數視璧王欲子賢良端正清虛
是謂外象而內感者也是月手心主脉養不可鍼灸其經此經
內屬於心男其哀思慮驚動蓋三月為定形有寒則大便清有
熱則小便澀不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹
滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下宜服雄雞湯

雄雞湯方

雄雞

一隻治如食法

甘草

炙

人參

阿膠

名二兩炒

黃芩

白朮

各一兩

芍藥

四兩

麥門冬

五合去心

大棗

十二枚

生薑

一兩切

右以水一斗五升煮雞減半內藥

煮取一斗八

清酒三升并膠再煎取三升分三服日飲盡忌

海藻松菜

物桃李雀肉等一方有當歸川芎二兩無薑

扶神湯 若曾傷三月胎者宜預服此藥

扶神

丹參

龍骨略一

阿膠炒

當歸

甘草炙

人參略二

赤小豆

大棗十二枚

擘

右酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑腰痛加桑寄生二兩深師方有薤白二兩麻子一升忌同前

妊娠四月以受水精始成血脈其食稻粳其羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡是月于少陽脉養不可針灸其經此經內輸三焦其時兒六腑順成端靜形體和心志節飲食蓋四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胎滿不食小便如淋臍下苦急卒中風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腹背腹痛或時胎上胸煩不安卒有所下宜服菊花湯王之

菊花湯方

菊花如雞子大一枚

麥門冬去心一升

麻黃去節

阿膠多各三兩生薑五兩

甘草炙當歸

半夏洗各二兩

人參五錢二兩大棗十二枚

右以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉撲之獲風寒四五日忌食如前

調中湯

芍藥四兩甘草炙芎藭續斷各一兩柴胡

白朮各三兩烏梅一升李根白皮三兩

當歸二兩五錢

生薑四兩厚朴炙枳實各三兩

右以水一斗煮取二升分四服日三夜一八日再服一劑一

方有半夏二兩忌海藻菰菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其衣

衾朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和菜黃調以五味
是謂養氣以定五臟是月足太陰脉養不可鍼灸其經此經內
輸於脾其時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無白炙熱無
大勞倦蓋五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒則腹滿
痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛頓欲仆
卒有所下宜服阿膠湯又名旋覆花湯主之

阿膠湯方

阿膠

四兩炙

人參

一兩

麥門冬

去心一升

生薑

六兩

吳茱萸

各三升

旋覆花

當歸

芍藥

甘草

炙

黃芩

各三兩

右以水九升煮取

半內清酒三升并阿膠微火煎取三升

半分四服日三夜一

先食後服便愈不差更服忌

游梨菰蕒

安中湯 若曾傷五月胎者當預服此丸

甘草

炙

芍藥

各二兩

當歸

人參

生地黃

芎藭

各二兩

五味子

生薑

六兩

麥門冬去心一升

大麻仁

大棗

各五枚

黃芩一兩

右以水七升清酒五升

煮取三升半分四份日二夜一七日

再服一劑忌如前

安胎當歸湯

若妊娠

月舉動愕胎不安小腹痛引腰脇小

便下血

當歸

阿膠

炒

芎藭

人參

各二兩

艾

一把

右以酒水

各三升煮至三升去滓內膠令烊分

三服一方有甘草無艾

棗

妊娠六月始受金精以成

筋身欲微勞無得靜處出遊於野數

觀走犬走馬食忌鷺鳥猛獸之肉是謂變腠理細筋以養其力以堅背脊是月足陽明脉養不可針灸其經此經內屬於胃主其口目蓋六月之時兒口目皆脫調五味食甘美母大飽六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬

去心一升

甘草

炙

人參

各一兩

生地黃

三兩二

黃芩

三兩

阿膠

炒四兩

生薑

六兩

大棗

十五枚擘

以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升三服加入行

三四里進糜粥忌海藻菰菜蕪荑

柴胡湯

若曾傷六月胎者當預服之

柴胡

四兩

芍藥

一方作紫葳

白朮

甘草

炙各二兩

麥門冬三兩 去心

茯苓一兩 芎藭二兩 生地黄五兩

生薑六兩 大棗三十枚 擘

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一仍進糜粥七日更

服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩

旋覆花湯亦名 阻病 集驗療妊娠六七月胎不安常處

旋覆花一兩 厚朴 製 白朮 枳殼 黃芩炒

茯苓各三兩 方無 芍藥 生薑各二兩

右以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜二忌羊肉錫

醋桃李雀肉等干金同

妊娠七月始受水精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以

運血氣自此後居處必節飲食避寒暑食粳稻以密腠理是謂

養骨而堅齒是月手太陰脉養不可針灸其經此經內屬於肺

主皮毛是時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲若忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥陰脉若傷寒煩熱腹滿短氣常若頸項腰背強宜服葱白湯

葱白湯方

葱白

十五枚

半夏

細切

麥門

冬

去心

人參

一兩五錢

生薑

八兩

甘草

炙

當歸

黃芪

炒各三兩

阿膠

炒四兩

黃芩

一兩

旋覆花

一把

右以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取四升溫服一升

日三夜一溫卧當汗出無汗加麻黃二兩秋後勿強汗忌羊

肉餒海藻菰菜等

杏仁湯

若曾傷七月胎者當預服

杏仁

去雙仁皮尖碎

甘草

炙

鐘乳

研

麥門冬

去心

吳茱萸

各一升

五味子

粳米

各五合

紫苑

一兩

右以水八升煮取三升半分四服日三夜一七日服一劑忌

海藻菰菜

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂周密
腠理光澤顏色是月手陽明脉養不可鍼灸其經此經內屬於
大腸大腸主九竅是時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍
大氣若中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安苦頭
眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或寒慄腰背苦
冷痛而目視茫茫宜服芍藥湯

芍藥湯方

芍藥

四兩

人參

當歸

甘草

炙各兩

白朮

一兩

厚朴

二兩

薤白

切一升

生薑

切四兩

右以水五升酒四升煮取二升分四服日三夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等類

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服

甘草 炙 柴胡 白朮 各二兩 厚朴 薑製炒 芍藥

葵子 二升 生薑 六兩 大棗 二十枚

右以水九升煮取三升分四服日三夜一服一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等類

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力是月足少陰脉所養不可針灸其經此經內屬於腎腎主續縷皆成無處溫冷無著灸衣若卒下痢腹滿懸急上衝腰背痛不可轉側短氣宜服半夏湯

半夏湯方

半夏泡炒五合 麥門冬去心五合

乾薑炮一兩 當歸

吳茱萸 阿膠炙各三兩 大棗十二枚擘

右以水九升煮取三升去粗 內白蜜八合微火溫分四服痢

即止忌生血物餒

猪腎湯 若曾傷九月胎者當預服

猪腎一具 茯苓 桑寄生 乾薑炮

生地黄

芎藭各三兩 白朮四兩 麥門冬去心一升

附子大者一枚炮

右以水一斗煮猪腎熟去之 內諸藥煎三升半分四服日三

夜一十日更一劑忌猪肉蕪 萸桃李雀肉酢物

妊娠十月五臟俱備六腑通納 天地氣於丹田故使關節人事

皆備但俟時而生

愚按妊娠所禁之法皆傳自上古當永為遵守其方藥用須

斟酌

芎藭補中湯

治懷孕血氣不能榮養以致半產子嘗治一妊

娠不足月而損墜服此藥遂安

乾薑

煨

阿膠

炒

芎藭

五味子

各五分

黃芪

炒

當歸

白朮

炒

杜仲

炒

白芍藥

各一錢

木香

人參

甘草

炙各五分

右水煎服

○妊娠惡阻方論第二

妊娠惡阻病產寶謂之子病巢

氏病源謂之惡阻由胃氣怯弱

中脘停痰脉息和順但肢體沉

重頭眩擇食惟嗜酸鹹甚者寒

熱嘔吐胸膈煩滿半夏茯苓丸

主之

愚按前症若中脘停痰用二陳湯加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣惱加枳殼胸脇痞悶再加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾氣化痰滯之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃子常用驗矣

附治驗

○一妊娠嘔吐惡食體倦嗜臥此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯二劑漸愈又用六君子加紫蘇二劑而安

○一妊娠吞酸惡心時欲作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六