



2016

执业药师资格考试

押题秘笈

药学综合知识与技能

阿虎医考命题研究中心 组编



「2016 新大纲」

六套卷子，题题解析

含三次App全国摸底考试

发现书口一个答案错误奖励100元

联考考试，万人同测，
琅琊榜上你排第几，
药考



上海科学技术出版社
Shanghai Scientific & Technical Publishers

全国百佳图书出版单位
Top 100 Publishing Houses in China



阿虎医考
AHUyikao.com

2016

执业药师资格考试 押题秘笈

药学综合知识与技能 模 拟 试 卷 一

阿虎医考命题研究中心 组编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

执业药师资格考试押题秘笈. 药学综合知识与技能/阿虎医考
命题研究中心组编. —上海:上海科学技术出版社,2016.4

ISBN 978-7-5478-3008-6

I. ①执… II. ①阿… III. ①药理学—药剂师—资格
考试—习题集 IV. ①R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 039793 号

授权码粘贴处

执业药师资格考试押题秘笈·药学综合知识与技能
阿虎医考命题研究中心 组编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6.5

字数: 100 千

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-3008-6/R·1091

定价: 38.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

2016 执业药师资格考试

药学综合知识与技能

姓 名：_____

准考证号：_____

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列不属于药学服务特殊人群的是
 - A. 用药周期长的慢性病患者
 - B. 特殊体质者
 - C. 肝肾功能不全者
 - D. 过敏体质者
 - E. 小儿
2. 第一类精神药品和毒性药品处方应包括的内容为
 - A. 医师身份证明编号
 - B. 药品生产批号
 - C. 药品生产厂商
 - D. 印鉴卡号
 - E. 患者身份证明编号
3. 急诊处方的药品用量不应超过的上限为
 - A. 1 天用量
 - B. 2 天用量
 - C. 3 天用量
 - D. 5 天用量
 - E. 7 天用量
4. 标明在冷处贮存的药品存放环境要求为
 - A. 0℃以下
 - B. 0~8℃
 - C. 0~10℃
 - D. 2~8℃
 - E. 2~10℃
5. 氧化是药物变质最常见的反应,药物的氧化作用与化学结构有关,下列药物较易氧化的是
 - A. 吗啡
 - B. 青霉素
 - C. 头孢菌素
 - D. 阿托品
 - E. 硫酸镁
6. 以特定的盐 1 μg 作为 1 IU 的抗生素是
 - A. 青霉素 G
 - B. 四环素
 - C. 链霉素
 - D. 土霉素
 - E. 红霉素
7. 下列不属于二级信息源特点的是
 - A. 可以很方便地对想要的一级文献的信息、数据和文章进行筛选
 - B. 要想获得更全面的信息只使用一个检索工具是不够的
 - C. 从文章的发表到建立引文索引需要时间,因此会影响最新信息的检索服务
 - D. 信息不够全面甚至存在错误,需要药师查阅和评价原文

14. 嗜碱性粒细胞增多见于
- A. 伤寒
B. 寄生虫病
C. 传染性肝炎
D. 结核病
E. 恶性肿瘤
15. 白蛋白和球蛋白的比值正常范围为
- A. (1.5~2.5) : 1
B. (1.0~2.5) : 1
C. (1.0~2.0) : 1
D. (1.5~3.5) : 1
E. (1.5~3.0) : 1
16. 尤其适宜老年人和儿童服用,可作为退热药首选的是
- A. 阿司匹林
B. 布洛芬
C. 对乙酰氨基酚
D. 贝诺酯
E. 阿苯片
17. 部分患者服用抗蠕虫药后可发生口吐蛔虫,此时应加用的药物是
- A. 噻嘧啶
B. 哌嗪
C. 伊维菌素
D. 三苯双脒
E. 甲硝唑
18. 治疗阴道炎期间,阴道连续用药不宜超过的天数为
- A. 3 天
B. 5 天
C. 7 天
D. 10 天
E. 14 天
19. 肺结核患者服用异烟肼后可发生周围神经病,为防止和减轻周围神经病,可同服的药物是
- A. 维生素 B₁
B. 维生素 B₂
C. 维生素 B₆
D. 维生素 B₁₂
E. 维生素 C
20. 下列不属于降压药物应用基本原则的是
- A. 小剂量
B. 优先选择长效制剂
C. 联合用药
D. 早期用药
E. 个体化
21. 冠心病患者急性发作时,应立即嚼服的药品是
- A. 硝苯地平
B. 阿司匹林

- C. 硝酸甘油
D. 双嘧达莫
E. 氯吡格雷
22. 某冠心病患者需要进行调脂治疗,但在临床检查中发现该患者同时患有消化性溃疡,则应慎用的调脂药是
A. 阿托伐他汀
B. 非诺贝特
C. 考来烯胺
D. 依折麦布
E. 烟酸
23. 急性缺血性卒中溶栓治疗的时间窗为
A. 0.5 小时
B. 1 小时
C. 2 小时
D. 3 小时
E. 5 小时
24. 癫痫持续状态患者入院后,应采用的给药途径为
A. 口服
B. 舌下给药
C. 经皮给药
D. 肌肉注射
E. 静脉给药
25. 某抑郁症患者来到医院就诊后,表示自己非常在意自己的形象,希望所用药物不要影响自己的身材,则应首先排除的抗抑郁药为
A. 氟西汀
B. 阿米替林
C. 米氮平
D. 吗氯贝胺
E. 曲唑酮
26. 可引起男性乳房女性化的药品是
A. 奥美拉唑
B. 法莫替丁
C. 枸橼酸铋钾
D. 莫沙必利
E. 多潘立酮
27. 服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者,长期服用埃索美拉唑,需注意补充的维生素是
A. 维生素 B₁
B. 维生素 B₂
C. 维生素 B₆
D. 维生素 B₁₂
E. 维生素 E
28. 某甲亢患者,治疗期间发现处于妊娠期,去医院咨询后被告知可继续服用原来的药物,则该药物最可能是

- A. 丙硫氧嘧啶
C. 碘化钾
E. 左甲状腺素钠片
- B. 甲巯咪唑
D. 碳酸锂
29. 下列属于超长效胰岛素制剂的是
- A. 门冬胰岛素
C. 精蛋白锌胰岛素
E. 赖脯胰岛素
- B. 低精蛋白锌胰岛素
D. 地特胰岛素
30. 抗癫痫药所致的骨质疏松,推荐应用的药物是
- A. 钙剂
C. 双膦酸盐
E. 降钙素
- B. 维生素 D
D. 特立帕肽
31. 痛风急性发作的首选药物是
- A. 秋水仙碱
C. 长春碱
E. 高三尖杉酯碱
- B. 紫杉醇
D. 羟基喜树碱
32. 压力性尿失禁的中重度患者,药物治疗应选择的药物是
- A. 米多君
C. 索利那新
E. 酚苳明
- B. 奥昔布宁
D. 非那雄胺
33. 某缺铁性贫血患者,服用铁剂治疗时,可同时服用的药物是
- A. 奥美拉唑
C. 维生素 C
E. 消胆胺
- B. 西咪替丁
D. 四环素
34. 应用甲氨蝶呤治疗的患者,宜同时补充的药物为
- A. 叶酸
C. 维生素 B₁₂
E. 叶酸+维生素 B₁₂
- B. 铁剂
D. 烟酸+维生素 B₁₂
35. 下列不属于恶性肿瘤药物治疗方案遵循原则的是
- A. 选择肿瘤敏感药物
B. 小剂量

- C. 选用毒副作用不同的药物
D. 联合应用时相特异性和非特异性药物
E. 考虑到患者的个体差异
36. 应用速释吗啡处理突破性疼痛时,剂量应为
A. 硫酸吗啡的 $1/5 \sim 1/4$ B. 硫酸吗啡的 $1/4 \sim 1/3$
C. 硫酸吗啡的 $1/3 \sim 1/2$ D. 硫酸吗啡的 $1/2 \sim 2/3$
E. 硫酸吗啡的 $1/2 \sim 3/4$
37. 某类风湿关节炎患者,服用氯喹治疗 2 个月后未见明显效果,欲停止服用。此时药师为了确定氯喹对该患者是否真的无效,应告知该患者需再坚持服用的时间至少为
A. 1 个月 B. 2 个月
C. 3 个月 D. 4 个月
E. 5 个月
38. 下列属于选择性 COX-2 抑制剂的是
A. 布洛芬 B. 萘普生
C. 萘丁美酮 D. 吲哚美辛
E. 尼美舒利
39. 对于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的围绝经期综合征妇女,宜采用的治疗方案为
A. 单纯孕激素补充治疗
B. 单纯雌激素补充治疗
C. 雌孕激素周期序贯用药
D. 雌孕激素连续序贯用药
E. 雌孕激素连续联合用药
40. 对于中毒药物不明的急性中毒,宜选用的洗胃液为
A. $1:10\,000 \sim 1:5\,000$ 高锰酸钾溶液
B. 活性炭混悬液
C. 鸡蛋白
D. 淀粉溶液
E. 生理盐水

二、配伍选择题（共 50 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备A 用项可重复选用，也可不选用。每题只 1 个备选项最符合题意）

[41-44]

- | | |
|--------|--------|
| A. 白色 | B. 淡黄色 |
| C. 淡绿色 | D. 淡红色 |
| E. 淡蓝色 | |

41. 急诊处方的印刷用纸颜色为
42. 儿科处方的印刷用纸颜色为
43. 第二类精神药品处方的印刷用纸颜色为
44. 麻醉药品处方的印刷用纸颜色为

[45-48]

- | | |
|----------|--------|
| A. i. h. | B. hs. |
| C. ss. | D. St. |
| E. qs. | |

45. 处方中，“适量”的外文缩写是
46. 处方中，“临睡时”的外文缩写是
47. 处方中，“一半”的外文缩写是
48. 处方中，“立即”的外文缩写是

[49-50]

- | | |
|-----------|---------|
| A. 普萘洛尔 | B. 阿替洛尔 |
| C. 硝酸异山梨酯 | D. 硝苯地平 |
| E. 复方氨基比林 | |

49. 别名为“消心痛”的是
50. 别名为“心痛定”的是

[51-54]

- | | |
|---------|---------|
| A. 阿昔洛韦 | B. 利巴韦林 |
| C. 人促红素 | D. 肝素 |

E. 培高利特

- 51. 可致急性肾衰竭、肾功能异常及肾小管损害的药品是
- 52. 可致畸、胎儿异常、肿瘤和溶血性贫血的药品是
- 53. 可引起纯红细胞再生障碍性贫血的药品是
- 54. 可诱发血小板减少症(HIT),并由 HIT 而出现血栓并发症的药品是

[55-58]

- | | |
|-------|-------|
| A. 睡前 | B. 餐后 |
| C. 餐中 | D. 餐前 |
| E. 清晨 | |

- 55. 帕罗西汀的适宜服用时间为
- 56. 格列本脲的适宜服用时间为
- 57. 二甲双胍的适宜服用时间为
- 58. 沙丁胺醇的适宜服用时间为

[59-62]

- | | |
|---------|-----------------------|
| A. 硝酸甘油 | B. 维生素 B ₁ |
| C. 利托那韦 | D. 加压素 |
| E. 茶碱 | |

- 59. 为避免结石的发生,宜增加每天进水量,一天需饮水在 2 000 ml 以上的药品是
- 60. 应舌下含服,不可咽下,不需用水送服的药品是
- 61. 应限制饮水,否则可能会引起水潴留或低钠血症及其并发症的药品是
- 62. 不宜用热水送服的药品是

[63-65]

- | | |
|---------|--------|
| A. 很可能 | B. 可能 |
| C. 可能无关 | D. 待评价 |
| E. 无法评价 | |

- 63. 用药与不良反应发生时间关系密切,同时有文献佐证,但引发 ADR 的药品不止一种,或原患疾病病情进展因素不能除外。则药品不良反应因果关系评价为

64. ADR 与用药时间相关性不密切,反应表现与已知该药 ADR 不相吻合,原患疾病发展同样可能有类似的临床表现。则药品不良反应因果关系评价为
65. 报表缺项太多,因果关系难以定论,资料又无法补充。则药品不良反应因果关系评价为

[66-68]

- A. 利巴韦林
B. 卡马西平
C. 青霉素
D. 阿昔洛韦
E. 正常剂量的氯化钾

66. 药物妊娠毒性分为 5 个级别,属于 A 级的药品是
67. 药物妊娠毒性分为 5 个级别,属于 D 级的药品是
68. 药物妊娠毒性分为 5 个级别,属于 X 级的药品是

[69-70]

- A. 常见病不少于 2 000 例
B. 多发病不少于 1 000 例, 其中主要病种不少于 300 例
C. 多发病不少于 300 例, 其中主要病种不少于 100 例
D. 20~30 例
E. 100~300 例
69. I 期临床试验的样本数一般为
70. II 期临床试验的样本数一般为

[71-72]

- A. 乙型肝炎病毒表面抗体、e 抗原、核心抗体同为阳性
B. 乙型肝炎病毒表面抗体、e 抗体、核心抗体同为阳性
C. 乙型肝炎病毒表面抗原、e 抗体、核心抗体同为阳性
D. 乙型肝炎病毒表面抗原、e 抗原、核心抗原同为阳性
E. 乙型肝炎病毒表面抗原、e 抗原、核心抗体同为阳性
71. 临床上的“大三阳”是指
72. 临床上的“小三阳”是指

[73-76]

- | | |
|------------|---------|
| A. 苯噻啉 | B. 卡马西平 |
| C. 阿司匹林 | D. 苯巴比妥 |
| E. 氢溴酸山莨菪碱 | |

73. 三叉神经痛宜选用的药品是

74. 反复性偏头痛宜选用的药品是

75. 发作性紧张性头痛宜选用的药品是

76. 由于平滑肌痉挛引起的腹痛宜选用的药品是

[77-79]

- | | |
|---------|---------|
| A. 右美沙芬 | B. 可待因 |
| C. 喷托维林 | D. 苯丙哌林 |
| E. 羧甲司坦 | |

77. 频繁、剧烈无痰干咳及刺激性咳嗽宜选用的药品是

78. 白天咳嗽宜选用的药品是

79. 夜间咳嗽宜选用的药品是

[80-81]

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 长链甘油三酯 | B. 中链甘油三酯 |
| C. 短链甘油三酯 | D. 比沙可啶 |
| E. 乳果糖 | |

80. 肝性脑病及长期卧床的便秘患者宜选用的药品是

81. 肾功能衰竭患者适宜选用的脂肪乳剂类型为

[82-83]

- | | |
|-----------|---------|
| A. 过氧化苯甲酰 | B. 维胺酯 |
| C. 异维 A 酸 | D. 依巴斯汀 |
| E. 西替利嗪 | |

82. 治疗过程中怀孕,必须行人工流产的药品是

83. 可引起尖端扭转型室性心动过速或 Q-T 间期延长的药品是

[84-86]

- | | |
|---------|---------|
| A. 氨曲南 | B. 青霉素 |
| C. 头孢呋辛 | D. 亚胺培南 |
| E. 红霉素 | |

84. 青壮年和无基础疾病的社区获得性肺炎患者宜选用的药品是

85. 老年人、有基础疾病或需要住院的社区获得性肺炎患者宜选用的药品是

86. 青霉素过敏的肺炎患者宜选用的药品是

[87-88]

- | | |
|---------|---------|
| A. 布地奈德 | B. 特布他林 |
| C. 沙美特罗 | D. 扎鲁司特 |
| E. 色甘酸钠 | |

87. 起效缓慢,吸入后需立即漱口的药品是

88. 停药需逐步减量,不能突然停药的药品是

[89-90]

- | | |
|-----------|---------|
| A. 奎尼丁 | B. 利多卡因 |
| C. 胺碘酮 | D. 阿托品 |
| E. 异丙肾上腺素 | |

89. 洋地黄中毒后发生快速性心律失常,可解救的药品是

90. 洋地黄中毒后发生缓慢性心律失常,可解救的药品是

三、综合分析选择题(共 20 题,每题 1 分。题目分为若干组,每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

[91-94]

某男,30 岁,腹泻 2 天,自觉有轻度脱水症状,遂来医院就诊。经查,患者中性粒细胞计数增高、心律失常,但患者自述无心脏病史,也无家族心脏病史。

91. 针对患者的症状,应选用的治疗药物是

- A. 小檗碱+洛哌丁胺
B. 小檗碱+地芬诺酯

- C. 小檗碱+山莨菪碱
D. 小檗碱+口服补液盐Ⅲ(ORS)
E. 小檗碱+乳酶生
92. 若小檗碱暂时缺乏,可替代的药物是
A. 鞣酸蛋白
B. 胰酶
C. 乳酶生
D. 双八面蒙脱石
E. 双歧三联活菌胶囊
93. 不宜与该替代药物同服的是
A. 维生素 A
B. 维生素 B₁
C. 维生素 C
D. 叶酸
E. 铁剂
94. 下列关于腹泻治疗说法错误的是
A. 应用止泻药治疗的同时,实施对因治疗不可忽视
B. 应用止泻药治疗即可,无需对因治疗
C. 针对病因治疗同时,还应及时补充水和电解质
D. 病毒性腹泻可选用抗病毒药
E. 非感染性的急慢性腹泻,抗动力药可缓解急性腹泻症状

[95-96]

某男,62岁,慢性哮喘5年,近几天感到气短、胸闷,伴发咳嗽。被家属送至医院就诊,就诊后诊断为轻度哮喘急性发作,给予沙丁胺醇吸入,但效果不佳。

95. 针对沙丁胺醇治疗效果不佳,可采取的措施为
A. 加用缓释茶碱片
B. 加用孟鲁司特
C. 加用沙美特罗
D. 加用茶碱静脉注射
E. 加用激素静脉应用
96. 该加用药物的安全有效浓度为
A. 3~6 $\mu\text{g/ml}$
B. 3~15 $\mu\text{g/ml}$
C. 3~18 $\mu\text{g/ml}$
D. 6~15 $\mu\text{g/ml}$
E. 6~18 $\mu\text{g/ml}$

[97-100]

某女,29岁,怀孕2个月,在医院检查中发现血压为172/109 mmHg,医生建议采取降压治疗措施,给予处方如下:

姓名:××× 性别:女 年龄:29

临床诊断:妊娠高血压

R:

美托洛尔片 10 mg×20×3 盒/50 mg q8h po.

甲基多巴片 20 mg×10×3 盒/100 mg q12h po.

硝苯地平片 10 mg×30×2 盒/30 mg q8h po.

97. 根据血压测量结果,该患者血压的类别为

- A. 1级高血压
- B. 2级高血压
- C. 3级高血压
- D. 单纯收缩期高血压
- E. 正常血压

98. 处方中,单次给药剂量错误的是

- A. 美托洛尔
- B. 甲基多巴
- C. 硝苯地平
- D. 美托洛尔和甲基多巴
- E. 甲基多巴和硝苯地平

99. 处方中,给药次数错误的是

- A. 美托洛尔
- B. 甲基多巴
- C. 硝苯地平
- D. 美托洛尔和甲基多巴
- E. 甲基多巴和硝苯地平

100. 若该患者有严重先兆子痫,宜加用的药物是

- A. 谷维素
- B. 叶酸
- C. 维生素 B₁₂
- D. 硫酸锌
- E. 硫酸镁

[101-104]

某男,56岁,高血压病史10年,但一直未采取有效治疗措施。几个月前在医生建议下,开始服用降压药物,自觉症状好转且血压降低,故自行停止服药。停药后该患者发现血压迅速升高,并有头痛等症状。