

卷八
九
十

婦人良方



婦人良方卷之八

薛氏醫按

臨川陳白明編 吳郡薛 已註

新

都

內道政校

婦人小便淋瀝不通方論第一

婦人淋瀝由腎虛而膀胱熱也。蓋膀胱與腎為表裏，主於水行於脬者為小便也。若腎虛則小便頻數，膀胱熱則小便淋瀝甚則不通，腹脹喘急，當速治之。

愚按前症若膀胱熱結用五淋散。若脾肺虛熱用補中益氣湯加山藥五味麥門。若脾經鬱熱用加味歸脾湯。若肺經鬱火用黃芩清肺飲。若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯。血虛用加味逍遙散。陰虛用六味丸加柴胡山梔。大抵不渴而不利者熱在下焦血分也。用滋腎丸。渴而不利者熱在氣分也。用清肺

飲尺脉數而無力者。陰火盛而陽不能化也。用六味丸滋腎丸爲主。尺脉浮而無力者。陽氣虛而陰不能生也。用加減八味丸滋腎丸爲主。

附治驗

一婦人素有前患。內熱體倦。余以爲肝火血少。脾氣虛弱。用八珍逍遙二散兼服月餘。而小便利。又用八珍湯而氣血復。一婦人患前症。面青脇脹。諸藥不應。予以爲肝經氣滯而血傷。用山梔川芎煎服而愈。

一婦人小便不利。小腹并水道秘悶。或時腹脇脹痛。余以爲肝火。用加味逍遙散。加龍膽草四劑。稍愈。乃去膽草。佐以八珍散。加炒黑山梔兼服而瘥。

石韋湯

治小便實熱氣滯淋瀝。

石韋

黃芩炒

木通

榆白皮

葵子

藟麥

甘草各五

石薑水煎服

雞蘇散

治血熱淋瀝

雞蘇葉

木通各二

生地黄

滑石各三

刺薊根二兩

右每服半兩淡竹葉三七片水煎

桃仁煎

治血痕小便如淋。臍腹脹痛。方見血痕門第七卷第九論

火府丹

治心經積熱小便澀及五淋。加甘草名導赤散

生地黄

二兩木通為末

黃芩炒各一兩

右加蜜丸。桐子大。每服三十九。木通煎湯下。

○許學士云。一卒病渴。日飲水斗許。不食者三月。心中煩悶。

時已十月。余謂心經有伏熱。與火府丹數服。越二日來謝云。

當日三服渴止。又三服飲食如故。此本治淋用。以治渴可謂。

通變也

一方牛膝一合水煎入麝香少許服之鄞縣耿武尉夢得其內患淋下砂石剝剝有聲甚爲苦楚一服而愈

附方

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎虛足熱腿膝無力不能履地又下焦陰虛小便不利肚腹腫脹或皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

知母

酒炒

黃柏

酒炒各二兩

肉桂

二錢

右各另爲末水丸桐子大每服二百丸空心白滾湯下

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利宜用此藥清之

黃芩

炒

山梔

炒各一錢

右水煎服不利加鹽豉二十粒

五淋散

治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或成

砂石或如膏汁或熱沸便血

赤茯苓

一錢五分

赤芍藥

山梔

各一錢

當歸

甘草

各一錢二分

右入燈心

水煎服

補中益氣湯

方見二十四卷第_七論

八珍湯

加味歸脾湯

加味逍遙散

三方見二十四卷第_四論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第_八論

加減八味丸

六味丸

二方見二十四卷第_{十一}論

○婦人脬轉小便不利方論第二

婦人脬轉或內熱傳搏於胞或忍小便氣逆於內以致小腹急

痛不得小便。甚者至死。

愚按前症。不問男女孕婦。轉脬小便不利。命在反掌。非八味丸不能救。餘察前後論主治。

附治驗餘見第十五卷

一婦人小便淋瀝。小腹脹悶。胸滿喘急。諸藥不應。余視爲轉脬之症。用八味丸一服。小便如湧而安。

一婦人因鬱怒。小便滴瀝。漸至小腹腫脹。痰咳喘促。余用八味丸料煎服。小便卽利而痊。

一婦人素善怒。小便淋瀝不利。月經不調。半載矣。或兩脇脹悶。或小腹作痛。或寒熱往來。或胸乳作痛。或咽喉噎塞。或兩腳筋攣。或肢節結核。面色青黃不澤。形氣日瘦。左關弦洪。右關弦數。此鬱怒傷肝脾。血虛氣滯爲患。朝用加味歸脾湯。以

補脾氣解脾鬱祛肝火夕用滋腎丸生肝散滋腎水以生肝
血抑肝火舒筋膜兼服月餘而愈

滋腎生肝飲

山藥

山茱萸肉各一錢

熟地黃自製二錢

澤瀉

茯苓

牡丹皮各七分

五味子梓炒五分

柴胡三分

白朮

當歸

甘草三分

右水煎服

葱白湯

治氣滯小便不通腹脹欲死

橘皮三兩

葵子一兩

葱白一莖

右水煎分三服

八味丸

治脬轉小便不通殊有神効但世所不用以致誤人

多矣方見二十四卷第十一論

滑石散

治脬轉小便數日不通

滑石一兩

寒水石二兩

葵子一合

右爲末以水一斗煮至五升時服一升卽利。

又方

亂髮

燒灰

葵子

車前子

各等分

右爲末每服二錢酒調下。

石韋湯

治脬轉小便不通方見前卷一

治強忍小便致脬轉尿不利困篤欲死。

滑石

二兩

亂髮灰

一兩

右爲末每服三錢桃白皮一觔細切熟杵入水三盞絞取汁

調服。

千金翼用杏仁

三十粒去皮尖

麩炒黃嚙細水送下立通。

方皂角爲末吹鼻內取嚏。

△婦人小便數方論第三

小便乃腎與膀胱主之。蓋腎氣通於陰。若二經虛而熱乘之。則小便澁滯。虛則頻數也。

愚按前症。若肝經火動。用逍遙散。加龍膽草。車前子。膀胱火動。六味丸。加麥門五味。肝腎濕熱。龍膽瀉肝湯。鬱傷肝脾。加味逍遙散。加味歸脾湯。肝脾肺氣虛。補中益氣。加麥門五味。肝經血虛。加味逍遙散。腎氣虛。敗鹿茸散。如不應。用八味丸。

附治驗

一婦人患前症。小便頻數。日晡熱甚。此肝脾血虛。氣滯而兼濕熱也。用加味逍遙散。加車前子而愈。

一婦人患前症。發熱煩躁。面目赤色。脈洪大。而虛。余謂此血虛發躁。用當歸補血湯。數劑而痊。

一婦人久患前症。泥屬於火。雜用寒涼止血之劑。虛症悉具。

余曰此脾胃虧損而諸經病也當補中氣為主遂以六君補中二湯兼服兩月餘尋愈

桑螵蛸散 治腎氣虛寒小便數少或時頻數或夜間尤數

桑螵蛸 三十板炒 鹿茸 炙 牡蠣 煨 甘草 炒二兩

黃芪 炒

右爲末每服二三錢食前空心用薑湯調下日二服

縮泉丸 治腎氣虛寒小便頻數或遺尿不止小兒尤効

烏藥 益智仁 等分

右爲末酒煎山藥末爲糊丸桐子大每服七十丸鹽酒或米

飲下

鹿茸散 治腎氣虛寒便溺數甚或夜間頻數遺溺

鹿茸 炙 烏賊魚骨 桑寄生 當歸

龍骨服各二兩

白芍藥炒

附子炮各三錢

桑螵蛸炙各五錢

右爲末每服二錢空心并食前用溫酒調下作丸服亦可凡用附子重一兩二四錢底平頂圓周圍有辦者方是

附方

當歸補血湯

八味丸

六味丸

加減八味丸四方見二十四卷第十一論

逍遙散

加味逍遙散

加味歸脾湯三方見二十四卷第四論

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

婦人遺尿失禁方論第四

經云。膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。乃心腎之氣失其常度也。故有便道溢而遺者。有失禁而不知自遺者。亦有生產傷膀胱。不時而遺者。有脾寒臟冷。遺而不知者。

愚按內經曰。胞移熱於膀胱。則癰溺血。膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。注曰。膀胱爲津液之府。水注由之。然足三焦脉實。約下焦而不通。則不得小便。足三焦脉虛。不約下焦。則遺溺也。靈樞經曰。足三焦者。太陽之別也。並太陽之正。入絡膀胱。約下焦實。則閉。癰虛則遺溺。竊謂前症。若肝腎虛熱。挺孔痿痺。用六味丸。如不應用。加減八味丸。陽氣虛憊。膀胱積冷。用鹿茸丸。如不應用。八味丸。若脾氣虛弱。不能禁止。用補中益氣。

湯加山藥山茱五味。若肺氣虛寒。前湯加桂附。此症屬虛熱者多。真寒者少。治宜審察。

附治驗附小便遺尿

一婦人小便自遺。或時不利。日晡益甚。此肝熱陰挺不能約制。用六味丸料。加白朮酒炒黑。黃柏七分。知母五分。數劑。諸症悉愈。若誤用分利之劑。愈損真陰。必致不起。

一老婦患前症。惡寒體倦。四肢逆冷。余以爲陽氣虛寒。用補中益氣加附子三劑。不應。遂以參附湯四劑。稍應。仍以前藥而安。附子計用四枚。人參三斤許。

一婦人病愈後。小便出尿。此陰陽失於傳送。名大小腸交也。先用五苓散二劑而愈。又用補中益氣湯而安。

鹿茸丸 治陽氣虛寒。小便白濁。滑數不禁。或臍腹

陰冷大便不實

鹿茸炙

椒紅

桂心

附子炮

牡礪煨

補骨脂炒

石斛

肉蓯蓉酒浸

雞胫炙

沉香各一兩

桑螵蛸炙二錢

右為末。酒糊丸。桐子大。每服三十丸。空心溫酒下。

秘元丹 治陽氣虛。小便不禁。或夜多小便頻數。

白龍骨煨三兩

訶子十箇去核

縮砂去皮一兩

右為末。糯米粥丸。桐子大。每服五十丸。空心鹽酒下。

又方。鹿角鎔炒為末。每服三五錢。空心熱酒調下。

又方。雞胫炙為末。每服二三錢。空心酒調下。日二三服。

又方。桑螵蛸酒炒為末。每服二錢。空心薑湯調下。

附方

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

六味丸

加減八味丸

八味丸 三方見二十四卷第十一論

參附湯 方見十九卷第六論

五苓散 方見二十一卷第九論

婦人小便出血方論第五

心主於血。通行經絡。循環臟腑。若得寒則凝滯。得熱則妄行。失其常道。則溢滲於脬。則小便出血也。

愚按前症。肝經血熱者。加味逍遙散。怒氣血傷者。加味逍遙散。調送髮夾。若肝經風熱。用前散。送子芩丸。氣血俱虛者。八

珍散送髮。天膏梁積熱者。清胃散加槐花甘草。風熱傷胃者。四君子加防風枳殼。胃氣不能攝血者。補中益氣湯。鬱結傷脾。不能攝血者。濟生歸脾湯。

附治驗

一婦人尿血。因怒寒熱。或頭疼。或脇脹。此肝血虛而肝火盛。用加味道遙散。而血脹止。補中益氣加蔓荊子。而頭痛痊。後鬱怒腹痛尿血。仍用前散加龍膽草。并歸脾湯治之。將愈。又因飲食所傷。復作心忪不寧。徹夜不寐。仍用前湯而痊。

一婦人尿血。面黃體倦。飲食不甘。晡熱作渴。此脾胃氣虛。不能攝血。歸經用補中益氣。以補胃氣。用歸脾湯。以解鬱結。更用加味道遙散。以調養肝血。而痊。

一婦人小便出血。服四物蒲黃之類。更加發熱吐痰。加芩連。