

圖
註
本
草
綱
目
求
真

上海錦章書局
出版

氣喘則並載其能治但用此之法則在佐使之間或兼氣藥以助力人可得衛中之汗或兼營藥以助液歸可得營中之汗
 或兼溫藥以助陽預可除寒凝之寒毒或兼寒藥以助陰黃芩石可解炎熱之瘟邪此是傷寒陰證第一要藥至或有數不
 宜多用及夏月不宜用者蓋因過用則汗多亡陽自汗表虛則耗人元氣張仲景曰陽虛者不可發汗以小便通者不可
 便者不可發汗下利雖有表症不可發汗淋瀝家不可發汗衄血家不可發汗咽喉不利者不可發汗下利者不可發汗
 數不可發汗少陰病但欲無汗不可發汗脈微數者不可發汗汗家不可發汗汗家不可發汗汗家不可發汗汗家不可發汗
 發不可發汗夏月陽氣外泄不宜再發以奪元氣耳然果春夏真值有深寒內入則又何不可用之有至於手少陰心之風熱斑疹足
 厥陰之風痛目痛審其腠理堅閉病應用散亦當審實以投功與桂枝柴胡葛根芍藥同為一類但桂枝則解太陽風邪傷
 衛王好古曰心主營為血肺主街為氣故麻黃為根則解陽明肌熱口渴渴主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經肺藥胡則發少
 陽陽邪寒熱往來此則能發太陽陰邪陽營不可不細辨也發汗用莖莖節止汗須用莖節並蛤粉粟米等分為末袋盛撲
 之時珍曰麻黃發之氣破不能禦而根節止汗效如影響物理之妙不可測度如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛
 之陰虛胃熱飲中著亡陽乘症諸症皆可通症加而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛
 脈引論藥外飲至飽甚而亡陽乘症諸症皆可通症加而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛
 日醉飽行房厚朴白微為使惡辛夷石膏
 汗出於脾

冰肺
寒氣
內客

蘇梗
子梗

開提
肺中
風寒
載藥
上行

蘆頭

桔梗

紫蘇入心脾。背而俱紫。辛溫香竅。五。月端午採用。凡風寒偶傷。氣閉不利。心膈氣脹。並暑濕泄瀉。熱閉血衄。崩。喉。腫。口。臭。俱可用此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可煖中。使其一身舒暢。故名曰蘇。蘇與。是以時珍謂其同橘。皮。砂。仁。則能行氣安胎。同藿香。烏。藥。則能快氣止痛。同麻黃。葛。根。則能發汗解肌。同芍。藥。當。歸。則能和營散血。同木瓜。厚。利。則能散濕解暑。同桔梗。枳。殼。則能利膈寬中。同杏。子。腹。子。則能消痰定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺。難。以。奏。效。但。久。服。亦。能。泄。人。真。氣。虛。寒。泄。瀉。尤。忌。即。安。胎。和。胃。藥。中。用。之。不。過。取。其。辛。香。暫。調。胃。寒。氣。滯。之。症。豈。可。概。用。久。用。以。臨。虛。虛。之。禍。耶。宗。典。曰。紫。蘇。氣。味。香。散。今。人。朝。暮。飲。紫。蘇。湯。無。益。醫。家。謂。另。一。梗。下。氣。稍。緩。子。降。氣。最。速。務。本。新。書。云。凡。道。神。近。道。油。基。明。草。致。豪。貢。之。疾。者。此。有。焉。若。脾。胃。寒。人。多。致。滯。泄。往。往。不。光。一。梗。下。氣。稍。緩。子。降。氣。最。速。可。理。肺。不。可。理。肺。定。但。性。主。疎。泄。氣。下。氣。與。橘。皮。相。宜。與。橘。紅。同。為。除。喘。定。嗽。消。痰。順。氣。之。藥。喘。表。弱。氣。虛。者。忌。用。葉。腸。滑。氣。虛。者。忌。用。子。但。性。主。疎。泄。氣。虛。陰。虛。喘。逆。者。並。禁。宜。橘。皮。忌。鯉。魚。子。炒。研。用。

桔梗入心脾。辛苦而平。按書既載。能引諸藥上行。又載能以下氣。其義何居。蓋緣人之臟腑。胸膈。本貴通利。一有寒邪阻。塞。則氣血不通。其在於肺。則或為不利。而見痰壅。喘促。鼻塞。其在陽明。胃。則或風熱相搏。而見齒痛。其在少陰。腎。則因寒蔽。火鬱。而見目赤。喉痺。咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡。肺癰。乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢。腹痛。腹。滿。腸。鳴。總皆寒入於肺。閉其竅道。諸病源流。則清不得上行。濁因不得下降耳。桔梗味苦。氣平。質浮。色白。係開提肺氣之聖。藥。可為諸藥舟楫。載之。上浮。能引苦泄。峻下之劑。至於至高之分。成功。俾清氣既得上升。則濁氣自克下降。降氣之說。理。根。於。是。是以好古加味甘桔。無不因症加藥。如失音。則加訶子。聲不出。加半夏。上氣。加陳皮。涎嗽。加知母。目赤。加梔子。大黃。面腫。毒。加葛根。少氣。加人參。嘔。加半夏。夏生。姜。吐。膿。血。加紫苑。肺。萎。加向。膠。胸。膈。不。快。加枳。殼。痞。滿。加枳。實。目。赤。加梔。子。大。黃。面。腫。加。伏。苓。膚。痛。加黃。耆。發。斑。加荆。防。痲。癩。加牛。蒡。大。黃。不。得。眠。加梔。子。總。不。離。乎。桔。梗。以。為。開。提。之。功。時。珍。曰。朱。肱。活。人。書。治。胸。中。苦。辛。清。肺。甘。下。氣。也。張。仲。景。傷。寒。論。治。寒。宜。結。胸。用。桔。梗。貝。母。已。豆。取。其。溫。中。消。散。破。積。也。入。治。肺。癰。腫。膿。用。桔。梗。枳。殼。取。其。能。除。寒。熱。也。後。人。易。名。甘。桔。湯。通。治。咽。口。舌。諸。病。三。四。日。咽。痛。亦。用。桔。梗。甘。草。取。其。苦。年。散。寒。甘。平。除。熱。合。而。用。之。仁。宗。加。荆。芥。防。風。連。翹。送。名。如。聖。湯。喉。舌。其。驗。也。奈。世。僅。知。此。屬。上。升。而。不。知。其。下。行。其。失。遠。矣。但。痘。疹。下。部。不。起。勿。用。以。其。性。升。之。故。久。嗽。不。宜。妄。用。以。其。通。陽。泄。氣。之。故。陰。虛。不。宜。妄。用。以。其。拔。火。上。乘。之。故。其。虛。能。吐。膈。上。風。熱。痰。實。生。研。末。水。調。服。探。吐。去。浮。皮。甘。浸。微。炒。用。畏。龍。膽。草。白。朮。忌。猪。肉。

黨參 山草 一百八

微寒 桔梗 黨參 生薑 粳米

宣肺
寒清
肺熱

防風
寒枯
寒乾
寒乾

發表
降寒
止嘔

蓋皮

人參而有上黨之號。人參蓋緣隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼求之不得。去宅一里許見參異常。掘得人參一如人體四肢畢備。呼聲遂絕。入上黨人參根頗纖長。根下垂有發一尺餘者。或十歧者。其價與銀相等。遠東高麗伯濟諸參均莫及焉。李時珍云。上黨潞州也。民以人參為地。防害不復採取。今所用者皆是遼參。觀此則知諸參。惟上黨為最美。而上黨既不可採。豈復別有黨參之謂哉。近因遼參價貴。而世好奇居異。乃以山西太行山出之苗。及以防風桔根薺尾偽造。相繼混行。詎知參有不同。性有各異。防風桔梗乃屬表散風寒傷氣之味。人參甘溫乃屬補肺益氣之味。即山西太行山新出之黨。致之張璐亦謂甘平清肺。並非等於真正黨參。確有補益。今人但見參貴。而即以此代參。不亦大相逕庭乎。且余嘗見虛弱之症。亟當人參疏補。以救垂絕。而醫根用黨參替代。以致病卒不起。并令豪貴之家。朝夕待茶。以致脯受剝削。病潛滋長。此皆誤用之害人。但習而不察耳。附記以為世之粗工妄用黨參者戒。

生薑
辛平
辛平

生薑入氣味辛。走而不守。據書開載主治甚多。然總發表除寒。開鬱散氣。辟惡除邪。數端而已。蓋性溫其曰傷寒頭痛。傷風鼻塞。可用者。以其主有宣散通肺之力也。咳逆口噦。而必用者。以其具有開提散鬱之義也。家聖藥書云。以散之。喉乃氣通不。此藥行陽而散氣也。或問生薑辛溫入肺。何以云入胃。口曰。俗以心下為胃。水氣濕瀉血痺而必用者。以口者非矣。咽門之下受有形之物。及胃之系。便是胃口。與肺系同行。故能入肺而開胃口也。薑汁頭腦力諸毒可解。凡半夏南其具有逐陰行陽除濕開導之力也。五兩水八升煮服。他如凍耳可擦。散寒。孤臭可療。薑汁頭腦力諸毒可解。凡半夏南可解。亦何莫不由宣發之力。以為辟除。蜜煎調和。無不宜之。可散邪惡。生薑可散寒。其利溥矣。夫辛入肺。肺旺則一身之氣皆系焉。用中焦之元氣充而足。脾胃出納之令。壯而行。邪氣不能容矣。凡中風中暑中氣中毒中酒。食厥痰厥厥厥厥霍亂。昏暈一切暴病。得之必救。重便服立可解。救以薑能開胃下氣。重便降火也。早能令薑不犯霧露之氣。除濕及山嵐不正之邪。皆能以正神明。而辟穢惡。真藥中之神聖也。但積熱惡目。及因熱成痔者。切忌。食薑酒其發甚速。癰瘡人多食則生惡。所此皆昔人至書有言。夜主闔而薑不宜食。秋主收而薑不宜食。與孕婦食薑。而令免指象形。此雖就其時令。及以物類相感。立說然。亦未可盡拘。薑皮辛涼和脾利水消腫。取其皮以行皮之義。秦皮為使。惡黃連黃芩。夜明砂。相惡。志云。薑皮無筋。亦物性有。所伏耶。

生薑
辛平
辛平

生薑
辛平
辛平

生薑
辛平
辛平

葱白

散居太勝遊頭痛兼治風濕相搏

脈微用白通湯若亡已陽者四
 逆而加葱白若取以通陽者
 外散又氣通則血活氣為血帥
 毒解故書又言能治諸般惡毒如魚肉蛇蝎類
 理又安有毒氣不解而云是藥之莫治乎陽春一回草木甲坼其勢然也故葱號為葱伯又曰和事草其意在斯取白連翹
 用亦有年青者宏景曰葱有寒熱白冷青但過食亦損鬚髮以辛剗及有虛氣上冲汗出不止之弊以平散同蜜食如何緩
 人以蜜性最脹葱性最發同葱則脹益發而不可解矣不死何待思訖曰正月食生葱令人面上起遊風生葱同棗食亦令
 人病其義可以例推因并記之同蜜食作下利燒葱同蜜食壅氣殺人

盡不序堅在症如透在耳奈用者頑凡見用之臨
 其用而之肝用南執肝用羌以入痺風疾以當風
 百中蕪疎症而有星堅而以既否如冷濕透葉用風風
 音焚其則更風之腎症治除仁此痛痺發本桂則為
 一血以有見痛哉決見皮腸症矣之痛閉者棧其陽
 在油風宜有則經明有膚胃見更當之之有以藥邪
 於其病於寒有絡子熱癰濕癰有用當當如解亦寒
 平濕在虎濕如風水成癰熱腫風以用用斯其變也
 背要肝腎之蛇疾宅則通又瘡熱威以以至肌還風
 袖皆而虎症退天疑如全身肝之疔山羊片有在莫
 無隨症膠則之麻仁金周肝之症山羊片有在莫
 體症見之有能之之蛇瘡經當症風風風風大定風
 會審有類宜殺治治之巴風用見在在在在陽太陽
 有酌瘡但於盡肝風治致邪以鼻腸經皮少勝如其
 非以芥其變肝熱熱胎胎浮牛塞胃絡瘡陰胎肝性
 倉定日氣劑惡氣目風春萍夢鼻症症骨骨症症多
 辛其赤味並娛娛醫醫發寄既在淵凡見隨經見風動
 急趨則緩錄蛇虛之擒生入凡之惡瘡症症遊病而
 迫但不急五之風類鈎以肝喘當瘡瘍凡見風發變
 所其得則如能川而藤強經嗽用腫癰驚攻於寒
 能理不有皮哉奪年之筋散體以毒腫瘰癧頭風屬
 得道用間烏熱之吏治骨風腫年之之疔攻之則陰
 其無幾矣疾瘡永永之復之吏當當類類當當
 精窮恭至附結肝片類類利當症用用用用之由性
 微變以於之之經牛越而脾用見以以當當以肝多
 也化散風類類氣夢瘡萎經以目肥山用用用見詳
 靡其病但而之蟬之白翳屯甲以以以治症而
 風在其山之階退草濕前眩風症白獨症乃守
 而肝功甲類風之解海者量在見花活凡有故
 逐而用草而熱治齒桐入之陽疾蛇症一風論
 其症治烏膚以皮羊皮如當明認風見身不病
 於見效牛香理膚白以此用胃壅在口骨在肝
 風有則勞之入應生瘡矣以經塞關乾痛肝至
 病肌有肥脣可瘡白瘡在耳其症之節而之而於
 在膚珠兒疾患漸附濕于菊兒當症濕當偏風
 肝燥矣之氣矣荷之諸風症頭用見之用在則
 而熱風情並風之階痛已見面以九當以於症
 症則病風理病治風菴在惡諸皂瘡用防肌變
 見不在瘻入在咽濕釜肝寒疾角皆以風肉連
 有得肝以可肝喉而草而發之風風細症之而
 濕不而理思而口治以症熱當在之年見表莫
 熱用症又矣症當可治又無用十當與風症醫
 燥劑見其風見石類麻秋汗以二用風攻見論
 之外有餘邪有補椎木有而而白經以在顛惡藥
 則以骨矣在疾寒矣痛痛端端附絡骨骨頂風而
 不達矣風肝氣之風冷則之白症膏脆之自至
 得其不病而則能已蒼如當見症症當汗

美

羌活子人按時珍言羌活獨活是二種正羌活如川芎則羌活即為獨活之辛苦性溫味薄氣雄功專上升凡病因於太

陽膀胱而見風遊於頭發為頭痛經曰半身以上風受之也半身並循經脊強而厥發為剛症柔症足太陽之脈行於身背

風有汗為柔，症在胃是。並當用此調治。症宜同治。頭痛宜同。且能兼入足少陰腎。足厥陰肝。而使肌表八風之

邪並周身風濕相搏百節之痛皆能却亂反正而治無不愈者也蓋羌活獨活雖皆治風之品張介賓曰風之為病最多治者在下明其表裏耳蓋此

驅風羌活 獨活 防風 荆芥

散足陽明胃經風濕

氣不輕揚。驅風之必人人骨肉也。是以宣散風邪。用以防風之必兼用荊芥者。以其能入肌膚宣散故耳。且既入於肝經。風木之臟。則肝即屬藏血之地。故又能以通利血脈。俾吐衄腸風崩痢。產後血暈。瘡癰癰腫。血熱等症。靡不藉其輕揚以為宣泄之具。宜於風木之臟。既於其氣而理者。復不於血而治乎。兼入肝經血分。古人產後血暈風起。故常有麻黃之患。不待外風襲有用荊芥為末同酒及或童便調治。崩中不止。有用炒黑荊芥以治。於此可見其概矣。連穗用治血須炒黑。煎故善之也。并發黑龍勝反魚蟹河豚驢肉。赤故必炒黑。

川芎
芳草

芎藭入肝兼心色辛溫升浮。為肝膽心包血分中氣藥。故凡肝因風鬱而見腹痛脇痛血痢寒痺筋學目淚及癰疽一切等症治皆能痊。成皆屬血氣阻滯所致緣人一身血氣周流無有阻滯。則百病不生。若使寒濕內搏。則血滯而不行。為不及其熱濕內搏。則血急而妄沸。為太過其氣鬱於血。則當行氣以散血。血鬱於氣。則當活血以通氣。行氣必用芎藭。以血得歸。則補而血可活。且血之氣入更得芎而助也。況川芎上行頭目。元素曰川芎其陽有四為少陽引經一也諸經頭風二也助清用之氣三也去濕氣在頭四也下行血海。其辛最能散邪血。因風鬱得芎入而血自活。血活而風自滅。又何有痛有痺有痛有鬱而致病變多端哉。是以四物用之以散肝經之風。頭痛必用以除其鬱。某曰頭痛必用川芎如不愈加各引經藥大陽羌活湯明然氣味辛竈能泄真氣。單服久服令人暴亡。時珍曰芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺肺氣偏勝全來賊木肝必受邪久則偏絕豈不大蜀廬大塊裏白不油辛甘者良。江南產者為撫芎。秦廬為西芎。白芷為使。畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸。

白芷
一
百
十
六

白芷入肺大腸色白味辛氣溫力厚通竅行表為足陽明胃經祛風散濕主藥故能治陽明一切頭面諸疾陽明之脈起於鼻而終於目故病在鼻者皆足陽明之脈也
 頭面如頭目昏痛用羌活白芷一選方治之
 多屬治風熱與痰白芷片酒釐牙銀骨痛用香白芷或白芷與吳茱萸五分等分浸水漱涎用面黑癢者是其風熱乘肺
 集要分治末服二錢茶清下
 炒等分治末服二錢茶清下
 上燉於膠漆為淵移於大腸變為血崩血閉腸風痔瘻癰疽與濕熱發於皮膚變為瘡瘍燥癢皆能溫散解托而使膝
 理之風悉去留結之癰腫消誠祛風上達散濕之要劑也
 珠空透致脾腹冷痛皆由厥陰所致解此排膿昔臨川有一人單被葉紅蜀葵二兩白芍藥白芷藥人用治鼻病入內托散用長肌肉肉不壞曰
 每空透致脾腹冷痛皆由厥陰所致解此排膿昔臨川有一人單被葉紅蜀葵二兩白芍藥白芷藥人用治鼻病入內托散用長肌肉肉不壞曰
 淚水調香白芷末一匙以他藥補之入解此排膿昔臨川有一人單被葉紅蜀葵二兩白芍藥白芷藥人用治鼻病入內托散用長肌肉肉不壞曰
 微過人良久消縮如故云以麥冬湯調尤妙仍以未搽之
 然其性升散血熱有虛火者禁用色白氣香者佳或微炒用當

歸為使惡旋覆花

薄荷一百十七

肺肝
氣風
及熱
內淫

薄荷入肺氣味辛涼。功而入肝與肺。故書皆載辛能發散。而於頭痛頭風。發熱惡寒則宜。辛能通氣。而於心腹惡氣痰結。則治涼能清熱。而於咽喉口齒眼耳。癰疹瘡疥。驚熱骨蒸。血則妙。是以古方追遙。用此以為開鬱散氣之具。小兒驚風。用此以為宣風向導之能。腸風血痢。用此以為疎氣清利之法。涼能清熱。然亦不敢多用。所用不過二三。而止。恐其有泄真元。產大甚食之。令人動消渴病。蘇產氣芳者。良。貓傷用汁塗之。最妙。也。桑椹鳩之酒也。苗草魚之酒也。

藥本一百十八

治風
犯太
陽
項
痛

藥本入肝性溫氣雄。能治太陽陽風。犯顛項腦後俱痛。號為是經要藥。凡治顛項頭痛。必兼且復言治脊強。而厥與太陽之並。婦人疝瘕急迫腫痛。此雖病屬下見。及徐太陽。本經寒濕所致。然非風邪內犯。則病易形。蓋本氣味辛溫。性雖上行。而亦下達。非謂用此以治太陽顛項。頭痛齒痛。功止上建。而於脊強。而厥竟不循經下行也。且據書言能治胃風泄瀉。霍亂日風。客於胃。飲以萬本。又治粉刺酒皰。同白芷。亦是風干太陽。連累而及。治則與之俱治。豈但治風頭痛而已哉。或謂其性頗有類於芎藭。皆能以治頭痛。然一主於肝膽。雖行頭目。而不及於顛項。一主太陽及督。雖其上下皆通。而不兼及肝膽之為異耳。但春夏溫熱頭痛。及血虛火炎頭痛者。切忌。根紫色似芎藭。而輕虛。氣香味。惡。蘭拓。畏青箱子。

白附子一百十九

散足
陽明
胃經
冷風

白附子入胃時珍曰。因與附子相。辛甘有毒。性燥而升。為風藥中之陽草。東垣謂其純陽。能引藥勢上行於面。為陽明經要藥。又按諸書皆載能治頭面遊風。斑斑。陽明此作脂消。與面及中風不語。諸風冷氣。血痺冷疼。陰下虛癢。皆當用此調治。玩此藥非性燥。何以可治冷氣虛癢。設非冷氣冷癢。又焉可用燥烈之藥以治乎。是以陰虛類中。並小兒脾虛漫驚。皆不宜用。以其氣味辛烈者故耳。燥能散氣。此與白芷同為一類。但白芷則兼肌濕同理。而不專及陽明風邪。此則專散陽明風冷。而於濕邪則未及耳。此藥久無真者。今惟涼州生。形如草烏頭之小者。長寸許。乾者皺紋有節。入藥妙用。

天麻一百二十

宣散
肝經
氣
風

天麻入肝辛平微溫無毒。性升屬陽。為肝家氣分定風藥。蓋諸風眩掉。皆屬肝木。肝鬱不能榮筋。故見頭旋眼黑。語言不達。等症。天麻乃辛平之味。能於肝經通脈強筋。疎痰利氣。辛而不燥。得氣之平。則肝虛風作。自爾克治。故又名為定風草。若久

主散
經絡
風痰

南星
蠲

南星
磨製

治十
二經
風濕
冷氣

白痰
熱滋

服則通身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇亦用此味以治若使肝虛在血症見口乾便閉及犯類中等症者切不
宜服以其辛能燥血者故耳去血須用養血之劑則風不勝而自滅根類黃氏草名赤箭有風不動無風反搖明亮結實者佳
濕紙包裹切片酒浸一宿焙用

天南星一百廿一

毒草

天南星牌肺味辛而燥氣溫而燥性緊而毒惟其味辛則凡中風不語肢伯云云風大法有四偏枯半身不遂也二風
風類痺及或破傷風痰用藥敷瘡口溫風刀傷撲傷如神用南星防風等分連為三服必活故書載能克治以其辛能散風
故也惟其性燥則凡癰痰固結筋脈拘攣得以能通以其燥能除濕而痰自去也惟其性緊則凡疰瘕結核胎產難下水腫

不消得以攻逐以其性緊急迫而堅自去也性雖有類半夏然半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉得之以為嚮導南星而走經絡
故中風麻痺亦得以之為嚮導半夏辛而能散仍有內守之意南星辛而能散決無有守之性其性烈於半夏也南星專主
經絡風痰半夏專主腸胃濕痰功雖同而用有別也但陰虛燥疾服之為切忌耳血虛風中急宜養血滋陰固本若根似半
夏看如虎掌者良以礬湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑酒黃泥和包煨熟用造麴

法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃晒收之火炮則膽製味苦性涼月取黃牛胆汁和南星
本納入胆中風能解小兒風痰熱滯故治小兒急驚最宜畏附子乾薑防風得防風則不麻
乾年久者最佳

威靈仙一百廿二

蔓草

威靈仙為入膀胱經辛鹹氣溫其性善走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑癭癰瘡積聚黃疸浮腫大

小腸秋風濕痰氣腰膝腿脚冷痛等症以盡病情也仍須分其臟氣偏純以定臟氣則痛多根寒致其痛必善于按縱脈不可
實有力止是寒氣奔迫未可為痛為實為熱熱則用附桂方愈不與痛與痺久必屬熱且有實脈實症固見其痛久病亦見其
調和力止是寒氣奔迫未可為痛為實為熱熱則用附桂方愈不與痛與痺久必屬熱且有實脈實症固見其痛久病亦見其
如溫熱等症初起者用清涼不得謂初病必寒故熱則用附桂方愈不與痛與痺久必屬熱且有實脈實症固見其痛久病亦見其
診病根源相症明確方無有誤此藥之管見有手足久處得此平能散和溫能泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無處
不到誠風藥中之善走者也凡辛辛者散氣利便乃知是威靈仙也是以威喻其性靈喻其效仙喻其神耳氣壯者服之神效若
氣弱服之則能泄真氣矣不獨威靈仙是也和砂仁砂糖煎治諸骨哽根叢類數百條長者二尺餘色深黑為鐵脚威靈仙
良忌茗藹湯
白痰報一百廿三

補肝 散風 邪毒 沙苑 莖葉 經胃 入肝 驅風 明目 散熱

祛風 祛濕 烏啄 毒瘡 風頑 毒頑

治風 治濕 痛癢 濕毒

白蒺藜 藥入肝 質輕色白 辛苦微溫 按諸書雖載溫能補腎 可治精黃溺失 腎腰疲勞傷等症 然總宣散肝經風邪 凡

因風盛而見目赤腫翳 升通身白癩 癰瘡難當者 服此治無不效 且此味辛肺入兼苦 腎則凡癰瘡結聚 喉痺乳癰及胎產不
下服此力能破鬱宣結 蓋肝經藏血之經 而血非可留之物 若竟認此作補而不審 兼苦泄辛散以明其治 其失靡輕 緣此
可升輕可降 味可散 味可補 微溫故服涼劑則宜連刺 刺生橋 用補劑則宜去刺 酒拌蒸 若沙苑蒺藜質細色綠 似腎功專入
腎 故書載能益精強腎 補家用三角 莖葉亦須炒用 但不辛香 宜散耳 能治蟲動 疾

決明子 藥入肝 氣稟清揚 味鹹苦甘 微寒無毒 能入肝經 除風散熱 凡人目淚不收 眼痛不止 多屬風熱內注 以致血不上行

故治當即為驅逐 按此苦能泄熱 鹹能較堅 甘能補血 力薄氣浮 又能升散風邪 故為治目收淚止痛要藥 並可作枕以治
頭風 但此服之太過 搜風至甚 反招風害 故必合以蒺藜甘菊枸杞生地女貞子槐實谷精草相為補助 則功更勝 謂之決
明 即是此意 狀如馬蹄 俗呼馬蹄決明 搗碎用 惡大麻仁

草烏頭 藥入肝 辛苦大熱 按書論此惟長洲張璐辨之明晰 言此與射罔乃至毒之物 草烏係野所生 狀類川烏 亦名烏啄

草烏頭 藥入肝 辛苦大熱 按書論此惟長洲張璐辨之明晰 言此與射罔乃至毒之物 草烏係野所生 狀類川烏 亦名烏啄
見血 非若川烏頭附子之比 自非風頑急疾不可輕投 此藥止能搜風勝濕 開頑痰 治頑瘡 以毒攻毒而已 本經治惡風
洗汗出 但能去惡風而不能回陽散寒 可知昔人病風癰服草烏頭不驚子 藥過多甫入腹 遂麻痺不救 烏附五種 王治攸
分 附子大壯元陽 雖偏下焦 而周身內外無所不至 天雄峻溫不減於附 而無頃刻回陽之功 川烏專搜風濕痛痺 却少溫
經之加 則子善行 四支不入臟腑 草烏悍烈 僅堪外治 此烏附之同類異性者 至於烏啄稟氣不純 服食遠之可也

茵蘘 藥入肝 本屬毒物 味辛而苦 氣溫有毒 按書所述治症多是風濕為用 如治風癰 則有茵蘘丸 治風痺 則有茵蘘酒 治瘧

後風 則有茵蘘膏 凡風濕痺症 多用茵蘘 與石南芥草同為一類 草辛溫有毒 能治頭風 癰腫 乳癰 若云能療虛羸寒熱
恐莫及耳 因虛當出彭城海鹽 莖赤 葉如石榴 而短厚者佳 取根葉陰乾 炭用

桂枝 藥入肝 表係肉 桂枝稍 其體輕 其味辛 其色赤 故入有升無降 故能入肺而利氣 入膀胱化氣而利水 且能橫行於臂

桂枝 藥入肝 表係肉 桂枝稍 其體輕 其味辛 其色赤 故入有升無降 故能入肺而利氣 入膀胱化氣而利水 且能橫行於臂

除骨 髓內 伏風 邪自 內出 外

六

調和營衛。治痛風脇。痛風其在靈樞謂之賊風素問謂之痺症金匱謂之歷節後世又更其名曰白虎瘧節且有別名曰本屬於肝凡治脇風之筋風箭然總謂之行痺其症則有因濕因寒因痰因虛之異須用桂枝以爲嚮導脇風症當用桂枝入肝以平止煩出汗驅風散邪爲解肌第一要藥時珍曰麻黃連翹散皮故書皆言無汗能發有汗能收然其汗之能發止是因其衛實營虛陰被陽湊故用桂枝以調其營營調則衛氣自和而風邪莫容遂自汗而解非若麻黃能開腠理以發其汗也其汗之能收止因衛受風傷不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風其用桂枝湯爲治取其內有芍藥入營以收陰外有桂枝入衛以除邪則汗自克見上非云桂枝能閉其汗孔昧者不察桂枝發汗止汗是何意義徒以順口虛喝其失遠矣經曰脈浮緊發熱無汗者陰盛與脈閉爲病不得汗出者不可與麻黃湯此又止芍藥義營固亡裏或通問桂枝上仲景汗而解非若麻黃能開腠理此爲營用桂枝外矣汗者血之液也苟非用血藥以回表之藥而汗自止矣王好古曰相火無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理此爲營用桂枝外邪出外邪不出則衛自密更不必用桂枝其汗甘草湯此又能閉汗也二義相通桂枝上仲景汗而解非若麻黃能開腠理此爲營用桂枝外強陽虛多汗者宜用桂枝以調和營衛其汗自止非桂枝能閉汗也

從汗出而止
百廿八

散肝中風

宣導

風痰

數毒

牙皂

大皂

皂角

刺子

子肥

肥兒

除風

濕去

腸胃

垢膩

增奇導之害故曰眼 審屬風寒病應外解用乳調點以按 他如瘡瘍腫熱鬱不散亦當用此發毒或令入油煎膏或研末 吹揆然瘡瘍能出不可多用則真氣立耗而有亡陽之弊矣更有自病陰虛不宜入點出兩耆老杉脂白如冰作梅花片者 良但市人每以樟腦代充

海桐皮一百三十

海桐皮入辛苦而溫能入肝經血分祛風除濕及行經絡以達病所是以腰膝脚痛能療 癢者腎之府轉搖不能腎府德 癢者筋之府屈伸不能行則 癢者筋之府屈伸不能行則 癢者筋之府屈伸不能行則

一脊風祛濕散之力用者須審病自外至則可若風自內成未可妄用須隨症酌治可耳

皂角一百三十一

皂角入肝辛鹹性燥功通竅驅風故凡風邪內入而見朱關緊閉口噤不語胸滿喉痺腹壅胎結風痰癰喘腫滿堅癢 囊結等症用此吹之導之則通上下之竅煎之服之則治風痰喘滿塗之擦之則能散腫消毒以去面上風氣薰之蒸之則 通大便秘結燒烟薰之則治癰瘡濕毒 皂角末或半夏末吹入鼻中則當 然種類甚多形如猪牙為牙皂較之大皂稍有 皂及以蘇合香丸牛黃丸至寶丹之類相其寒熱選用如寒閉牙關則當 然種類甚多形如猪牙為牙皂較之大皂稍有 皂及以蘇合香丸牛黃丸至寶丹之類相其寒熱選用如寒閉牙關則當 然種類甚多形如猪牙為牙皂較之大皂稍有

不同大皂則治濕痰更優牙皂則治風痰更勝也一種皂角刺氣味辛溫功治畧同但其鋒銳直透患處潰散癰疽及妬乳 風厲惡瘡經口風盛為痛痛者惡也脈主血血熱而致痛之氣襲之則血凝結 皂子治大便秘結瘕痞存性用 之義由結本 非大結故辛則惡麥冬畏人參苦參皂角以肥厚多脂者良炙酥燒灰用 皂氣味辛溫亦治風濕及數無名腫毒去垢膩 能潤之也

肥兒一百三十二

肥兒入生於六陽之盛成於秋金之月氣味平溫有毒不減皂莢皂刺之性凡因腸胃素有垢膩穢惡發於外則為瘰 瘰癧瘰癧毒泄於下則為腸風下痢膿血俱可用此以除以其力能條垢除穢潔淨府故也是以瘰癧病勝金丹用此涌發 不使砒性留於腸胃瘰癧用此去核加藥為丸以追其毒 治瘰癧用 皂莢去核入班貓在內緊繫蒸去班貓加入貝母 且能 燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

燥身洗血及療無名腫瘰癧集成云瘰癧用生 肥兒大煨存性用油膩粉調敷奇其子亦治大腸風秘及頭面微瘡有效 瘰癧 人沙糖并巴豆二枚紫定一枚固煨存性再入檳榔粉六分研勻香油調搽先以湯洗淨拭乾乃搽一宿見效 但其

虎骨
獸一百三十三

入肝搜風補骨是訪

山甲龍獸一百三十四

蟻汪宏景曰有山婦人項下忽生一蟻，不覺漸延至頸，偶刺破，死。出水，一藥。死，瘡久不愈，合此。蟻白，溫也。緣能鉗毒，誤食，蟻得之。參外治瘡。

故可燒灰數毒即消後五積散加全蠍莖薑煎服則治風濕冷痺不具上下發直痛不可

秦之甲用之尤臻奇效尾脚力更勝爭鋒破氣敗血其力峻猛虛人却却拊拊如龍千知化魚有反豈生豈煇豈醺豈重豈

炙油煎土炒隨方用

麋香獸入經

[illegible]

至於婦人難產墮胎。尤善。小兒驚風客忤。鎮心安神。鼻塞不聞香臭。服此即開。日

疾內積點此即除痔漏惡瘡面黑斑疹登鼠咬蟲傷成瘡用麝封固即愈痘瘡聞之亦靨服之即發藥之辛香雖同水片然

驅風虎骨 山甲 麝香 白花蛇 蛇蛻 全蠍

搜風
定痛

驅風
辟惡
殺蟲
解毒

散肝
血分
風熱
治胎
風痛

水片入口貼肉即冷。稍項熱性即發。不似麝香香氣慄裂入耳與肉而不冷耳。欲辨真假須於火炭上有油滾出而成焦黑者。此即肉類屬真。若假則化白灰而為木類也。果曰麝香入脾治肉十黃研用。凡使麝香用當門子尤妙。忌蒜不可近鼻。防蟲入腦。藥見人補而別其香為生吉。最佳別處。草木香黃。但市人或用梅荔枝核以偽之。

白花蛇一百三十六

白花蛇肝腎何以名。為搜風定痛之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性竄尤急。又食石南藤。其藤辛苦治風。故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定痛。並治風濕癱瘓。筋脈弛緩。地熱不舉。為大風疥癩。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並麴造酒。服酒時切忌見風。并於開鐔時須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其清道也。萬風用大楓子仁服此而無效者。以其大楓子氣燥傷血。服此血益受傷也。出衢州。龍頭虎口黑質白花。脇有二十四方勝。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。眼尤至死。不枯。以尾細無穿錢者佳。重一兩者為上。兩至一鎰者中大者力減。去頭與皮骨酒煮或酥炙用。

蛇蛻一百三

蛇退行皮膚味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚癇。風毒等症。無不用此為主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅蠱毒者不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癇癰仆。偏正頭風。喉舌諸疾者。皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡毒痔漏疥癬。無不用之即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而凡眼目翳膜。胎衣不下。得此即為解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。色白如銀者佳。皂次。水洗淨。或酒或醋或蜜浸炙黃。或燒灰存性。或鹽泥固煨。隨本方。

全蠍一百三十八

全蠍肝味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝驅風。諸風眩暈。凡小兒胎風發搐。大人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇塞。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蝎尾膏。以治胎風發搐。內用蝎梢二十一枚。入麝香少許。屢效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蝎同白附僵蠶為末。酒服甚效。又有同羌活柴胡當歸生地名丁香柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蝎以散血分之風熱耳。但帶下非風非熱不用。并一切內虛似風等症切忌。全用去足焙。或用尾尾力尤緊。形緊小者良。忌蝎牛。被蝎傷者塗蝎牛即解。

升陽散濕發汗除鬱

也脾惡氣之則有
 治腫之鬼氣流利
 功去災莫不益
 然庚沴故不盈
 甘堅令脾以
 味戴病去濕
 少江疫及清
 而西歲崇土
 辛一且人可
 苦人爲家行
 重女往疔
 不妖在乃
 似所燒傳
 木染蒼毒
 性其術屏
 稟鬼以諸
 中將辟藥
 和別日只
 直氣類倉
 固取編之
 直君爲裁
 固類陰越
 青爲氣所
 陽編侵高
 中載氏事
 氣越五
 之味上
 爲所民
 妙所高
 耳氏肉
 故妻以
 同病女
 香悅忌
 附多認
 則服李
 爲平肉
 散胃滿
 鬱散疾
 而爲除
 氣民辟
 中憑惡
 有具之
 着蒼居
 經能曉
 涇人蒼
 陽去能
 除

驅風蜈蚣 蟬蛻 敬異蒼朮 厚朴 秦艽 蔓荊子

除腸 胃濕 熱毒 除肝 胆風 邪止 痺除 痛

厚朴入脾胃辛

厚朴治胃^{辛苦}書言同枳實大黃即承氣湯則於實滿能瀉同蒼木橘皮即平胃散則於濕滿能除同鉅利藥則於傷寒而痛可治同瀉痢藥則於腸胃能厚大抵氣平則散故於濕滿則宜味苦則降故於實滿則下經曰太陽所主為中滿又曰諸屬熱又曰清氣在下則生食泄濁氣在上則生脹脹治宜察其腹滿而痛者屬實腹滿而不痛者屬虛腹滿而見光亮不暗按之濡屬實腹滿時欲去之不痛者屬虛腹滿而見大便不堅結時溲澀則稍減純則新如小便便利水通達即屬厚朴枳實破氣通結令人不解候以書載厚朴溫中成氣及厚腸胃數語不論虛實輒挽詎知是則於氣有益虛則於氣無損乎寔殊為可惜今人不解候以書載厚朴溫中成氣及厚腸胃數語不論虛實輒挽詎知是則於氣有益虛則於氣無損乎寔則腸胃可厚虛則腸胃不薄乎震亨曰君以補衰哉至云破血殺蟲亦是氣行而血自通味苦而蟲則殺之意凡書表藥功能總是由藥氣味勘出非是別藥者治以自逞其意見也朴即榛樹皮以肉厚紫色者良去粗皮薑汁炒用即使意惡澤瀉硝石寒水石忌豆犯之動氣

秦光肅入腸胃苦多於辛性平微溫凡人感冒風寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝則為行痺有茲三就其

勝者言寒勝則為痛痠濕勝則為着痺痠在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則

光能除風 亦何莫不由陽明濕熱與風所成 用此苦多於辛以燥腸濕和辛兼以苦以除肝膽風熱實為驅風除濕之劑
 則痛風 亦何莫不由陽明濕熱與風所成 用此苦多於辛以燥腸濕和辛兼以苦以除肝膽風熱實為驅風除濕之劑
 錢為末 每服三錢 白湯調下 治小兒骨蒸潮熱 減食瘦弱 用秦艽 炙甘草 各一兩 每用一二錢 水煎服之 加薄荷葉五錢 然
 久痛虛羸 血氣失養 下體虛寒 痠疼枯瘦 小便利者 咸非所宜 形作羅紋 相交長大 黃白 左紋者良 右紋勿用 蒼蒲為使 再

牛乳。

蔓荊子一百四十四