

齊陽綱目



00029

濟陽綱目目錄

卷二十五

火熱

論

脉法

治三焦實火方

黃連解毒湯

既濟解毒湯

又方

濟陽綱目

三因平胃散

三黃丸

大金花丸

三黃解毒丸

神芎丸

元明粉

大黃散

珍珠散

噙化三黃丸

牛黃涼膈丸

清心丸二十五

黃金丸二十七

治五藏偏火方二

瀉心湯二十九

單黃連丸三十

麥冬丸三十三

火府丹三十五

赤茯苓湯三十七

清金丸三十九

濟陽綱目

瀉肺湯四十

單苦參丸四十三

瀉黃散四十五

調胃承氣湯四十七

柴胡湯四十九

當歸龍鬚丸五十三

柴青瀉肝湯五十

佐金丸五十五

大補丸五十七

全真丹二十六

妙香丸二十八

黃連湯二十

子金地黃丸三十二

清心丸三十四

導赤散三十六

黃芩一物湯三十八

瀉白散四十

瀉心湯一一名黃芩丸

濟陽綱目

黃芩湯四十二

單山梔丸四十四

芍藥湯四十六

單石膏丸四十八

柴胡瀉肝湯五十

回金丸五十四

溫膽湯五十六

滋腎丸五十八

治風熱方

防風通聖散五十九

通關散六十一

仙术芎散六十一

桔梗湯六十二

清氣散六十三

清神散六十四

既濟清神散六十五

洗心散六十六

旋覆花湯六十七

黃荆丸六十八

消毒犀角飲六十九

龍腦飲子七十

天竺散七十一

薄荷煎七十二

上清散七十三

上清丸七十四

濟陽綱目

卷五

目錄

三

上清丸七十五

上清丸七十六

清咽太平丸七十七

龍腦丸七十八

龍腦川芎丸七十九

龍腦雞蘇丸八十

治往來寒熱方四

柴胡散八十二

地骨皮散八十三

解風湯八十四

加減小柴胡湯八十一

白芷散八十五

防風火發熱方五

調中湯八十六

火鬱湯八十七

升陽散火湯八十八

葛陰火升陽湯八十九

地骨皮散九十

加味小柴胡湯九十一

清熱解鬱湯九十二

丹溪方九十三

又方九十四

又方九十五

治氣分熱方六

柴胡飲子九十六

防風當歸飲子九十七

白虎湯九十八

治血分熱方七

桃仁承氣湯九十九

清涼四順飲子一百

補中益氣湯一百一

四君子湯一百二

附子理中湯一百三

目錄

四

濟陽綱目

卷五

目錄

治氣虛發熱方八

目錄

當歸補血湯一百四

目錄

治血虛發熱方九

目錄

滋陰降火湯一百五

目錄

加減四物湯一百八

目錄

六物湯一百七

加減四物湯一百八

正氣湯一百九

坎離丸一百十

四物坎離丸

一百十

人中白散

一百十

枸杞酒

三百十

濟陽綱目卷二十五

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

火熱

集畧論曰內經云諸熱瞀瘛

音務翅瞀問也瘛抽掣也邪熱傷神則瞀亢

陽傷血諸禁鼓慄如喪神守

禁榮也寒厥咬牙口噤鼓領也寒戰也病寒

則瘛戰而精神不能主持如喪失神守也

諸逆衝上火性交上也諸藏諸經皆有逆氣其陰陽虛實

有不諸躁狂越

躁不安也狂亂也越失當度

同者諸躁狂越也

熱盛於外則支體躁擾熱盛於內

濟陽綱目

卷二十五

火熱

則神志躁煩蓋火入於肺則煩火入於腎則躁煩爲熱之輕躁爲熱之甚

諸病附睡疼酸

驚駭附睡浮腫也附睡疼酸者陽實於外火在

以及經也驚駭不安者無乘陰分火在藏也

注泄嘔嘔瘡瘍喉痙暴瘲

不能鬱冒神明亂也瞞瘲言也

其性寄於肝腎之內附於脾肺之間火與元氣不兩

立火盛則煎熬真陰陰虛則病陰絕則死苦寒之味

能瀉有餘之火若飲食勞倦內傷元氣爲陽虛之病

以甘溫之劑除之如參芪甘草之屬若陰微陽強相

火熾盛以乘陰位爲血虛之病。以甘寒之劑降之。如當歸地黃之屬。若心火亢極鬱熱內實爲陽強之病。以鹹冷之劑折之。如大黃朴硝之屬。若腎水受傷。眞陰失守。無根之火爲陰虛之病。以壯水之劑制之。如生地元參之屬。若右腎命門火衰爲陽脫之病。以溫熟之劑濟之。如附子乾姜之屬。若胃虛過食冷物。抑遏陽氣於脾土爲火鬱之病。以升散之劑發之。如升麻葛根之屬。治積熱者始而涼和。次而寒取不愈。則因熱而從之再不愈。則技窮矣。莫若取之陰以益腎。濟陽綱目

卷二十五 火熱

二

水之不足而使其制心火之有餘可也。若夫病沉寒者。始而溫和。次而熱取不愈。則因寒而從之再不愈。則技窮矣。莫若取之陽以益心火之不足而使其制腎水之有餘可也。夫火出於心而原於肝。固當平七情。尤當戒怒戒鬱。本於腎而主於肺。固當戒色慾。尤當戒酒戒勞。智者陰平陽秘。神氣以安昧者。徇情縱慾。以致積熱。使燔灼藏府。消爍肌膚。良工無以爲計。哀哉。

劉宗厚曰。火之爲病。其害甚大。其變甚速。其勢甚彰。其死甚暴。何者。蓋能燔灼焚焮飛走狂越。消鑠於物。莫能禦之。遊行乎三焦。虛實之兩途。曰君火也。猶人火也。曰相火也。猶龍火也。火性不妄動。能不違於道之中。多動少靜。欲不妄動。其可得乎。故凡動者皆屬火化。火一妄行。元氣受傷。勢不兩立。偏勝則病移。害他經。事非細故。動之極也。病則死矣。經所謂一水不勝二火之火。出於天造君相之外。又有厥陽藏府之火。根於五志之內。六欲七情激之。其火隨起。蓋大怒濟陽綱目

卷二十五 火熱

三

則火起於肝。醉飽則火起於胃。房勞則火起於腎。悲衰動中則火起於肺。心爲君主。自焚則死矣。丹溪又啟火出五藏主病曰。諸風掉眩屬肝火動之類。經所謂一水不勝五火之火。出自人爲。又考內經病機二十九條。內舉屬火者五。諸熱瞀瘛皆屬於火之類。而河間又廣其說。火之致病者甚多。深契內經之旨。曰諸病喘嘔吐酸暴性下迫轉筋小便渾濁腹脹太鼓之有聲。如鼓。癰疽瘍瘍。瘤氣結核。吐下霍亂。瞀瘛。眼鼻塞。脈疾。尤切音。同衄。女六切音。血溢。鼻塞也。血溢。鼻出血也。血溢。白泄。淋

闔身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譖妄齷齪

莫結切音箋  
汚血也。又曰

鼻中濁流血污此皆少陰君火之熱乃真心小腸之下不止也。

氣所爲也若督癥暴瘡冒昧躁擾狂越罵詈驚駭附

腫疼鹹氣逆衝上禁慄如喪神守噎嘔瘻瘍喉痺耳

鳴及聾啞滿溢食不下目昧不明瞓瘡暴病暴死此

皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所爲也是皆

火之變見爲諸病也爲厥虛則浮太實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水減

可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不

屬若腎水受傷真陰失守無根之火爲陰虛之病以壯水之劑治之如生地元參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾姜之類若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸類而求火之爲病施治何所依據故於諸經集畧其說以備處方之用庶免實實虛虛之禍也。

選要曰積熱者謂溫熱之毒久而蘊積於內也蓋心主熱屬火然人久蘊積熱毒之氣於三焦必與心火相從陽火太盛而作熱或素嗜辛辣芳馨肥甘之味或飲醇酒或服丹石之藥以致燥熱積於藏府之中。

火熱上熾上乘心肺或口舌生瘡或咽喉腫痛或目赤頭眩或疫癰稠濁或大小便秘結此皆積熱之所致也其有陰虛生內熱或爲消渴或爲癰疽諸熱之病又當隨證論之若但蘊積熱毒發於上焦者宜清涼之結於藏府者宜瀉滌之陰虛內熱者宜滋補腎水以攝伏之斯治之要也。

潔古曰有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏內實爲陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱

可水濕折之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以藏氣目之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽盛相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱

熱故苦者以治五藏。五藏屬陰而居於內。辛者以治六府六府屬陽而在於外。故曰內者下之外者發之。

又宜養血益陰。身熱自除。以脉言之。浮數爲外熱。沉數爲內熱。浮大有力爲外熱。沉

熱沈大有

力爲內熱。○暴熱者病在心肺。積熱者病在腎肝。暴

熱者宜局方雄黃解毒丸。積熱者宜局方妙香丸。暴

者上喘也。病在心肺謂之高喘。宜木香金鈴子散。上

焦熱而煩者宜牛黃散。有病久憔悴。發熱盜汗。謂之

五臟齊損。此勞熱骨蒸之病也。瘦弱虛損。煩悶。喘。腸澼

下血皆蒸勞也。治法宜養血益陰。熱能自退。此謂不

在血脈也。日中太甚其證煩心。心痛。掌中熱而噦。以

黃連瀉心湯。導赤散。硃砂安神丸。清涼散之類治之。

微按之皮毛之下則熱。少加力按之則全不熱。是熱

者心主血脉。微按之皮膚之下肌肉之上輕手乃得

不重在輕手重手之間。此熱在肌肉。遇夜尤甚。其證

必怠惰嗜臥。四肢不收。無氣以動。以瀉黃散調胃承

脾熱者輕手捫之不熱。重按至筋骨又不熱。不輕

不重在輕手重手之間。此熱在筋骨間也。輕手捫之則

不熱。是熱在筋骨間也。輕手捫之則不熱。重手加力

按之亦不熱。不輕不重按之而熱。是熱在筋骨之上。

皮毛血脈之下。乃熱在肌肉也。此謂三法。以三黃丸

通治之。細分之則五藏各異矣。肺熱者輕手乃得

微按全無督督然見於皮毛上爲肺主皮毛故也。目

西尤甚。其證必見喘欬。灑淅寒熱。輕者瀉白散重者涼膈散。白虎湯之類治之。及地黃地骨皮散。心熱

者心主血脉。微按之皮膚之下肌肉之上輕手乃得

不重在輕手重手之間。此熱在肌肉。遇夜尤甚。其證

必怠惰嗜臥。四肢不收。無氣以動。以瀉黃散調胃承

脾熱者輕手捫之不熱。重按至筋骨又不熱。不輕

不重在輕手重手之間。此熱在筋骨間也。輕手捫之則

不熱。是熱在筋骨間也。輕手捫之則不熱。重手加力

按之亦不熱。不輕不重按之而熱。是熱在筋骨之上。

皮毛血脈之下。乃熱在肌肉也。此謂三法。以三黃丸

通治之。細分之則五藏各異矣。肺熱者輕手乃得

微按全無督督然見於皮毛上爲肺主皮毛故也。目

濟陽綱目

二十五火熱

六

濟陽綱目

二十五火熱

七

氣湯治實熱用之人參黃芪散。補中益氣湯治中虛

有熱者用之。肝熱者按之肌肉之下。至骨之上。乃

肝之熱。寅卯間尤甚。其脉弦。其病四肢滿悶。便難轉

筋。多怒。多驚。四肢困熱。筋痿不能起於床。瀉青丸。柴

胡飲之類治之。兩手脈弦者。或寅申發者。皆肝熱也。

俱宜用之。腎熱者輕按之不熱。重按之至骨。其熱

蒸手如火。如炙。其人骨蘇蘇然如蟲餌。其骨因熱不

任。亦不能起於床。滋腎丸。六味地黃丸主之。

又曰小兒癰後餘熱不退。瘡不收斂。大便不行。是謂

血燥則當以陰藥治之。因而補之。用清涼飲子通大便而瀉其熱。潔古云涼風至而草木實。夫清涼飲子乃秋風微熱之劑也。此甘寒瀉火也。傷寒表邪入於裏日晡潮熱。大渴引飲。譖語狂燥。不大便是胃實乃可攻之。夫胃氣爲熱所傷。以承氣湯瀉其上實。元氣乃得周流。承氣之名於此具矣。此苦寒瀉熱濕也。今

也。况大熱在上，其大寒必伏於內，溫能退寒，以助地氣，地氣者，在人乃胃之生氣，使真氣旺三也。  
又云能食而熱，口舌乾燥，大便難者，實熱也；以辛苦大寒之劑下之，濶熱補陰，經云陽盛陰虛，下之則愈。脈洪盛而有力者是已，不能食而熱，自汗氣短者，虛熱也；以甘寒之劑濶熱補氣，經云治熱以寒溫而行之，脉虛弱無力者是已。

濟陽綱目 卷二十五 火熱 以苦寒瀉火。非徒無益而反害之。故有大熱脈洪大。服苦寒劑而熱不退者。加石膏。如證退而脈數不退。

洪大而病有加者宜減苦寒加石膏如大便乾可泄者加桔梗食後服之此藥誤用則其害非細用者旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脉數如病退而脉數不退者不治。

又云治熱以寒溫而行之有三皆因大熱在身止用人參黃芪甘草此三味者皆甘溫雖表裏皆熱燥發於內捫之肌熱於外能和之汗自出而解矣此溫能除大熱之至理一也。熱極生風乃左遷入地補母以虛其子僕天道右遷順行諸病得天令行而必愈二

丹溪曰人具五行各一其性惟火也心爲君火而又  
有相火者寄乎肝腎二藏之間經所謂二火也諸動  
溢其真水火也

爲火五者之性。感物而動。經所謂五火也。相火易起。

五火相煽則妄動矣。火起於妄變化莫測。無時不有。

煎熬真陰。陰虛則病。陰絕則死。

陰虛火動者難治。

戴氏曰。脉數而無力者是陰虛。

實火可瀉。黃連解毒之類。

虛火可

謂之虛者正氣虛也。

鬱火可

發當看何經。

風寒外束者可發。輕者可降。重則從

其性而升之。凡火盛者不可驟用寒涼。必須溫散。

○火急甚者必緩之。生甘草兼瀉兼緩。參术亦可。

人壯氣實。火盛頗狂者可用正治或硝水米水與之。

濟陽綱目

卷二十五

火熱

十

虛火盛狂者以生姜湯與之。若投冰水正治立死。

補陰則火自降。炒黃藥、生地黃之類。氣有餘便是

火。煩躁者氣隨火升也。氣從左邊起者肝火也。左

金丸治之。氣從腑中起者陰火也。大補丸治之。

氣從脚下起入腹者虛之極也。蓋火起九泉之下。此

病十不救。一治法以附子末盦湯泉穴。以四物湯加

降火藥服之。飲酒人發熱者難治。不飲酒人因酒

發熱者亦難治。輕手按之熱甚。重手按之不甚。此

熱在肌表。宜清之地骨皮麥門冬竹茹之類。

重

手按之熱甚而烙手。輕手按之不覺熱。此病在肌肉。之內宜發之。東垣升陽散火湯。火鬱湯之類。手心

熱屬熱鬱。用火鬱湯或用梔子香附白芷半夏川芎

麴糊丸。木通下行瀉小腸火。人中白瀉肝火。

黃芩黃連以猪膽汁拌炒。能瀉肝膽之火。黃柏加

細辛瀉膀胱之火。青黛能瀉五藏之鬱火。元參

能瀉無根之遊火。小便降火極速。山梔子能降火

從小便中泄去。其性能屈曲下行。人所不知。

丹溪活套云。凡去上焦濕熱須酒洗黃芩。以瀉肺火。

濟陽綱目

卷二十五

火熱

十一

如肺有實熱。宜用如虛熱而用黃芩。則傷肺氣。須先用天門冬。保定肺氣然後用之。如去中焦濕熱與

痛須用黃連以瀉心火。若中焦有實熱。宜用若脾胃

氣虛不得轉運。及中焦有鬱熱者。當用白茯苓白朮

黃芩葛根代之。如胸中煩熱。須用梔子實熱者切

當。若虛煩。須用補藥爲主。人參白朮黃芩芍藥茯苓

麥門冬大棗之類。下焦有濕熱腫痛併膀胱有火

邪者。須用酒洗防已。草龍膽黃柏知母之類。固是提

藥。若肥白人氣虛者。宜用白朮芍藥南星滑石茯苓

之類。如黑瘦之人，下焦有濕熱腫痛者，必用當歸。

紅花桃仁、牛膝、枳榔等藥。柴胡瀉肝火須用片芩

佐之。片芩又能瀉肺火，須用桑白皮佐之。若歸尾者

能瀉大腸之火。黃連瀉心火，若用猪膽汁拌炒，更

以草龍膽佐之，大能瀉膽中之火。白芍藥瀉脾火，

若冬月用，必以酒浸炒，蓋其性之酸寒也。知母黃

柏瀉腎火，又瀉膀胱之火。梔子瀉三焦之火，在上

中二焦，用皮殼在下焦，須去殼，水洗去黃漿，炒焦色

研細用之。人中白非獨瀉肝火，又能瀉三焦火及

膀胱之火，便小便中出。蓋膀胱乃此物之故道也。

李氏曰：火病死人甚暴，變化無常，一動便傷元氣，偏

勝，遺害他經，內經病機十九條，而屬火者五。劉河間

推廣五運爲病，屬肝者諸風之火，屬脾胃者諸濕痰

火，屬心肺者諸熱實火，屬腎者諸虛之火，散於各經

浮遊之火，入氣分無根之火，入血分消陰伏火，故曰

諸病尋疫，火疫火生異證。火因內外須分虛實，外

因邪鬱經絡，積熱藏府，此爲有餘之火，內因飲食情

慾氣盛，似火此爲有餘中不足，陰虛火動乃不足之

火，大要以脉弦數無力爲虛火，實大有力爲實火，自

實火內外皆熱，口渴日夜潮熱，大小便閉，虛火潮熱

有間日燥不渴。實火因外感邪鬱在表者，丸味羌

活湯半表半裏。小柴胡湯入裏，大承氣湯燥渴，白虎

湯因金石炙燙者，黃連解毒湯防風當歸飲，三黃丸

大金花丸，狂者黑奴丸。虛火氣虛火盛，因勞倦傷

胃無力，身熱宜保元湯，補中益氣湯加芍藥黃柏或

四君子湯，滲之如大病及吐瀉後，身熱如焚，命門脈

脫爲陽衰之病，宜以辛熱溫養其火，則熱自退，附子

濟陽綱目 卷二十五 火熱

濟陽綱目 卷二十五 火熱

理中湯霑瘡散主之。血虛火動，因傷色慾，午後發

熱，宜四物湯滋陰降火，湯加味逍遙散，腎氣丸，人中

白散，若腎水受傷，生地黃元參煎膏主之。相火旺甚

氣從臍下起者，正氣湯坎離丸，如氣從湧泉穴起入

腹者，虛極難治，四物湯加白馬脛骨降陰火以代夢

連，或人中黃亦好，外用附子末津調塗足心，亦有濕

熱鬱者，飲食鬱火，因內傷生冷及飲食不化，抑遏

陽氣於脾土，四肢熱如燒，以升散之劑發之。升陽散

火湯，火鬱湯，瀉陰火升陽湯，七情五志火起宣隨

各經調之。大怒火起於肝。則手掉目眩。清肝湯加龍膽草。古茱通丸。醉飽火起於胃。則痞塞脹滿。瀉黃散。戊己丸。單石膏丸。悲哀火起於肺。則氣促。志鬱。瀉白散。加黃芩。葶苈。單黃芩丸。單苦參丸。房勞火起於腎。則骨蒸潮熱。大補陰丸。滋腎丸。單黃柏丸。心火輕則煩熱。痛痒。單瀉心湯。重則自焚面青。發燥脈絕。暴死。故曰。五志之火。動極不治。總論虛火可補。實火可瀉。輕者可降重者從其性而升之。君火正治。可以濕伏。可以水滅。可以直折。相火反治。不可以水濕折。惟

濟陽綱目

卷二十五 火熱

十四

從其性而伏之。卽如實火發狂。宜三黃硝黃正治。虛火發狂。先與姜湯。然後補陰。其火自降。凡火盛不可猛用涼藥。必酒炒過或兼溫散。甘緩又有可發汗者。風寒生冷鬱也。五行惟火有二。心爲君火。一身之主。腎爲相火。遊行於身。常寄肝膽胞絡三焦之間。又膀胱爲民火。亦屬於腎。此皆天賦不可無者。若五志之火。則由於人。是以內傷火多。外感火少。噫火不妄動。動由於心靜之一字。其心中之水乎。

又曰。三焦積熱。須審虛實。實熱因日服金石灸燄。夜

臥熱炕。或火烘衣被。久則蘊積熱毒。在上焦。則咽乾口燥而臭。舌糜唇瘡。在中焦。則胸滿。乾嘔作渴。在藏府。則大小便閉。法當清心解毒。上熱涼膈散。中熱調

胃承氣湯。下熱八正散。三焦俱熱。三黃湯。大金花丸。○虛熱因燥。燉腎水。相火炎上。口燥煩渴。精神短少。心悸自汗。懶於動作。夜臥睡語。法當降火滋水。三補丸主之。或只清之潤之而已。熱分各經。心熱。單瀉心湯。肝熱。瀉清丸。脾熱。瀉黃散。肺熱。瀉白散。腎熱。滋腎丸。小腸熱導赤散。胃熱。瀉胃湯。大腸熱瀉白湯。膀胱熱。加味石膏湯。然諸熱皆屬於心熱甚。則能傷陰。宜硃砂安神丸。以清鎮之。熱分氣血。氣分實熱。白虎湯。或敗毒散。加荆芥。青皮。白朮。血分實熱。四順。清涼飲。氣血俱實熱。洗心散。甘露飲。澤瀉湯。氣分虛熱。清心蓮子飲。甚者龍腦雞蘇丸。久者宜升陽以散之。小柴胡湯。合四君子湯。升陽益胃湯。補中益氣湯。或疑補中益氣。何以治熱。殊不知熱因熱用。溫能除熱之理。蓋大熱在上。大寒必伏於內。溫能退寒。以助地氣。地氣者。在人乃胃之生氣。使真氣旺而邪熱自

濟陽綱目

卷二十五 火熱

十五

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

退。血分虛熱，四物湯加芩連山梔或爲丸服，久則

滋陰以降之。秦艽扶羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯

蒸熱者加味逍遙散、坎離丸。氣血俱虛升陽滋陰

兼用十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛

熱久必脾胃不合三白湯參芩白朮散調之。風熱

風甚生熱者兼治風熱或熱甚生風者治其熱而風

自消凡頭目腫痛、眩暈眼昏、目赤耳聾鼻塞口燥、舌

乾、牙宣、牙腫、斑疹之類皆風熱爻上之所爲也。初起

上攻者川芎茶調散至寶丹、四神丹上清丸久而下

濟陽綱目

卷二十五 火熱

去

注血衰者腎氣尤加知母黃柏或當歸龍鬚丸、四生

散、瘦熱者因疫生熱因熱生疫凡咽痛喉閉、膈噎

胸痞、顛狂驚悸、怔忡健忘之類皆疫火滯中之所爲

也小調中湯、大調中湯。濕熱者因濕生熱或因熱

生濕凡泄瀉下痢、水腫、鼓脹、黃疸、遺精、白濁、疝痛、腰

痛脚氣之類皆濕熱下流之所爲也。治見各條丹溪

治濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代之中焦黃連、虛

者白朮茯苓葛根代之下焦草龍膽防已、黃柏虛者

肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝枳榔桃仁紅花經曰

治病必求其本此風熱疫熱濕熱乃百病之根本也。吳氏曰水火人身之陰陽也陽常有餘故火證恒多所謂一水不勝五火是也人能攝理其火致之冲和則調元之手矣或者寒涼太過斯又弊焉自有五行

來不可以無火故知減盛之爲非學者慎之。蔭按

葉氏曰陰虛火動之說自丹溪始發厥功大矣夫陰

虛者腎水之虛也火動者相火因水衰而上炎也水

衰火旺榮血日損故用四物湯加黃柏知母補其陰

以降其火此治法之善者也但黃柏知母苦寒之藥

濟陽綱目

卷二十五 火熱

七

脾胃虛者非其所宜予每見得此病服此藥者反致下泄飲食不進正謂氣虛不能勝苦寒而爲所傷也

五藏以胃氣爲本胃既受傷而求腎陰之長必不可

得矣故用黃柏知母者又當視脾胃虛實而加損焉

余昔居家時曾患虛症服此二劑遂致大瘳余亦謂云云

虞氏曰丹溪謂火從脚下起入腹者爲虛極言猶有

未悉者如果勞怯陰虛之人有此固當作陰虛治若壯實之人有此則是濕鬱成熱之候也愚嘗冒兩徒行衣濕得此證以蒼朮黃柏加牛膝防已等藥作丸

服之而愈後累醫諸人皆驗若誤作陰虛治卽成痿  
證劇矣。

統旨曰或問火熱之名有辨否曰內經先哲論火者  
專指五藏所出而言其曰君火相火之類是也論熱  
者兼藏之所出及外感而言其曰諸熱皆慤及諸病  
論之類是也較二子立名之義則火似甚於熱據昔  
人立言之義則熱反兼乎火要知熱卽火也火卽熱  
也其治一而已矣。

脈法

濟陽綱目

卷二十五 火熱

六

脉浮而洪數爲虛火。脉沉而實大爲實火。洪數  
見於左寸爲心火見於右寸爲肺火見於左關爲肝  
火見於右關爲脾火。兩尺爲腎經命門之火。男子  
兩尺洪大必主遺精陰火盛也。病熱有火者可治  
脉洪是也無火者難治沉細是也。

脈理提綱曰火脉洪數虛則浮。

○治三焦實火方一

黃連解毒湯一

治熱毒躁亂煩渴。苦熱內甚

等證此所謂實火宣瀉。

黃連 黃芩 黃柏 山梔子各等分

右㕮咀每服五錢煎服。一方加連翹芍藥柴

胡

涼膈散二

治藏府積熱。口舌生瘡。疫實不利。

煩燥多渴腸胃秘滯便溺不利。

連翹四錢

大黃

朴硝

甘草各二錢

薄荷

黃芩

梔子各一錢

右剉加竹葉七片水煎去粗入蜜少許。食後服

加姜煎亦得。加黃連五分名清心湯。減大黃

濟陽綱目

卷二十五 火熱

九

芒硝加桔梗甘草人參防風治胸膈中與六經

之熱。抑手足少陽之氣。俱下膈絡胸中三焦之

氣同相火遊與身之表膈與六經乃至高之分

此藥浮載亦至高之劑故施於無形之中隨高

而走。去胸膈中及六經之熱也。如肺經邪熱

咳嗽有痰加半夏。涼膈與四物湯各半服能

益血洩熱名雙和散。錢氏去連翹加藿香石

膏爲瀉黃散。

既濟解毒湯三

治上熱頭目赤腫而痛腹中

積滯胸滿困臥。大便微秘。

大黃酒

黃連炒

黃芩酒

甘草炙

桔梗

柴胡升麻連翹歸身錢

右剉水煎食後服。

本事方四

治大人小兒五藏積熱煩燥多渴唇裂喉閉目赤鼻頸結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譖語大小便閉一切風壅並皆治之。

大黃芒硝連翹薄荷葉乾葛各二

山梔子赤芍藥甘草各一

兩

濟陽綱目

卷二十五火熱

辛

右爲散每服二錢水一盞入竹葉七片蜜三匙

同煎至七分去粗食後服唯陽明證傷寒忌下

又方五

白朮荆芥赤芍藥各三

兩

大黃車前子

木通當歸甘草各二

兩

右爲細末如大便秘結米泔調三錢空心服

○如上膈壅熱或生赤丹或生癰癧用水二盞

煎六分如小便結如淋狀用蘆根打碎洗淨

煎湯下如五心煩熱用生姜一片同煎服

黃芩湯大

治心肺蘊熱口瘡咽痛脣悶小便

淋濁不利。

黃芩黃連

梔子仁澤鴻

木通生地黃

麥門冬甘草分

各等

右咬咀每服一兩加生姜五片水煎食前溫服

三因平胃散七

治胃經實熱口乾舌裂大小

便秘澀及熱病後餘熱不除畜於胃中四肢發熱

口渴無汗。

芍藥兩

厚朴射干

米糊升麻

茯苓各半

濟陽綱目

卷二十五火熱

主

枳殼炒

大黃蒸

甘草炙各一

右咬咀每服四錢水煎空心服。

梔子仁湯八

治發熱潮熱發狂煩躁面赤咽

痛

梔子仁赤芍藥大青

知母各五

柴胡錢

升麻黃芩石膏

生甘草各一

杏仁

分升麻豆豉各二

半

粒五十

右剉水煎溫服。

三黃丸九

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥

小便赤澁。大便秘結。

黃連 黃芩 大黃

煨各等分

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服四十九。食後白湯下。如作湯。每服四錢。水煎服。加黃柏水名大金花丸。

三補丸

黃芩 黃連 大黃

煨各等分

右爲細末。新汲水丸服。

大金花丸

十一 治三焦積熱。心火炎上。口舌生

濟陽綱目

卷二十五

火熱

主

瘡。咽喉腫痛。大使祕結。小便赤澁。

黃連 黃柏

黃芩 大黃各等分

右爲末。滴水爲丸。如桐子大。每服三十五丸。食

遠茶水任下。自利去大黃。加梔子。名梔子金

花丸。

加味金花丸

十二 此藥退煩熱。止嗽化痰。清頭

目。進飲食。

黃連

炒炒

黃芩

炒

黃柏

炒

山梔子

各一

大黃

煨

人參 半夏

桔梗

各半兩

右爲末。水丸如桐子大。每服三十九。食後茶清

下。

三黃解毒丸

十三

治內外諸邪熱毒癰腫瘡疽

筋脉拘攣。咬牙驚悸。一切熱毒並五淋。便濁痔漏。

黑牽牛

滑石各四兩

大黃 黃芩

黃連

梔子

各二兩

右爲末。滴水丸如桐子大。每服三四十九。溫水

下。

四生丸

十四

治一切熱癥。諸熱證皆可服。

濟陽綱目

火熱

卷二十五

火熱

主

大黃 牽牛 皂角

各一兩

朴硝

半兩

右爲末。滴水丸如桐子大。每服三十九。食後白

湯下。

神芎丸

十五

治三焦積熱。風疫壅滯頭目赤腫

或生瘡癩。咽喉不利。或腸胃結燥。小便赤澁。大便

閉塞。一切熱證。並宜服之。

大黃

生

黃芩

各二兩

牽牛

生

滑石

各四兩

右爲末。滴水丸如桐子大。每服五十丸。溫水下。

食後服

碧雪丹十六 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 石膏各研末水漂 寒水石 朴硝

滑石 甘草煎湯二升 馬牙硝各等分

右將甘草湯入諸藥末再煎用柳木篦不住手

攬令消溶入青黛和勻傾砂盆內候冷結成霜

研爲末每用少許噙化津嚥如喉閉不能嚥用

竹筒吹入喉中

元明粉十七 此藥大治邪熱所干膈上氣滯藏

濟陽綱目二十五火熱

舌

府秘瀉並宜服之。

以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天

明自然結成青白塊子用砂罐子接實於炭火內

從慢至緊自然成沛煎沸直候不響再加頂火一

蝦便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒

然後研爲細末每二斤入甘草生熟二兩爲末攢

勻臨睡酌量用之或一錢二錢以桃花煎湯或熬

白湯下

木香金鈴散十八 治暴熱心肺上喘不已

大黃五錢 金鈴子去核 木香各三錢 朴硝二錢

輕粉少許

右爲末柳白皮煎湯調下三四錢食後服以利

大黃散十九 治上焦熱而煩不能睡臥

山梔 大黃 麥金各半兩 甘草二錢

右爲末每服五錢水煎溫服微利則已

益元散

治六府有實火上有煩渴下有便

秘赤瀉者此方主之。

濟陽綱目

卷二十五火熱

垂

滑石六兩

甘草一兩

右爲末蜜水調下三錢。

珍珠散二十一 治男婦小兒五藏積熱心胸悶亂

口乾舌燥精神恍惚顛狂等證

琥珀 珍珠粉 鐵粉 天花粉 砂砂 牙硝

寒水石 大黃酒浸 生甘草各等分

右爲末每服三錢用薄荷湯調下

紫雪二十二 治腳氣毒遍內外煩熱不解口中生

瘡狂陽叫走癲毒及解諸熱藥毒卒黃等毒並蠭

魅野道熱毒。又治小兒驚瘧熱病。丹溪云此心脾肝腎胃經之藥

寒水石 石膏 磁石 滑石已上四味各三斤搗爲細末用一石瓶至五斗

去粗入後藥 元參一斤洗搗爲細末用一石瓶至五斗

犀角 青木香 升麻各五兩

丁香 甘草八兩已上

六味湯搗爲末入前藥汁中再煮取好者二斤已上二味入前藥汁中微火煎不住手用柳木棍攪候七八升許投在盆內半日後方熾方入下項

辰砂三兩細研

麝香真者一兩炒已上二味入前藥汁中拌調令勻

取一斗五升去粗入下項二味藥

朴硝 硝石

方入下項二味藥搗爲細末用一石瓶至五斗

調令勻

濟陽綱目

卷二十五火熱

炙

服大人小兒子細加減。

噙化三黃丸二十三

大黃 黃芩 黃連各二兩半黃藥子 白藥子各半

黃藥 苦參 山豆根 破砂各二兩半

錢 片腦一錢半麝香許

右爲細末。用猪膽汁調勻，攤在盤內，甌上蒸三次，露一宿，後入腦麝砂爲丸，如豆大。每服一丸，食後噙化。○冬加知母。一方有甘草。

牛黃涼膈丸二十四 治上焦壅熱，口乾咽痛，煩躁。

涎潮。

牛黃 片腦 麝香各二錢

牛膽南星七錢

馬牙硝

寒水石煅

硬石膏 甘草炙各一兩

右爲細末，煉蜜丸，每兩作四十九，食後薄荷人

清心丸二十五 治經絡中火邪夢遺，心忪恍惚，口瘡，咽喉燥。

黃柏生三兩

龍腦三錢

濟陽綱目

卷二十五火熱

炙

右爲末，蜜丸，桐子大。每服十九，臨臥前，麥門冬湯下。

全真丹二十六

治藏府積熱，洗滌腸垢，潤利燥澀。

解風毒攻注，足浮腫或頑痺不仁，瘦涎不利，涕唾稠粘，胸膈痞塞，臍腹脹滿，飲食減退，困倦無力。

川大黃三兩用米泔水浸三日換

黑牽牛八兩慢火炒四兩生用四兩

同取頭末四兩

右以皂角一兩，輕炒去皮子，水一大碗，浸一宿。

入蘿蔔一兩，切作片子，同皂角一處，熬至半碗。