

卷貳

165 傳本

分五糯米振

水一鍾半煎七分。食遠服。但覺有孕。三五日常用一服。四月之夜。左無胎。右如環。五左有胎。右無胎。即服過七月之後方妙。徐東臯曰。婦人凡懷胎二三個月。慎要預養。名曰小產。此由血氣兩弱。臟府火多。血分受熱。而然。醫家又謂安胎。宜用艾附。陸仁補丸。增補。而產去墮矣。殊不知血氣清和。無火煎燥。則胎自安。而固氣虛則提不住。血熱則溢妄行。欲其不墮。得乎。香附雖云快氣開鬱。多用則損正氣。砂仁快脾氣。多用亦耗正氣。況香燥之品。性傷氣血。求以安胎。適又損胎。而反墮也。今惟泰山磐石散。千金保孕丸。二方。能奪化工之妙。百發百效。萬無一失。故表出以為好生君子共知也。

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後。或經惱怒。或行走失足。跌損傷胎。腹痛腰脹。一服即安。雖然見血一二日。未離宮者。加一劑自安。倘先三四五月內。已經半產過者。將及前月分畧覺腰骨痠脹。忙服一劑即安。萬全秘傳驗多人。

當歸酒 洗白木 炒土條 炒酒炒各 熟地 汁再浸 白芍 炒 杜仲 鹽水炒 阿膠 焙粉炒 茯苓 嫩黃耆 炙

酒水各一碗煎八分空心服 如急痛將銅鍋煎一鍾即服立止 胸前作脹如紫蘇陳皮

各六 白帶或紅多加蒲黃炒阿膠炒地榆錢 一艾葉分見紅加製續斷錢糯米一百

鳳衣散 治三五月小產

用頭生雞子抱出小雞之蛋殼陰陽瓦焙黃研末如前次小產在何月分至時預先以無灰酒

衝服可免小產

芋根湯 治孕婦受胎數日後胎動漏胎及子懸證

野芋藤根孕一月用一寸加金銀煎湯服之立安 膠艾安胎散 治孕婦頻撲動胎下血不止

人參 條苓 阿膠始粉炒成 白朮一錢五錢 當歸酒熟地各二 川芎 艾葉各八 陳皮 紫蘇

炙草各四

薑一片 大棗二枚 水煎服

增損八物湯 治妊娠漏胎氣血兩虛胎中有熱下元不固者

人參 白朮炒歸身洗 白芍 熟地 艾葉 條苓 黃柏 知母 阿膠蒲黃炒成珠 炙草去蒲黃不用

各等分

薑棗引水煎食遠服兼用杜仲丸

止漏絕神丹 治胎漏下血安胎更妙

白朮五錢炒熟地兩三七根末

水煎服此方妙在三七末乃止血神品故用之奏效

千金保孕丸 見本卷安胎門附杜仲丸下

生化湯 見下卷生化湯論後

諸痛論 附孕婦

妊娠頭痛多因血虛有火用四物宜加減若宿有偏正頭風宜川芎茶調散若外感頭痛加味

芎歸湯

妊娠心腹痛或宿有冷痞痰飲結聚或新觸風寒邪正相擊並於氣隨氣上下上衝於心則病

心痛下繫於腹則病腹痛痛不已則胎動不安如傷心真心痛則旦發夕死夕發旦死如傷心

支絡則乍安乍作醫通用正氣散加減曾生治心痛用定痛延胡散醫通又曰胸腹膨滿按之

而痛乃飲食停滯用人參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君補之腹中滿痛又心不得飲

食千金芩朮芍藥湯如不時腹痛名曰胎痛有血虛有氣滯一因然血虛居多用熟地三錢 當

歸一錢煎湯治之。不應加參朮陳皮。丹溪用四物去川芎。倍加熟地。醫通用四物加香附為末。紫蘇湯下。若氣滯者。紫蘇飲治之。若痛而重墜。因中氣虛陷。用補中益氣湯。

如胃口痛。多因脾虛存食不消。宜養胃消食。綱目用平胃散加枳殼山查。予謂平胃散恐致損胎。非所宜也。宜養胃湯加減。

妊娠脇痛。有因哭泣。因內傷。因惱怒。不宜破氣。宜用童便和酒服之。或紫蘇飲去參用白芍當歸。加砂仁童便。

妊娠臍下冷痛。腹脹虛疼。小便頻數。大便虛滑。皆食生冷所致。小建中加炮薑木香。不應更加茴香良薑。

妊娠少腹痛。虛熱紫蘇飲。虛寒膠艾湯。若小腹近下處腫脹浮薄發光者。孕癰也。千金托裏散。或薏苡仁煎汁飲。若心腹急痛。煩悶面青。冷汗氣絕。血下不止。其胎上衝者。不可治也。

妊娠腰痛。有腎虛作痛。則脉大而痛不已。急服八珍加膠艾黃耆。或紫蘇飲加減。有勞力任重。致傷胞繫。欲脫。宜安胎飲加杜續。有房事不節。致傷胞繫。用熟地當歸阿膠砂仁竹茹炙草。調

男子視當灰錢一服。禁房事百日。要緊。有濕熱脉緩。遇天陰。或久坐而痛。多下白物。二妙散加柴

胡防風茯苓半夏。有寒濕腰重。如帶物而冷者。用紫蘇飲加減。易健脾溫燥藥。有氣血凝滯脉

澇。而日輕夜重。不得卧。遍身拘急。不舒而痛。眼生黑花。紫蘇飲加枳殼桔梗。有膀胱風邪。頸項

強直。用獨活寄生湯。有閃到脉實。膠艾湯。或佛手散。或熟地黑糖。衝童便酒調服。有因毒藥者。宜阿膠散。或捷徑方。或三物解毒湯。選用有走注痛敗血入經之證。四烏湯。加薄桂杜續。有臨產腰痛如脫腎者。乃將產也。勿作尋常腰痛論。產下即平復矣。不必用藥治也。妊娠背脊痛。氣滯也。紫蘇飲治之。

妊娠腰腹及背痛。夫腎主腰。勞損經虛。風冷乘之。則腰痛。乘虛入腹。則腹痛。故腰腹相引而痛。

痛不止恐墜胎。又有勞傷腰腹背痛。補中益氣。加杜續。然多有因病淋證而痛者。宜體察之。止用加味導赤湯。治淋。淋止痛除。如勞傷元氣。八珍加杜仲。砂仁。膠艾。如脾腎不足。再加白朮。補骨脂。如傷外邪。獨活寄生湯。若氣血鬱滯。紫蘇飲。加枳桔。如肝虛有火。小柴胡。加白朮。枳殼。山梔。如肝脾鬱結。歸脾湯。加柴胡。枳殼。

妊娠環跳穴痛。屬腎虛。宜六味地黃湯。加杜續。或千金保孕丸。

妊娠目赤痛。咽喉痛。口鼻唇舌瘡痛。俱用涼膈散。加減。

妊娠負重跌撲。凝血作痛。欲服活血藥。則恐傷胎。不服。則所傷之血留而不去。治之者。當先辨胎之死生。如無別證。只用黑糖熬枯。入陳酒。重便調服。細嚼連皮胡桃過口。死者當下。生者其痛即止。若因怒跌撲。或手足抽搐者。紫蘇飲。加鈎藤。鈎。倘去血過多。八珍湯。去茯苓。加阿膠。艾

葉。黃耆。如跌撲餘傷未盡。痛未止。用四烏湯。加延胡。木香。如傷去而胎氣未安。紫蘇飲。加重便

砂仁。如傷重者。香殼散。加熟地。當歸。以護胎。若勢劇者。下瘀血湯。加芎歸。酒煎。以去血。則胎自

安。此藥峻厲。必須詳慎。若昏睡語言如狂。此血迫心。胞。當歸活血湯。如腹中重墜。按之冰冷。此

胎氣已傷。急用香桂散。加酒。大黃。生附子。下之。若口中覺穢氣者。急用平胃散。加芒硝。下逐之。

予謂下胎。莫妙佛手散。即香桂散。亦能下胎。又何用大黃。附子。以助之。然已上四烏香殼下瘀

當歸活血。香桂。平胃等方。皆不可輕用。稍可得已。只用熬枯黑糖。酒便調服。為妥。或嚼連皮胡

桃。助之。諸方錄後。以備參考可耳。慎勿輕視。佛手。香桂。而妄用。猛峻傷生。

妊娠遍身痛。或衝心欲死。不能飲食。緣胎有水。致痛也。用白朮。錢五。黃芩。錢二。白芍。錢四。入活鯉魚。約

重半觔。外一尾。煮湯。代水煎服。此即胎水證。當入本門。因有遍身痛證。故移錄於此。以備採取。

治痛也。

川芎茶調散 治久風化火頭痛。及偏正頭風。

川芎 白芷 羌活 防風 荊芥 薄荷 炙草各一兩 香附二兩

為散。食後清茶調服二錢。日三服。婦人產後豆淋酒服。輕者三服。重者五七服。效。

加味芎歸湯 因虛外感頭痛服此

川芎 當歸各一錢 條芩酒炒 白朮土炒 細芽茶二錢

水煎。食後服。

藿香正氣散 治孕婦心腹痛。多寒多食。加減用之。

白朮土炒 厚朴去皮薑汁製 陳皮去白 藿香 紫蘇 半夏製 茯苓 白芷 桔梗 炙草 大腹皮方

無大腹皮有蒼朮

薑棗引水煎服。寒加木香炮薑。食積發熱加苓連炮薑。氣加砂仁香附。痰加橘紅

生薑。

尊生定痛延胡散

延胡醋炒 乳香分五 歸身 炙草各一錢

水煎加鹽酒一滴。

人參養胃湯 治食滯痞滿。

人參 蒼朮米泔水浸去皮 陳皮去白 藿香 半夏製 厚朴去皮薑汁炒 茯苓 草果 炙草

薑棗烏梅引水煎服。

六君子湯 治胃虛少食。痰嗽嘔泄。

人參 白朮土炒 茯苓 橘皮 半夏製 炙草

生薑引水煎服。

千金苓朮芍藥湯 治妊娠腹中滿痛。叉手不得飲食。

白朮

六錢 土炒 黃芩 二錢 白芍 四錢

右三味水煎分三服。半日令盡。微下水則易產。日飲一劑為善。

補中益氣湯

治煩勞內傷。脉洪大而虛喘渴。陽虛自汗。懶言惡食。氣虛不能攝血。一切

清陽下陷。中氣不足之證。

人參

錢一 黃耆 一錢 五 白朮 土炒 陳皮

當歸 各五 升麻

柴胡 各三 炙草 八

加薑三片。棗二枚。水煎服。

平胃散治胃中宿食不化。藜藿之人宜之。

蒼朮

四兩 米泔水浸去厚朴 去皮薑 陳皮 水炮 炙草 各三

右四味為散。每服四五錢。加生薑三片。水煎溫服。

膠艾湯

治婦人漏下。或半產後下血不絕。或妊娠下血腹痛。亦治損傷衝任。月水過多。

淋漓不斷。

乾地黃

錢二 芍藥 一錢 五分 阿膠 蒲黃 炒 艾葉 當歸 各一 川芎 甘草 各八

水煎服。

千金托裏散

治氣血虛寒。潰瘍不收。

人參

黃耆 炙 川芎 當歸 肉桂 白芷 防風 桔梗 白芍 天冬 去連翹 忍冬

炙草 生薑引。水煎服。

二妙散

治身半已下濕熱。痰重而腫。

厚黃柏

薑汁製 蒼朮 茅山者佳 去皮切 片麻油拌炒黃色

等分。為散。薑汁調。每日空心溫酒送一錢。

獨活寄生湯 治風痺腰脚疼重。並治產後腹痛。不得轉動。及腰脚攣痛。不得屈伸。痺弱者宜服。此湯去細辛。治產後足膝腫或痛。

人參 歸身 白芍 川芎 熟地 桑寄生 杜仲炒斷 牛膝蒸 細辛 秦艽 茯苓

桂心 防風各六分 獨活九分 甘草三分

生薑煎服。古今錄驗無寄生。有續斷。因續斷亦可代寄生。肘後無寄生。人參甘草當歸。有附子。

八珍湯 氣血雙補之藥。

人參 白朮炒 茯苓 熟地 歸身酒洗 川芎 白芍炒 炙草

水煎服。

膠艾芎歸湯 治妊娠二三月上。至八九月。頓撲跌傷。胎動不安。腰腹疼痛欲死。已有所下。

阿膠蛤粉或蒲黃炒珠 川芎 當歸 乾地黄 艾葉

水煎服 一方有甘草無地黄。

佛手散 一名芎歸湯 治妊娠因事築磕。胎動不安。或子死腹中。惡露不下。疼痛不已。用此藥探之。若不損則痛止。子母俱安。若胎損立下。此方催生甚妙。

當歸三錢或五錢 川芎二錢

先用酒一鍾煎乾。再入水一鍾。煎二三沸溫服。若用下胎。當為末以酒調服。丹溪治胎死不下。並催生。用當歸兩 川芎錢七 酒水煎服。

阿膠散 治妊娠或因傾仆。或因毒藥胎動不安。腰腹疼痛。或有所下。

阿膠蛤粉炒 艾葉炒 歸身酒洗 川芎 白芍 熟地 黃耆蜜炙 炙草

生薑五片。棗三枚。水煎空心服。

捷徑方 又名曰扁豆散 治妊娠誤服諸般毒藥毒物。及用毒藥攻胎。藥毒衝心。外證牙關

緊急。口不能言。兩手強直。握拳頭低。自汗身微熱。外證與中風相似。但其脉浮而軟。十死一生。醫多不識。若作中風治。必死無疑。

白扁豆 二兩生用去皮

為細末。新汲水調下。即效。或米飲調服。或濃煎服亦可。

三物解毒湯 治誤服毒藥動胎

甘草 黑豆 淡竹葉 各等分

用水煎濃服

四烏湯 治血中氣滯。小腹急痛。

熟地 當歸 酒洗各八錢 川芎 白芍 各一錢 烏藥 香附 各六分 炙草 五分

水煎服

加味導赤湯 治孕婦小便少。又滋痛者。謂之子淋。又治溺血。

人參 生地 條芩 木通 甘草梢 麥冬 心赤芍 各一錢 淡竹葉 十五片

燈心 四十九寸。水煎空心服。

小柴胡湯 治少陽受邪。往來寒熱。脉弦脇痛而嘔。

柴胡 三錢 黃芩 人參 炙草 各一錢 半夏 二錢

生薑五片。大棗四枚。水煎溫服。

六味地黃湯 附六味地黃丸 加味腎氣丸 濟生腎氣丸

熟地 四錢 西丹皮 茯苓 各五分 山黃 淨肉 山藥 各二錢 澤瀉 一錢

水煎服。如作丸用熟地兩丹皮茯苓各三兩山萸山藥各四兩澤瀉一兩古方用三兩加肉桂

兩製附子五錢名桂附八味地黃丸又名金匱腎氣丸一方桂附一兩有用各八錢再加牛膝

車前各一名加味腎氣丸一方肉桂易桂枝蓋因陰氣固結於中勢必分解於外則腎氣

得以流布周身之意耳但僅存其方而世人少有從而易之者予按醫方中又有濟生腎氣

丸治腎氣不化小便瀉數並治產後脚腫或肚腫或成鼓腫乃八味丸本方用茯苓三錢熟地

兩山藥山萸丹皮澤瀉肉桂各一錢附子五錢加牛膝車前各一兩此本金匱腎氣方中諸藥各減

過半惟桂苓二味仍照原方為宣布五陽開發陰邪之品藥更加牛膝車前為太陽厥陰之

嚮導以肝為風木之臟凡走是經之藥性皆上升獨牛膝通津利竅下走至陰車前雖行津

液之腑而不傷犯正氣既用牛膝引入至陰又須桂附蒸動三焦不待決瀆有權膀胱亦得

以化所以倍用肉桂暗藏桂苓丸之妙用愈於五苓十倍矣但方中牛膝滑精精氣不固者

勿用產後精氣本自不固用者審之故雜證小便不通濟生腎氣丸為善也今世人所用腎

氣丸分兩多從此再考後人不分八味加味濟生分兩懸殊統以金匱腎氣名之殊覺混

人今特拈出

東垣涼膈散 孕婦有病熱如目赤口舌瘡之類各隨其證加減用之

黃芩酒炒連翹酒炒山梔仁酒炒連翹酒炒桔梗 生草各等分薄荷葉少許

目赤痛者本方加當歸川芎羌活防風菊花各一錢竹葉引 咽喉痛者本方加牛蒡子一錢

辟 口舌生瘡者只依本方薑引

香殼散 治畜血暴起胸脇小腹作痛

香附薑汁製歸尾各三錢枳殼二錢青皮炒陳皮 烏藥 赤芍 蓬朮醋炒各錢紅花分五生草分三

炙草分二

共為散。每服四錢。童便空心溫服。以核桃黑糖酒助之。如不應。加延胡穿山甲。有外感風寒。加桂枝羌活。

下瘀血湯 治婦人產後腹痛。有乾血著臍下。

大黃 酒浸 桃仁 二十粒 共麝蟲 熱去足

為末。煉蜜為四丸。以酒一升煎一丸。取八合服之。血下如豚肝。

當歸活血湯 治挾瘀如見巢狀。

當歸 三錢 赤芍 酒洗 生地 酒浸別搗爛 桂心 各一錢 桃仁 二十粒 茯苓 枳殼 柴胡 各八分 炮薑 四分 紅花 二分

甘草 五分

右除生地水煎去渣。入地黃再煎數沸。加陳酒服之。不應加穿山甲 五分 又不應。加附子 三分。有實熱難用附子者。須與大黃錢許同用。

小建中湯 見下卷脫汗亡陽門

四物湯

紫蘇飲

安胎飲

千金保孕丸 俱見本卷安胎門

歸脾湯 見本卷胞滿小產門

香桂飲 見本卷子死腹中門

胎產心法卷之上

上谷閣純璽

胎逆上逼脹滿子懸論

妊娠胎逆上逼重則脹滿癢痛謂之子懸。紫蘇飲為必用之藥。蓋因紫蘇飲為治妊娠胎氣不和濁氣舉胎上湊胎熱氣逆心胃脹滿之證。且此證挾氣者居多。宜疎氣舒鬱。非紫蘇腹皮川芎陳皮無以疏氣。非歸芍無以養血。氣血既利而胎自降。然邪之所湊其正必虛。故以人參甘草補之。如飲食不甘加四君子。有熱加苓梔歸芍。內熱晡熱或四君兼逍遙散。若常常多怒時覺脹滿服順氣藥不應宜用和氣安胎飲。或加味道遙散。胎上攻而作痛宜紫蘇飲。或順氣安胎散。若脾虛停滯脹滿安胎飲力薄宜用加參平胃散。有因鬱滯者亦宜紫蘇飲。或加味歸脾湯。有因痰結聚者紫蘇飲加苓連貝母。有因暴怒者左關必弦洪肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔大抵胎氣上逆皆屬火旺急用苓術香附之類不可服大寒之藥反致他變。予每治孕婦心胃脹滿用尊生和氣飲甚效。子懸證有兩尺脉絕餘脉平和不可錯認死胎。且死胎有面青舌青可辨。宜紫蘇飲治之。則胎歸原位。脈消脉起矣。如臨月胎上逼心嘔噦欲死急用童便灌之即下。或烏梅肉十枚研爛入生薑三片煎湯灌之即下。取酸以降斂之。兼辛以散火氣之逆也。又有因坐草太早心懷恐懼氣結不行紫蘇飲一服便產。後附針灸一方備用。

四君子湯

治胃氣虛弱飲食不思倦怠少食

人參一錢至三錢

白朮一錢至二錢

錢土炒黃

茯苓一錢至二錢

炙草六分至一錢

水煎服

逍遙散

附八味道遙散又

治血虛肝燥骨蒸勞熱往來寒熱咳嗽潮熱月經不調口乾

便澀

柴胡 當歸酒 白芍酒

加煨姜薄荷引水煎服

目暗發熱脇痛等證

過勞及多食炒炙宜清勝脫之火

和氣安胎飲

飲

人參 白木土 當歸酒洗各

服衝

薑引煎服 一方無木香有砂仁

之證有因氣慳者加木香

加參平胃散 治孕婦脾氣虛弱

人參 白木土 蒼朮浸末

薑一片水煎服

尊生和氣飲 治孕婦心胃脹滿

人參 蘇梗 白芍酒 川芎各六

水煎服

附針灸方

妊娠六七箇月飲食絕然不進

通藥不能治惟針灸可通

白木土 茯苓各一 炙草五分

一方無茯苓薄荷有茯神生薑為引

加丹皮梔子各七名八味道還散

又名加味道還散治小便帶血或

治孕婦多怒胸中脹滿若用烏藥香附砂仁順氣等藥反加滿悶宜服此

川芎 條芩各八 陳皮 紫蘇 炙草各四

木香磨汁

名順氣安胎散治孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛子懸

飲食停滯以致腹脹嘔吐安胎飲力緩宜用此散

厚朴薑製 陳皮 炙草各四

當歸一錢或六 腹皮五分 木香二分磨

酒洗

炙草分三

腹皮製淨

木香二分磨

炙草分三

腹皮製淨

木香二分磨

炙草分三

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

鬱怒傷肝

血少

本人同身寸。以男左女右。手中指屈回。用草較所屈中指中節內紋兩頭進處截斷為準一寸也。

紫蘇飲見本卷胎門 小柴胡湯見本卷諸痛門 加味歸脾湯見本卷小產門附歸脾湯下

諸血證論

姙娠漏極如同月水。胞乾胎死。母亦難保。其調治之方已詳論於胎漏門中。茲不重論。

姙娠吐血。凡七情內傷。六淫外感。皆足致失血之患。一主火熱者。以氣血擁養胎元。或有所感。

則氣逆而火上乘。心煩滿悶。血隨而溢。甚者或致墮胎。但火有虛實之分。實火清熱養血。虛火

滋陰補水。則血安胎固。若泛用行血清血之劑。胎必墮而禍不旋踵矣。如肝經怒火。加味逍遙

散。膏梁積熱。加味清胃散。鬱結傷脾。加味歸脾湯。肺經有火。黃芩清肺飲。因氣鬱滯。紫蘇飲。氣

不攝。血補中益氣去升麻。加煨葛根。腎經虛火。冬味地黃湯。

鼻衄不止。東垣涼膈散。加當歸生地各一錢。茅花一大。生薑引。

咳嗽咳血。宜涼血地黃湯。醫通云。咳嗽咯衄。胎前皆不宜見。如面赤聲啞不治。又云。凡咯吐血

多致墮胎。胎賴血養。不宜漏溢。宜紫蘇飲。加條芩。

尿血乃熱乘血分。流滲於脬。故令尿血。自尿門而下。若胎漏則自人門下血可辨。宜四物加山

梔。髮灰。或阿膠。熟地。麥冬。五味之類。如怒動肝火。小柴胡加山梔。脾氣下陷。及勞動脾火。補中

益氣。加茯苓。車前。若厚味積熱。加味清胃散。若肝脾血熱。加味逍遙散。

腸風臟毒下血者。平胃散去蒼朮。加槐角。防風。當歸。烏梅。治之。

加味清胃散。治胃中蘊熱。斑疹。口舌生瘡。齒齬腐爛出血。

生地四錢 丹皮五錢 當歸 川連酒 連翹去心 升麻 生草各一錢
為散。分三服。水煎。去滓。銜犀角磨汁。三四分入藥服之。

黃芩清肺飲 治渴而小便不利

梔子炒 黃芩

各等分煎服。予謂此方乃治雜證發渴而小便不利妙在熟服探吐以提。則肺氣立清。然胎前血證探吐之法似非所宜。若服而不吐。不特綿延不能刻應。縱或小瘥。其苦寒之性留薄於內。大傷氣血之氣。治胎前者得不為之預慮乎。

冬味地黃湯附方

熟地四錢 山藥二錢

山萸一錢 分兩加倍

丹皮

茯苓

澤瀉各七

麥冬一錢 或錢半

五味子十粒

水煎服。此方藥味十倍之煉蜜丸。即名冬味地黃丸。又名八仙長壽丸。

涼血地黃湯 治姙娠咳嗽吐血咳血

生地三錢 麥冬去心

當歸酒洗 各錢

黃芩一錢 分五

紫苑

知母鹽水

白朮土炒

天冬去心 各錢

犀角分八 陳皮 甘草各四

水煎服。有喘加瓜簞仁一錢

加味逍遙散見本卷子懸門

加味歸脾湯見本卷胎前下

紫蘇飲

四物湯俱見本卷

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散俱見本草諸痛門

子腫子氣子滿論子滿證即俗呼胎水證也

姙娠子腫與子氣相類。但子氣在下體。子腫在頭面。若子滿證。又名為胎水。則在五六月已後。

比子氣子腫不同。蓋胎大則腹滿遍身浮腫。凡子氣子腫子滿。由臟氣本弱。或因泄瀉下利。耗

傷脾胃。或寒熱瘧疾。煩渴加飲濕漬脾胃。使頭面手足浮腫也。然水漬於胞。兒未成形。則胎多

損壞。故初姙即腫。急宜調治。水去脹消。仍用六君子調補。

所謂子腫者。姙娠面目虛浮多。因脾胃氣虛。或久瀉所致。宜健脾利水。全生白朮散主之。或用

健脾利水湯。如未應用六君子湯。或加腹皮車前。又專治肢體如水氣之證。亦有用加味五皮

湯。治子腫之甚者。

所謂子氣者。姙娠自三月成胎之後。兩足面漸腫至腿膝。或腰以下腫。行步艱難。以致喘悶不

安。飲食不美。似水氣狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能制水。而發腫。肺

金少母氣滋養。而氣促滿悶。諸書名曰子氣。即水氣俗名皺脚。治此病者。先服加味天仙藤散。

如不效。則服茯苓湯。再不效。服補中益氣湯。加茯苓。若飲食失節。嘔吐泄瀉。六君子湯。或加炮

薑木香香附。若脾肺氣滯。加味歸脾湯。佐以加味道遙散。或紫蘇飲。至孕婦八九箇月。脛腿俱

腫。非水氣。比不可以水氣治之。反傷正氣。凡有此者。必易產。因胞臟中水血俱多。不致胎燥也。

所謂子滿者。姙娠至五六箇月。胸腹急脹。腹大異常。或遍身浮腫。胸脇不分。氣逆不安。小便艱

澀。名曰子滿。又為胎水不利。若不早治。生子手足軟短有疾。甚致胎死腹中。宜服千金鯉魚湯。

治其水。如脾虛不運。清濁不分。佐以四君五皮。亦有用東胎飲。以治子滿證甚效。曾有姙娠

腹脹。服鯉魚湯三五劑。大小便皆下惡水。腫消脹去。遂下死胎。此證每因懷孕腹大。終不知胎

水之患。即水漬損胎也。

全生白木散 治妊娠面目虛浮。如水腫脹。

白木一兩 生薑皮大腹皮製淨 茯苓皮陳皮各五錢

共為細末。每服二錢。不拘時米飲調下。此方較澹寮五皮散稍善。中間惟白木易桑皮。而功用懸殊。誠點鐵成金手也。全書云。如未應。佐以人參甘草。

健脾利水湯 治孕婦面目虛浮。多因脾胃氣虛。或久瀉所致。

人參 茯苓各一錢 白木炒土 當歸酒洗各二錢 川芎 大腹皮黑豆水製淨 紫蘇 陳皮各

炙甘草三分

薑皮一片水煎服

加味五皮湯 治孕婦面目身體四肢浮腫者。此胎水泛溢。謂之子腫。白木澹寮五皮散無

後浮腫小便不利

大腹皮黑豆水製淨 桑白皮炒 生薑皮 茯苓用赤 白木炒土 加紫蘇連葉各一錢

棗二枚去核水煎服。服時以木香磨濃汁三匙入藥內。

加味天仙膝散 治孕婦腰脚腫虛人多此證。

天仙膝即青木香藤洗畧炒 製香附 紫蘇各六分 陳皮分四 烏藥五分 木香分四

薑皮三片 虛人加人參錢一 土炒白木錢二 酒洗當歸錢二 或兼服補中益氣湯。

茯苓湯 治孕婦六七箇月以來兩足腫大。行步艱難。脚指間有黃水出。此名子氣。人多

有之。生子之後其腫自消。甚者此湯主之。

白茯苓 白木炒土 陳皮 製香附 烏藥各一錢 紫蘇連葉 炙甘草各五分 木瓜三片

生薑皮引水煎空心服

千金鯉魚湯 治孕婦胸腹脹滿。或遍身浮腫。小便艱澀。名曰子滿。又為胎水不利。或胸