



外科正宗目錄

卷一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陽半陰症歌第五

癰疽五善歌第六

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法并禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆十一

病有三因受病主治不同論十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷二

瘡瘍看法十五

腫瘍治法十六

腫瘍主治方十七

潰瘍治法十八

潰瘍主治方十九

卷三

癰疽圖形二十

癰疽諸名歌二十一

腦疽二十一

卷四

發背二十三

疔瘡二十四

脫疽二十五

卷五

癰癤二十六

鬢疽二十七

卷六

咽喉二十八

時毒二十九

癭瘤三十

肺癰三十一

卷七

流注三十二

乳癰三十三

附骨疽三十四

卷八

腸癰三十五

臟毒三十六

痔瘡三十七

下疳三十八

魚口便毒三十九

卷九

囊癰四十

懸癰四十一

臀癰四十二

楊梅瘡四十三

結毒四十四

多骨疽四十五

陰瘡四十六

卷十

傷寒發頤四十七

痼發四十八

癩疽四十九

小腹癰五十

鵝口疽五十一

龍泉疽虎鬚毒五十二

石榴疽五十三

穿踝疽五十四

大麻風五十五

翻花瘡五十六

腋癰五十七

脅癰五十八

鼻痔五十九

骨槽風六十

紫白癩風六十一

齒病六十二

腦漏六十三

破傷風六十四

跌撲六十五

金瘡六十六

杖瘡六十七

竹木刺六十八

湯潑火燒六十九

甲疽七十

繭脣七十一

痞癰七十二

天蛇毒七十三

頭痛七十四

合谷毒七十五

鼻出血七十六

牙縫出血七十七

血箭血痣七十八

卷十一

鵝掌風七十九

腎囊風八十

疥瘡八十一

癩瘡八十二

血風瘡八十三

頑癬八十四

膿窠瘡八十五

火丹八十六

天泡八十七

肺風粉刺酒戲鼻八十八

雀斑八十九

汗斑九十

油風九十一

白屑風九十二

耳病九十三

漆瘡九十四

瘰癧瘡九十五

疥癩九十六

痰包九十七

癩風九十八

溼腫九十九

女人面生鰲黑斑一百

鈕釦風一百一

枯筋箭一百二

婦人腳丫作癢一百三

手足破裂一百四

眼丹一百五

眼胞菌毒一百六

黑子一百七

體氣一百八

白禿瘡一百九

奶癬一百十

蟾拱頭一百十一

小兒遺毒爛斑一百十二

螻蛄串一百十三
小兒痘風瘡一百十四

小兒赤遊丹一百十五
走馬疳一百十六

重舌一百十七
胎瘤一百十八

鵝口瘡一百十九
痘癰一百二十

痘疔一百二十一
黃水瘡一百二十二

卷十二

大人口破一百二十三
唇風一百二十四

臭田螺一百二十五
牛程躑一百二十六

蟻螂蛙一百二十七
田螺泡一百二十八

皴痛一百二十九

凍風一百三十

陰蝨一百三十一

蒲桃疫一百三十二

咬傷一百三十三

風犬傷一百三十四

惡蟲叮咬一百三十五
百蟲入耳一百三十六

誤吞針鐵骨哽咽喉一百三十七

人面瘡一百三十八
陰毒一百三十九

失榮症一百四十
中砒毒一百四十一

落下頷拏法一百四十二

救自刎斷喉法一百四十三

試知百病死生法一百四十四

造孽報病說一百四十五

仙方活命飲今古不同論一百四十六

拾遺症一百四十七
縑縛背瘡法一百四十八

癰疽內肉不合法一百四十九

煉元明粉法一百五十
煉金頂砒法一百五十一

煉硝石法一百五十二
取蟾酥法一百五十三

製附子法一百五十四
昇白靈藥法一百五十五

製寒食麪法一百五十六

製披針喉針法一百五十七

諸藥製法一百五十八 逐日人神歌一百五十九

十二時人神歌一百六十

十干日針忌歌一百六十一

屍神歌圖一百六十二 醫家五戒一百六十三

醫家十要一百六十四

外科正宗卷九

海甯許

續編

明崇川陳實功著

吳江徐士

續編

海甯蔣光焞寅昉校

囊癰論第四十

夫囊癰者。乃陰虛溼熱流注於囊。結而為腫。至潰後。罌丸懸挂者。猶不傷人。以其毒從外發。治當補陰清利。溼熱取效者。十有八九。近時人誤用疝家熱藥。多致熱甚為膿。

徐曰此二語確甚

慮難收斂。初宜龍膽瀉肝湯。

龍膽

徐勒批曰
初太寒

稍久滋陰內托散外敷如意金黃散俱可

內消。又一種水疔。皮色光亮。無熱無紅。腫痛有時。內

有聚水。宜用針從便處引去水氣則安。

此句徐圈批曰不可少此

法如腫痛日久。內膿已成。脹痛者。可卽針之。內服十

全大補湯。加山茱萸。牡丹皮。澤瀉。治之。間以六味地

黃丸服之亦愈。

囊癰看法

初起不紅微腫。腎子引痛。不作寒熱。起坐自便者輕。已
成紅腫發熱。形色光亮。疼痛有時。飲食有味者順。已潰

膿稠腫消痛止。新肉漸生。不痛作癢。收斂者吉。潰後腐爛。囊皮脫落。甚者罌丸突出。能食不痛者順。初起堅硬。紫色。日夜痛甚。小便不利。大便秘泄者重。已成堅而不潰。頭腐無膿。疼痛無時。常流血水者重。潰後膿口開張。腫痛不減。身發寒熱。睡臥不甯者重。

囊癰治法

初起寒熱交作。腎子腫痛。疼連小腹者。宜發散寒邪。已成紅腫發熱。口乾掀痛。小水不利。大便秘者。利之。已潰疼痛不減。膿水清稀。朝寒暮熱者。宜滋陰內托。潰後不

能收斂。日晡發熱。飲食減少者。宜養血健脾。潰後罌丸懸挂。不能收斂者。當外用生肌。內加補托。

囊癰治驗

一男子風寒未經發散。寒中腎囊。作腫痛甚。以萬靈丹洗浴發汗。寒邪頓退。又服四物湯加澤瀉。蒼朮。山梔。天花粉。外敷如意金黃散。數次而痊。

徐曰。此輕邪不成癰。

一男子囊腫甚大。脹疼不熱。按之軟而即起。此溼水流注。聚而不散。以披針導去黃水碗許。服導水消腎丸。