

增補萬病回春原本卷之七

太醫院吏目金銘雲林龔廷賢子才編

廉集
同邑後學周亮登九龍校

小兒科

小兒神色總斷

凡小兒病宜先觀形症察色然後看脉假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

八門審候歌

觀形察色辨因由

陰弱陽強髮更柔

若是傷寒雙足冷

要知有熱肚皮求

鼻冷便知是瘡疹

耳冷應知風熱症

渾身皆熱是傷寒

上熱下冷傷食病

五指稍頭冷

驚來不可當

若逢中指熱

必定是傷寒

中指獨自冷

痲痘症相傳

女右男分左

分明仔細看

○觀面部五色

面赤為風熱

面青驚可詳

心肝形此見

脉證辨溫涼

腎敗命須亡

脾怯黃疳積

虛寒眇白光

若逢生黑氣

腎敗命須亡

太陽穴臺武臺

面部

觀形

察色



額腎

下額屬腎水北

左脾屬肝木東

額上屬心火南

鼻準屬脾土中

右腮屬肺金西

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關從第二指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾之困也若現於風關為輕氣關為重遍於命

關則難治矣

三關脉紋主病歌

紫色紅傷寒 青驚白是疳 黑時因中惡 黃即困脾端

青色大小曲 人驚併四足 赤色大小曲 水火飛禽撲

紫色大小曲 傷米麵魚肉 黑色大小曲 脾風微作搖

手指脉紋八段錦

魚刺形主驚風痰熱 懸針形主傷風泄瀉積

水字形主驚疳食積咳嗽 乙字形主肝病驚風

蟲形主肝蟲大腸穢積 環形主疳積吐逆

亂紋主蟲 珠形主死

虎口三關脉紋圖



風關第一節寅位
氣關第二節卯位
命關第三節辰位
虎口叉手處是也

凡小兒至三歲以上乃 一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多驚沉遲為

虛沉實為積

小兒脉法歌訣

小兒有病須憑脉 一指三關定息數 遲冷數熱古今傳 浮風沉積當先識
右手氣口主內疾 外候風寒暑熱侵 內候乳食痰積致 洪緊無汗是傷寒
浮緩傷風有汗液 左手人迎主外證

緊促之時疹痘生

牢而實者因便閉

大小不勻為惡候

九至十至病熱極

虛舌出口咬牙齒

靈丹十救一無生

是煩
噉
噉不定

江二更月吉永孚

之疾熱既泄急宜

活獨活柴胡

地骨皮各等分

一

為衣各三錢

易寒大決下解之用

者一之四二二三歲三

神二錢
地骨皮

一處煉蜜燕丸每兩

11

金箔四大張為衣陰乾磁器內放用黃臘作蓋恐泄腦麝之氣此方百發百中

○千金散 治小兒一切痰喘急慢驚風雖全蝎 姜蚕 各三 硃砂 四分 牛黃 六 冰片 三 黃連 天麻

各四 膽星 甘草 各二 右為末每用五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○保生錠 治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內疳多啼夜間恍惚不寧之牛黃 錢 三 麝香 五 片腦 五 琥珀 一 珍珠 錢 各五 大赭石 三 錢 七 次 金銀箔 四 天麻 防風 甘草 各一 雄黃

錢三 麝香 五 片腦 五 琥珀 一 珍珠 錢 各五 大赭石 三 錢 七 次 金銀箔 四 天麻 防風 甘草 各一 雄黃

人參 錢 各三 蛇含石 七 錢 火 姜蚕 血竭 錢 各五 遠志 三 錢 去心 陳皮 牛膽南星 各一 右為細末用米粉

糊為錠辰砂為衣用薄荷湯送下

○大聖奪命金丹 治小兒急慢驚風癲癇天吊客忤物件中惡及初生臍風撮口著禁胎驚胎癇牙關緊急驚風痰

之良劑此真起死回生傳天麻 泡 全蝎 炒 姜蚕 炒 膽星 防風 去 羌活 白附子 炮 茯神 去 皮

川芎 遠志 心 去 桔梗 去 蘆 石菖蒲 半夏 製 姜 人參 去 白朮 去 蘆 茯苓 去 皮 酸棗仁 炒 荊穗 細

辛 各五 川烏 炮 去 皮 烏蛇尾 五 錢 炙 甘草 炙 大赤頭蜈蚣 一 條 薄荷 沉香 犀角 羚羊角 長

砂 飛 珍珠 琥珀 錢 各三 天竺黃 雄黃 麝香 錢 各一 金箔 片 十 銀箔 片 十 右為末薑汁打糊為丸

如芡實大硃砂為衣每服一丸用金銀薄荷煎湯研化不拘時服

一小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎瘡○一

小兒三歲因驚搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎

生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安見補益

慢驚 慢驚症因病後或吐瀉或禁餌傷損脾胃肢體逆冷口鼻氣微手足瘳瘳昏睡露睛此脾虛生風無陽

之症也

慢驚屬脾中氣虛損不足之病也慢驚者陰症也治宜

○醒脾散 治小兒吐瀉不止作慢驚 國裏醒脾散主之

蚕 等 分 甘草 炙 右剉生薑二片棗一枚水煎溫服

木香 全蝎 去 天麻 白附子 煨 姜

凡養小兒宜戒散

酒肉油膩偏生病

生涼硬物凉水漿

不與自無疳癖病

○消疳湯

治小兒大便色白小便便渾

山查肉 白芍 黃連 炒 白茯苓 去皮

白朮 去蘆 澤瀉 錢 青皮

○消疳丸

治五疳皮黃肌瘦腹大青筋好食泥

蒼朮 浸炒 陳皮 厚樸 炒 枳殼 炒 檳榔 神

○消疳散

治五疳皮黃肌瘦腹大青筋好食泥

砂仁 茯苓 皮 黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁 蘆薈 史

○消疳子

治五疳皮黃肌瘦腹大青筋好食泥

麥芽 炒 三稜 煨 義朮 煨 砂仁 茯苓 皮 黃連 炒 胡黃連 蕪荑仁 蘆薈 史

○肥兒丸

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○肥兒散

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○肥兒子

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○快活丸

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○快活散

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○快活子

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○蘆連消疳丸

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○蘆連消疳散

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○蘆連消疳子

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○白茯苓

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○白茯苓

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○白茯苓

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○白茯苓

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

○白茯苓

治小兒疳積清熱伐肝補

蘆薈 二錢 半碗 咸泥 封固 人參 半錢 白朮 去蘆 茯苓 各三錢 黃連 炒 麥芽 炒 山查肉 錢半 甘草 錢三 右為末黃米糊為丸

癖疾

錢仲陽云癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用起伐痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑且損其脾土凡脾土虧損必變症百出矣當參各類及隨見症而主治之若癖塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯夕服千金消癖丸間與混元丹兼服治之獲效者多矣

癖者生於皮裏膜外也

○淨腑湯治小兒一切癖塊發熱

白朮去蘆 半夏製 人參各八分

柴胡 白茯苓去皮 豬苓 澤瀉 三稜醋炒 義朮醋炒 山查去核各 黃芩

○肥兒丸治癖如神

白朮去蘆 半夏製 人參各八分

甘草炙 蘆薈 阿魏另為 青黛 木香 厚樸製 檳榔半錢 陳皮去白

○千金消癖丸治癖如神

麥芽炒 史君子去殼 胡黃連 山查肉 香附浸 三稜醋炒 義朮各二錢 水紅花子炒 神麴炒

右為末將阿魏一錢白水和麴打爛為丸菜豆大每服四五十九米飲

白湯送下

○益兒餅治小兒

為末入黃蠟麴水和作餅啖

水紅花子 史君子去殼 山查肉各五錢 白朮去蘆 檳榔半錢 木香一錢 神麴炒二錢 右

○至寶丸

真阿魏二錢 蘆薈 天竺黃 胡黃連 雄黃 穿山甲炒 沉香 白草烏炒 硃砂 沒藥各二錢

右為極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再用酒半茶鍾熬成膏勿令火大恐傷藥力量可丸取出丸如豌豆

大每丸黃酒化下十歲以上服二丸臨卧時服待其自然汗出三日服一次重者五七服輕者二三丸熱即退塊亦消須要忌口如服後熱不止可後服金花丸如羸弱不進食者可先服平胃散

○癖疾方

麝香一分 全蝎去毒 斑貓去頭 紅娘子去頭尾足翅女 蝶蟲去足 血蝎 雄黃 硃砂 蘆薈 木香 阿魏 當歸尾浸酒 三稜醋炒 義朮 香附米炒 白豆蔻去皮 蘿蔔子炒各 右為細末醋糊丸如

梧桐子大每服三五十丸或酒或溫水下壯盛者可服

○癰瘡方 蘆薈分五 阿魏分五 急性子即桃紅子小者 水紅花子錢一 黑白牽牛錢一 猴曉錢一 右為細末每服三

分黃酒送下三帖全好

○癰瘡方 牛黃分四 雄膽分四 血竭錢一 蘆薈分四 蘆甘石分五 天然黃 黃蠟錢五 淨皮硝兩一 蜂蜜兩四 右

將蠟化開與蜂蜜一處滾熱往火傾入細磁碗內涼冷後將羣藥為細末方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用飭頭煎喫後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物

○又方 核桃仁片一 檳榔仁二十 硝砂錢一 大黃兩一 右三味為細末入桃仁水煮一炷香水滾時陸續入皮硝

半斤香盡硝亦盡止食桃仁亦好

○清香散 治癰瘡生牙 輕粉炒 象皮炒 象牙炒 乳香 沒藥 孩兒茶 紅褐炒 珍珠煅 海巴煅

分 右為細末搽患處立時痛止生肌如神

○桃花散 治癰瘡上攻 桃花信一塊 桑柴火內燒紅浮入細茶濃酒內如此七次去信茶酒入雄黃一塊研末入

酒內用雞翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○起堅膏 治小兒癰塊 木鱉子 穿山甲 川芎 甘遂 甘草 當歸 右各八錢先用真香油一斤入鍋

內將前藥熬成灰濾去渣再慢火熬滴水不散方下黃丹八兩熬滴水成珠方下細藥入內再不見火 蘆薈

阿魏 硼砂 皮硝 水紅花子錢各五 硝砂錢各五 麝香錢一 右為細末入內攪勻不教攤為膏藥貼時先用

皮硝水洗皮膚以膏貼癰上二三日覺肚內疾作疼四五日作瘡裏後有膿血之物是其驗也

○拆癰膏 治癰瘡 白蠟兩四 桃仁兩四 香油斤半 桐油斤半 生豬腦子斤半 男子血餘不拘多少 右俱下鍋內文

武火熬的蠟子盡用絹濾去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下 胡黃連 香白芷 蘇木 三棱 紅

花 莪朮錢各三 當歸尾 硝砂錢各五 麝香半錢 各為細末照分兩重羅入前膏內攪勻收貯勿令泄氣如

有積塊先用皮硝煎水洗患處令淨次用生薑擦之方用絹帛攤藥貼上貼後用熱鞋底炙熱熨之五七十遍覺內熱方可如貼後癰即消縮如神

○灸法 穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣摸兩傍有血筋發動處在脊骨旁兩穴一穴用銅錢三文壓在穴上

用艾炷安孔中各灸七壯此是癰之根貫血之所灸之瘡即發即可見效灸不着血筋則瘡不發而不效矣

○化癰如神散治瘡塊 蟾酥 黃蠟各二錢 羚羊角 牛黃各五分 麝香三 巴豆肉錢一 硃砂 冰片各一

右為末凡如菜子大每用一丸用扁頭針或患處刺破皮入之用膏藥貼上一伏時揭起其癰化膿血出盡服調

理脾藥

一小兒患痞癰服檳榔蓬朮枳實黃連之類痞甚益余曰此脾經血虛痞也不可趕伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸症愈乃朝用五味異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸芍藥而愈方見補益

諸熱

小兒諸熱辨例

傷寒熱手足稍冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有青紋色○傷風熱手足稍微溫自汗面赤而光咳嗽鼻塞流清涕○傷食熱眼胞腫右額有青紋身熱而頭額肚腹尤甚夜熱晝涼面黃或利吐腹疼○驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有汗時作驚惕手脈絡微動而發熱○風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘○潮熱如水之潮依時而至○癰蒸熱身體上下而蒸熱上氣虛驚耳冷微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脈亂腹痛啼叫不能乳食或吐蛇週歲以後無此症也○潮熱發渴有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未盡食熱肚背先熱疳熱骨蒸盜汗皆熱一向不煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癰熱涎嗽飲水寒熱發如瘧疾狀血熱長已時發疹熱耳鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有兩三症交互者宜隨其輕重而治之

諸熱為病者宜清解也

○大連翹飲治小兒傷風感冒發熱痰壅風熱丹毒腫痛頭項有核頭赤癰癰眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒疹餘毒一切熱毒並治

子 梔子 牛蒡子 赤芍 木通 當歸 防風 柴胡 黃芩 荊芥 連翹 覆麥 滑石 車前

右劉竹葉十片燈心十莖水煎不拘時溫服○風痰熱變蒸如麥冬○寔熱耳熱加大黃○胎熱瘡疹餘毒

加薄荷葉○癰癰熱毒加大黃芒硝

○五福化毒丹

治小兒痘毒熱毒口腫破生瘡牙根出血口臭額赤

犀角 桔梗去 生地黃酒 赤茯苓皮

牛旁子

微炒各五錢

朴硝 連翹

玄參 粉草

各六錢

青黛 梔子

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸薄

荷湯化下兼有驚加硃砂為衣

感冒

感冒者宜發散也

○惺惺散

治外感風寒鼻

人參 白朮 白茯苓

桔梗 瓜蒌根

細辛 甘草

薄荷 右剉水煎服

羌活膏

治小兒外感風寒

人參 白朮 白茯苓

桔梗 瓜蒌根

細辛 甘草

薄荷 右剉水煎服

薄荷

地骨皮 甘草

右為末煉蜜為丸如芡實大每服一丸姜湯研化下

一 小兒八歲患傷寒頭痛身痛發熱口乾面赤無汗諸醫以傷寒治之百藥罔效已經旬日袖手持鏡余以龍腦安

神丸一服其汗如雨即瘥○一 小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘

止再劑而乳食進方見補益○一 小兒沉默昏倦肢冷驚悸其紋如弓之向裏此屬脾胃虛氣而外感風邪也先

用惺惺散以解外邪調胃氣諸症頓愈但手足逆冷又用六君子湯調元氣而安

傷食者宜消導也

○萬億丸

治小兒乳食生冷所傷發

陳皮 神麴

三稜

麥芽

香附

加白朮

右為末

○消食丸

治小兒乳食不消

陳皮 神麴

三稜

麥芽

香附

加白朮

右為末

麵糊為丸

如麻子大食後白湯送下大小加減

陳皮 神麴

三稜

麥芽

香附

加白朮

右為末

○消食餅

治小兒時常傷食及黃肌瘦肚

蓮肉

山藥

白茯苓

神麴

麥芽

扁豆

等分為末每用四兩入麵一斤水同和烙焦餅用

一 小兒傷寒嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未退余以為胃經虛血用六君柴胡升麻四劑而痊

一小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用四物升麻柴胡而愈○一小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺虛氣虛有熱用六君子炒黑黃連梔子而愈右方俱見補益

腹脹

腹脹者脾胃氣虛也

○消脹散治小兒腹脹

蘿蔔子炒

蘇梗

乾葛

陳皮

枳殼各等

甘草少

右剉水煎服食少者加白朮○一

小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾

胃氣傷而及於肺也用六君加桔梗調補而痊○一小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益

氣湯而愈右方俱見補益

嘔吐

嘔吐乳食傷胃也

○定吐飲治吐逆投諸藥

半夏湯泡透切片焙乾為末二兩

生薑先淨和皮一兩

薄桂去粗皮

右薑切作小方塊如菜豆大同

前半夏和勻入小鑊內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤開地上去火毒候冷略搗去

黑焦末每服二錢水一盞薑三片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金核治嘔吐

丁香

木香

霍香

半夏姜湯泡七次

人參去蘆

白朮去蘆各二錢

右為末薑汁打糊為丸棗

核大用沉香硃砂各一錢陰乾每服一丸用棗一枚去核放藥丸在內薑片夾濕紙裹火內煨熟去薑服米飲壓

之

一小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘吐痰此飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連梔子各二分一劑

頓愈方見補益

泄瀉

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心中氣喘嘔吐人參 白朮炒 茯苓去皮 山藥炒

甘草炙各二錢 蓮肉去心 白扁豆汁浸炒 砂仁 桔梗去蘆各 右為細末每服二錢東湯調下量兒年歲

大小加減

○啟脾丸消食止瀉止吐消痞消黃消脹定腹痛脾健胃人參 白朮去蘆 白茯苓去皮 山藥炒 蓮肉各一兩

心 山查肉 陳皮 澤瀉 甘草炙各五錢 右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二三十丸空心米湯下或米湯研

化服亦可小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末一兩每服一二錢米湯調下止小兒泄瀉殊效○一方治瀉瀉用柿餅燒熟食之即止

○治小兒水泄不止 五梧子為細末陳醋調稀熬成膏貼臍上即止○水瀉痢疾方 生薑四兩 真香油四兩 黃丹

兩二 熬成膏藥貼臍立效

○小兒飲後後即瀉先用六君升麻神麴山查而止又用五味異功散加升麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸二服又

用異功散服之調補脾氣而安

○小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先用五苓散方見 加木香白餘諸症漸退又用五味異功散為主佐

以加減腎氣丸又旬日二便調和飲食漸進浮腫旋消乃以異功散調理而安

○小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異功散加木香子母俱服而安○一

小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用

補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母俱愈右方俱見補益

吐瀉 上吐下瀉者脾胃傷也

○白朮散治吐瀉或病後津液不足口乾作渴人參去蘆 白朮去蘆 茯苓去皮 藿香 木香 乾葛 甘草炙各

右剉剉水煎服○若小兒頻瀉痢將成慢驚如山藥扁豆肉豆蔻各一錢 姜一片水煎服○若慢驚已作加細

辛天麻錢各一 全蝎個三 白附子八分 ○若小兒冬月吐瀉是胃寒胃虛所致加丁香三粒○如胃虛不能食而

大渴不止者不可用淡滲之藥乃胃中元氣少故也以此湯補之加天花粉○若能食而渴者白虎湯加入參

如中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷服之效

○燒針丸治小兒黃丹 硃砂 白礬過枯

水泔研爛調服瀉者食前吐者無拘時外用菜豆粉以雞子清作膏如吐塗兩腳心如瀉塗臍門上止則去之

○又方治吐瀉四君子湯加藿香陳皮一劑而愈

○助胃膏治元氣脾胃虛弱吐瀉不人參 白朮去蘆 茯苓去皮 甘草炙各一錢半 白豆蔻煨去 木香 山藥炒五錢

肉豆蔻止不思飲食及久瀉虛寒丁香 官桂 藿香各三錢 陳皮錢五 右為末研細煉蜜為丸彈子大每服

一丸米湯化下○秘方治小兒白礬黃丹各五錢用葱白搗爛塗臍上即止○治小兒吐瀉 小丁香 陳皮

各等 水煎溫服

一 小兒數歲間每停食輒服峻利之藥後肚腹膨脹嘔吐泄瀉先用六君子湯諸症漸愈又用補中益氣湯而安○

一 小兒腹脹飲食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理中丸後用六君子湯而愈○一 小兒吐瀉乳食

色白不化露睛氣喘此脾胃不足形病俱虛也先用異功散加桔梗柴胡頓愈再用補中益氣湯而安○一 小兒

因驚吐瀉腹脹先用六君木香柴胡治之稍可又以五味異功散而愈後因驚搖痰甚或用鎮驚化痰之藥倦怠

不食而泄益甚先用異功加木香鉤藤四劑而愈補益方見○一 小兒面黃肌瘦泄瀉無度腹脹如鼓不思飲食百藥

不效余教用好生白朮酒磨濃汁以溫酒調空心服二三日即愈

痢疾 東垣云白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷也

痢疾者腹中實積也

○萬億丸治小兒下痢赤白腹

一 方治小兒痢用雞子一個冷水下鍋煮一沸取出去白用黃研碎以生薑汁小鍾半鍾和勻與小兒食忌茶○姜

茶煎治痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可老生薑切片 細茶錢三 用新汲水煎服

一 方用生薑細茶連根韭菜三味同搗酒調立止○仙梅丸治痢疾發熱 細茶 烏梅水洗剝皮 右為末用生

蜜搗作丸彈子大每一丸冷熱隨意化下

葷肉熱物此法十治八九無藥處可以救人果者謂桃杏棗杏栗之類

一小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後患瘧日晡而作余以謂元氣下陷欲治以補中益氣湯不信泛行清熱消導前症益甚食少作瀉余朝用前湯夕用其功散加當歸月餘而愈○一小兒每午前寒後熱久不愈用六君子加炮姜丸如芡實大每服一丸旬餘而愈方見補益

咳嗽

咳嗽者傷肺風也

○參蘇飲治小兒四時感冒發熱頭痛咳嗽喘急痰涎壅盛

去乾葛枳殼等分甘草人參減半木香許

紫蘇 陳皮 前胡 桔梗 半夏姜汁 白茯苓 右剉生姜三片水煎食後服○若肺實有邪去人參

加黃芪桑白皮杏仁

○參花散治咳嗽發熱 人參 天花粉各等 為末每服五分蜜水調下

○一方治小兒喉中痰壅喘急 月已豆一枚去殼搗爛作一丸以綿花包裏男左女右塞鼻中痰墜下即愈○蜜

梨噙治咳嗽 甜梨一個刀切勿斷入蜜於內麵裹灰火煨熟去麵喫梨愈

一方治傷寒潮熱痰咳男婦小兒 鬱金三錢 石膏煨過 右共為末每服二三匙清茶送下

一小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑加喘促出汗余謂脾肺氣虛欲用補中益氣湯加五味補之不信乃自服二陳

桑皮枳殼而發搐痰壅仍用前藥鉤藤鉤而痊

喘急 喘急者痰氣盛也

一揔金治小兒風痰吐沫氣喘咳

小兒肺脹喘嗽 多人看作風喉 大黃檳榔二牽牛 人參分兩等求

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一帖下咽喉 不用神針灸

右其症肺脹喘滿胸高氣急兩脇搖動陷下作坑兩鼻竅脹悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎湧塞俗云馬脾風若不急

治死於旦夕也

○治小兒喉中痰壅喘甚 用巴豆一粒搗爛作一丸以棉花包裏男左女右塞鼻疼即墜下效

一小兒患喘服發汗之劑汗出而喘益甚用異功散頓愈又用六君子湯而全愈方見補益○一小兒有哮喘其母過勞

即發兒飲其乳亦嗽用六君子桔梗桑皮杏仁治之母子並愈方見補益

小兒初生雜症

小兒初生宜先濃煎黃連甘草湯急用頓縮或絲綿包指蘸藥搥出口中惡血倘或不及即以藥湯灌之待吐出惡沫方與乳喫令出痘亦稀諸毒瘡亦少

一初三五月宜綳縛令卧勿豎頭抱出免致驚癇○一乳與食宜相達不宜一時混喫令兒生疳癖痞積○一宜用七八十歲老人舊裙舊襖改作小兒衣衫真氣相滋令兒有壽富貴之家切不宜新製絳綾羅襪絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福必致夭殤○一小兒生四五個月止與乳喫六個月以後方與稀粥哺之週歲以前切不可喫葷腥並生冷之物令兒多疾若待二三歲後臟腑稍壯纔與葷腥方好

延生第一 小兒初生臍帶脫落取置新瓦上用炭火四圍燒至煙將盡放土地上用瓦蓋之類蓋之存性研為細末預將硃砂透用明者為極細末水飛過臍帶若有五分重硃砂用二分五釐生地黃當歸身煎濃汁一二碗殺調和前兩味抹兒上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便遺下穢污濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子則得一子十分妙法也

滌穢免豆湯 用練樹子一升至正月初一日子時父母只令一人知將練子煎湯待溫洗兒全身頭面上下以去胎毒洗後不出痘疹如出亦輕或只三五顆而已○一方用五六月間收絲瓜小小蔓藤陰乾約重二兩半收起

煎湯洗○一方用葫蘆上蔓藤如前法亦可

○稀豆萬金丹 治嬰兒未出痘時胎毒在臟腑因時氣而發也如在春秋二分每服一丸使痘毒漸消出時稀少如

者切不可加減以取不效 麻黃根 升麻 各二 羌活 樺皮 蒿草根 括萆根 鼠粘子 炒 天麻 連

翹各一 當歸 芍藥 川芎 各七 右剉作片用水五升煎至半升去渣入銀器內以湯頓成膏入煉蜜少許

調勻入後藥 硃砂 錢 冰片 雄黃 各五 蝦蟆灰 半錢 麝香 分 全蝎 個四 右為末入前藥和勻分作