

續傷寒補天石目錄

卷五

惡風惡寒

潮熱

煩渴

不眠

晝夜偏劇

頭痛

身搖

盜汗

盜汗

悸

發熱

寒熱

煩躁

多眠

瀉冒不仁

頭眩

身汗

自汗

手足

面色



看目法

察鼻法

口乾

漱水不飲

察舌法

鄭聲

咽痛

氣逆

咳嗽

乾嘔

噫

鼻衄

察耳法

察唇齒法

渴

舌胎

瘰癧

瘡腫

氣短

喘

嘔吐

噦

呃逆

吐血

項強

背惡寒

卷下

心悸

心下滿

結胸痞滿

懊憹

牙痒

戰慄

肉苛

掌搖

厥逆

瘧病

驚惕

胸脇滿

胸中冷結厥

身痛

身振

胸惕

四肢疼厥沉重不收

瘕瘕

循衣摸床

發班 發狂 腹痛 狐惑 臌厥 中 奔豚 蓄血 遺尿 小便自利 小便難 自利

發黃 腹滿 霍亂 蛔厥 臌結 劫氣 小腹滿 囊縮 小便數 小便不利 不大便 便膿血

百合病

續傷寒補天石目錄終

續傷寒補天石卷上

明吳中丞維城存橘甫著

惡風惡寒第一

惡風者見風則怯。密室之中。望所惡也。惡寒者雖未嘗見風而亦惡寒。身虽熱。必欲近衣被。其風寒客于營衛。陰氣上入陽中。則澀漸惡寒也。寒傷營。風傷衛。營衛既傷。不復能營中而衛外矣。豈復能任風寒乎。故傷風惡風。傷寒惡寒。理必然也。但風惡風。悉属于陽。惡寒則有陰陽之別。經曰發熱惡寒發于陽。望也。惡寒發于陰。此陰陽之別也。

發熱第二

發也之病翕然而洪。此是表熱也。風寒客于皮膚。怫鬱于表外。表也而裏不也。蒸然也。此是裏也。陽邪入陷于陰中。裏也而甚而達表也。其在半表半裏也。表邪未罷。邪氣侵裏。未作裏。則表裏俱也。而但輕于純在裏也。太陽惡寒發也。陽明微惡寒發也。或惡熱發也。或自汗潮也。少陽往來寒也。以陰裏寒外也。太陰厥陰皆不發也。也。汗下後有也。太汗則損元氣。損則陽

微故脈虛而惡寒大下則傷血之傷則陰弱故脈清而發也誤汗誤下皆有此耳且陰以陽為主陽以陰為根下之亡陰矣陰甘所主邪氣侵之搏之血虛乃發也經曰凡傷于寒則為病也其甚不死傷寒發也病之常也若脈陰陽俱虛不止也汗以復發也脈躁疾者下利不止也皆死

成世已曰汗以發也表虛也汗出而不惡寒但惡也裏實也經曰汗出不惡寒者此表解裏未和與調胃承氣湯

傷寒雜病發汗有相似者傷寒發也惡寒而渴陽明經病也陽明氣病脈洪大先望形也白虎湯主之雜病發熱惡寒而渴但目赤者病臟也手太陰肺不足不能管領陽氣也脈浮大甚則嘔血先有形也地黃枸杞之類主之若誤用白虎者死

東垣曰氣病在表誤用血藥望傷也為安血而益陰也血病在裏誤用氣藥白虎者死

為濕肺而損陽也又有內傷中者與陽明症相似內傷熱中與外感症相似其辯在前條

火

發者自不同按脈虛者無脈誤治別手忘也屬虛者用火藥湯治之外葛荅防甘草

潮熱第三

潮熱屬陽明陽明旺于未申一旦發日晡而作如潮水之有信也邪入胃腑為可下之症設或脈浮而緊潮熱而利或小便難大便溏者邪未入腑猶帶表症先宜和解其外如小便利

大便硬方可攻之若潮热于寅卯則属少陽潮热于巳午則属太陽是又不可不辨

寒熱第四

寒热往来者陰陽相勝邪正爭也属少陽半表半裏症盖陽不足則陰邪出表而与之爭故陰勝而為寒陰不足則陽邪入裏而与之爭故陽勝而為热邪居表多則反寒邪居裏多則反热邪在半表半裏則寒热相半乍往乍來而間作也小柴胡汤主往来寒熱寒多加桂热多加苓是其大槩也若热結在裏大渴而大便實往来寒热大柴胡湯

煩熱第五

烦热者热而煩擾不安也邪热在裏伏裏不經汗吐下則為烦热与发热似同而實异經曰病人發热汗出則解如未作膿者但宜和解微汗而已若心下滿而痞煩則有吐下之异宜別其症之虛實而為劑之輕重也先煩而悸者為實先悸而煩者為虛煩謂中欲嘔吐鬱悶之狀也凡烦热不得汗出者發汗則愈發汗及解半日汗脈浮數者可更發汗桂枝湯太陽心煩自汗小便數者不可与桂枝湯宜与药甘草湯

芍药炙甘草

酸收甘緩酸甘相合用補陰血

出汗必煩渴脈洪大人參白虎湯陽明心煩喜嘔壯熱往來心下悸而又無小便不利小柴胡加荈

苓湯傷寒二三息下悸而煩小建中湯桂枝甘草大棗芍藥生薑飴糖衄血而煩渴其飲水則嘔五苓散不愈

竹葉石膏湯下後復發汗盡日煩躁不得眠陽與陰爭也夜安靜陽不能爭也不嘔

不渴其表症脈沉微身大熱乾姜附子湯主之若發汗若下之病似不解而煩躁荈

苓四逆湯大汗後六七日不大便不解腹滿痛其有燥屎也大承氣湯下後心煩腹滿臥起不

安其梔子厚朴枳實湯酸苦湧泄梔子之苦湧泄煩厚朴枳實之苦以泄腹滿之痛傷寒醫以丸藥下之身熱不去微煩其梔子乾

姜湯梔子之苦以吐煩乾姜之辛以益氣汗吐下後虛煩不得眠若劇其必反覆顛倒心中懊憹梔子香豉湯梔子

香豉吐劑也取酸苦湧泄之義若夫腎傷寒表裏皆熱煩躁不欲見光明有時腹痛其脈細四逆湯內傷勞

役陰虛火動而煩其人身倦其力自汗尺脈虛浮補中益氣湯加黃柏知母生地麥

冬山梔黃連若不睡而心煩其益服硃砂安神丸歸身生地甘草硃砂黃連蒸餅為丸津咽下納其浮遊之火而安神明也

凡傷寒身體疼不得汗故也脈浮其汗止脈弦其和之玉桂胸中煩心中煩俱是熱而煩

也小柴胡合解毒湯主之甚其吐之下也

烦躁第一百三

陰氣急為陽氣勝也而烦躁太陽經少陰亦有烦躁此是陽盛為陰所乘故也

煩為擾亂躁為憤怒是謂先煩而後漸至躁也傷寒烦躁則有陰陽虛實之別心主則煩陽

實陰虛腎主則躁陰實陽虛煩則主輕躁則主甚也

火入于肺煩也火入于腎躁也或曰烦躁心火為之也夫心火君火也與邪氣相接上下通金以之而躁水以之而主独

存其火耳故肺腎與心合為烦躁有此煩雖肺腎其寔火為之也

有邪在裏而烦躁主有不煩便作躁悶主此則陰隔陽欬于泥水中卧飲水

不得入口也四逆湯治之其或結胸痞而煩躁吐利四逆而烦躁下利發主厥逆烦躁惡寒

倦卧脈不出而躁主皆為不可治矣傷寒主汗不汗則人烦躁太陽中風不得汗而烦躁邪

在表也大青龍湯沖和湯太陽不得汗醫以火劫而烦躁主小柴胡加牡蠣湯發汗已脈浮

數煩渴主五苓散主主狂言烦躁主五苓散水調探吐陽明不大便烦躁承氣湯下之少陰

吐利厥逆烦躁欬死主吳茱萸湯

茱萸人參生薑大棗

厥逆脈沉自利烦躁不得眠黃連阿膠湯

黃連白芍茯苓膠

鳩子黃

雜病血虛烦躁主歸補血湯

生歸身芍地黃白朮知母麥冬人參茯苓神黃連桃

痰火烦躁溫膽湯

竹茹枳實陳皮半夏茯苓甘草

不眠第

不眠主陽甚陰虛則晝夜不得眠蓋夜以陰為主陰氣甚則目闭而卧安若為陽所勝

故煩擾而不得寧所謂陰虛則夜爭也至于少陰病也煩于內而不得眠又宜芡連阿

膠湯以扶陰散也若差及不得眠也也氣與此陽相并陰氣未復也梔子烏梅湯梔子

芡連胡甘草瓜
姜竹叶豆豉烏梅有汗下太過陽氣暴虛而不得眠也若芡連心脈沉微不嘔不渴晝不安夜

寧靜又宜姜附湯干姜附子甘
草陳皮生薑以退陰復陽也此又不可不知全晝夜看汗下晝夜不得眠裏也故宜梔子
豆豉湯晝不退夜安靜陽虛也故宜姜附湯

汗出鼻乾不得卧也邪在表也解肌湯石膏麻黃
甘草升麻若胃有燥屎也大承氣湯及大汗胃中乾

不得眠也邪在裏也用大承氣湯胃不和則卧不安故宜徹也和胃也若汗下後虛煩不

得眠也吐下後心中懊憹不眠也梔子豆豉湯汗下後虛煩不得眠也溫膽湯陽協陰狂

言不眠也亂夢也煩氣也也酸棗仁湯李仁參桂石青
茯苓知母甘草生薑陰協陽驚悸神昏沉大也乾嘔錯語

呻吟不眠也犀角地黄湯溫膽湯少陰下利咳而嘔渴心煩不得眠停水也芡苓湯

芡苓澤瀉滑
石苓苓陽膠少陰二三日心煩不得眠也也煩于內也黃連阿膠湯病人不利大便下難

下易時有微也喘冒不能卧也也燥屎也大承氣湯中風汗出脈濡而弱厥而且寒

然不得眠也建中湯以參竹叶石膏湯虛心飲酒煩惡乾嘔口噤呻吟錯語不得眠也

犀角解毒湯
犀角去青元參甘草射麻
黃芩黃連黃柏梔子仁

多眠第

多眠四症先看脈若呈風溫情熱
太陽外症欲解時更有少陰與孤感

衛氣晝則行陽夜則行陰行陽則寤行陰則寐陽氣盡陰氣甚則目瞑故多眠乃邪侵于陰而不主陽也昏々閉目其陰司闔也默々不言其陰主靜也太陽病十日脈細嗜臥其外已解神將復也設胸滿脇痛鼻乾多眠其蓋風熱內攻不干乎表故其氣伏于裏則喜睡也不得汗其小柴胡湯脈浮其冲和湯冬月用麻黃湯少陰病但欲寐脈沉細其四逆湯少陰病欲吐不吐欲嘔不嘔心煩多寐五六日自利而渴小便自赤逆湯若後煩渴不得臥其不治三陽合病欲眠目合則汗濺語其則有也小柴胡湯其胃熱其嗜臥也犀角解毒湯風溫孤感亦有此症開在皮條凡汗後身涼脈靜而好睡病將愈也

晝夜偏劇第

晝靜夜劇其主在血分四物湯加蒼連山梔丹及柴胡黃柏肥知母主之其在氣分其則

多眠
晝夜偏劇
驚冒不仁

夜靜晝劇小榮加芩連山梔地骨知母主之

藹冒不仁第

仁者柔也不仁不柔和也

藹冒者昏沉迷悶如物之蒙冒其首也不仁者頑痺麻木痛癢不知針火不知犹如死屍也 節庵曰此虛寒乘寒為藹冒不仁血氣虛弱不能周流于一身于是心氣為邪氣所伏故肢痺頑麻不仁厥如死屍桂麻各半湯不愈補中益氣湯入姜汁設或身痺如油作汗不休喘而直視水漿不入此為命絕也經曰少陰脈不至腎氣微少精血奔氣上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下者亡陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨瀕以藹冒不仁為可刺之而得痊者寧神醫之肘也甘草乾姜湯桂枝芍藥湯加乾姜桂麻各半湯消息選用之 太陽下早不愈仍復發汗以致表裏俱虛其人致冒之家汗自出而愈乃表和也若不得汗而不得解用人參三白湯加川芎當歸天麻下虛脈微足冷加熟附溫經固本少陰下利心而眩暈時以藹冒者死婦人新產藹冒血虛也四物湯主之若惡露上衝藹冒

血暈昏迷也四物加紅花桃仁姜桂主之凡頭目眩暈此皆胃也眩暈輕者胃重也

頭痛第

頭痛者邪氣攻于上也三陽經俱有頭痛而太陽尤為甚主三陰其頭痛者三陰經至
頸胸而還也厥陰有頭痛者厥陰經上連目系項顛也太陽項顛腦及痛陽明其額痛
少陽其角痛太陽其痛其汗麻黃湯有汗桂枝湯三時沖和湯陽明其痛目痛鼻乾
不眠解肌湯加芎白芷升麻蔥白若煩渴自汗白朮湯若六七日不大便胃實氣攻于
上其痛甚少與調胃承氣湯少陽其痛小柴胡湯厥陰其痛乾嘔吐涎沫吳茱萸湯濕
家病其痛鼻塞瓜蒂末納鼻中芫水出立愈痰涎其痛胸滿寒者脈緊瓜蒂散
吐之愈若兩感其痛與夫真其痛之連于腦手足俱寒而青者必死不治
痛左脈弦數氣厥於痛脈沉痰厥於痛脈伏時見寒濕其痛脈沉
細而遲厥逆其痛時犯風寒內至骨髓之原在腦又謂之腦風其痛雜症六有頭痛如血虛其痛四物加芎芎蔓
荊氣虛其痛四君子湯加芎芎蔓荊藁本氣血俱虛八珍加藁本蔓荊脈大芎
力補中益氣加蔓荊細辛偏風其痛羌活湯加大麻荊芥濕痰其痛二陳加蒼朮

川芎白芷細辛痰火頭痛二陳加苓連山梔川芎蔓荊竹瀝姜汁陰火上衝頭痛
四物加芩柏知母蔓荊之芥苓連山梔食積頭痛平胃散加川芎各湯中俱要加桔
梗開提諸藥上行不可缺也

發自頭痛先要活潑厥真濕疫撲火風火夾邪侵氣血少並寒
濕緩其尤宜審經更有肩胛痠作痛風痰風火客于陰血

東垣曰東風生于春

病在肝愈在頸項以毒氣其病在項又諸陽會于頭痛面如暈太陽膀胱經起于目內

眦上額交顛入絛腦還出別下項病衝頭痛是太陽膀胱經起于目銳眦上抵頭角

病則項角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客于經絡令人振寒頭痛身

重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則泄汗之則愈此太陽頭痛也

頭痛耳鳴九竅不利其腸胃之所生乃氣壅頭痛也心煩頭痛其病在耳中過

在手巨陽少陽陰乃濕壅頭痛也如氣上不下頭痛顛疾其下壅上宣也過在少陰

巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如形半寒痛其先取手少陽之筋取足少陽之筋此偏

頭痛也左右屬痰與志脈洪實左左屬風與志脈弦數有真頭痛其甚則腦盡痛

其痛也左右屬痰與志脈洪實左左屬風與志脈弦數有真頭痛其甚則腦盡痛

逆氣令其痛齒之痛

凡其痛皆以風藥治之也。總其大概而言也。高顛之上惟風可列。叔味之薄其陰中之陽乃自地升于天也。然亦有二陰三陽之異。故太陽其痛惡風脈浮緊以芎藭羌活獨活麻黃之類為之。陽明其痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實以升麻葛根石膏白芷為主。少陽其痛脈弦細往來寒熱柴胡為主。太陰其痛必有痰俸重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為主。少陰其痛三陽三陰經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主。厥陰其項強痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之。血虛其痛當以芎藭為主。氣虛其痛人參黃芪為主。氣血俱痛調中益氣湯少加芎藭。蔓荊細辛其效。效如神。白朮半夏天麻湯治痰厥其痛也。白朮半夏天麻人參黃芪蒼朮茯苓神曲陳皮干姜澤瀉芎藭麥芽粉清空膏治風濕其痛也。以芎藭黃芪黃連羌活附子麻黃蒼朮甘草升麻如濕氣在其其苦吐之不可執右而治。

頭眩第