

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊五

傷寒雜病論章句類方卷十二

湘潭孫鼎宜撰

【柴胡輩】

小柴胡湯

柴胡半斤

唐云柴胡當用四川產者一莖直上中通有白點故能通三焦之膜膈色青氣香春日生成恰得少陽之氣非別省

紅軟銀白等柴胡也

黃芩

人蔘

甘草炙

生薑切各參兩

一作生薑伍兩

半夏半升洗

外臺一斤水洗又引云湯洗作半

大棗拾貳枚擘

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煮

徐云此又一法顧云凡和解藥皆去

一滓再煮者欲使藥性和合取三升溫服一升日三服徐云此湯除兩大

較今亦伍兩陸錢雖分三升已為重方蓋少陽介於兩陽之間

性合能經氣相融不復往來出義○若匈中煩而不歐者去半

夏人葠千金本此別立半夏煩實湯不可用人葠加栝樓實壹枚徐云

實除匈痹此小○若渴者去半夏徐云能耗津液痰加人葠徐云生

合前成肆兩半是加壹栝樓根肆兩徐云無此五字○若腹中痛者

去黃芩徐云苦寒加芍藥叁兩徐云除○若脅下否堅者去大棗徐云補

胃脾加牡蠣肆兩翼方治脅下否熱○若心下悸外臺小便不利

者去黃芩加茯苓肆兩徐云利○若不渴外有微熱者去人葠徐云

則津液加桂枝叁兩翼方作貳兩徐云溫覆取微似汗外臺無○若

欬者去人葠大棗徐云非宜生薑徐云加乾薑加五味子半升乾薑

貳兩外臺二引甄權下有忌羊肉錫海藻菰菜等物十字徐云古方

肺治嗽又法後人獨用五味有收斂風火熱勞怯深火喘與此處寒飲

矣又○又云論中小柴胡通與桂枝方二方有用加減法此方加減法須細審

少陽病小柴胡證三章者外已解也設匈滿脅痛者與此湯

身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者主之

少陽病下熱堅滿乾嘔不食大便溏舌上白胎者可與此湯上焦得通津液得下

服小胃氣因湯和身渴然汗出解也治之

匈反脅利滿者知醫以晡所藥下潮之熱非已而微利此本柴胡證先宜服不此以利解

三陽合病有柴胡證但見一證便是不必悉具也

脈弦浮大短氣腹滿目悉黃脅下及心滿久按之氣不通或後腫刺之乾無

汗者臥一短氣腹滿目悉黃脅下及心滿久按之氣不通或後腫刺之乾無

陽差外陰解病過十日脈續浮者與小建中湯不差者此主之

但欲飲胡證中痛微瀉者先與此本柴胡證以歐故知也

脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再下之不能食脅下滿痛面目及身
黃頸項強小風便難者與此後必下重之大渴飲水而歐柴胡湯不中
歐而發也食穀者噦胡湯證具而必蒸而振卻發熱汗出而解
少陰湯此雖已下之胡湯證具而必蒸而振卻發熱汗出而解
傷寒雜病論章句 卷十一 柴胡輩 一一 中華書局聚

頭汗必出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘堅脈細者此為陽微
純陰結不得復有外證悉入在裏矣此有汗今在頭汗出故知非

差少陰發熱可與此湯設不了者得矢而解

諸黃腹滿而數者宜服在黃瘰

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經適斷者此為熱入血室其

產後大便堅露得風四肢苦煩之頭痛者與此湯

柴〔胡〕桂〔枝〕乾薑湯此合方以治合病者以次於此○味皆柴

一引仲景稱小柴胡湯按此即小柴胡去人

柴胡半斤

黃芩

桂枝各叁兩所謂人蘼加桂枝有微熱

枳樓根肆兩此所謂去渴人蘼加枳樓根肆兩但

乾薑易生以不數而去半夏乾薑

牡蠣熬所謂脅下否堅去大棗加牡蠣肆兩外臺一作叁兩未詳孰是

甘草炙各貳兩

右七味煮服法同○初服微煩復服仲外臺一引仲景作溫覆二卷引仲景則無此二字下均有忌生

葱海藻菰菜七字

大少合病已發汗而復下之匈脅滿微結小便不利渴而不飲但頭汗出往來寒熱心下煩者主之

身熱惡風頭項強脅下滿手足溫而渴者主之瘡寒多微有熱或但寒不熱此主之

〔柴胡桂枝湯〕方在合輦

柴胡去半夏加栝樓根湯

栝樓根肆兩

加入小柴胡湯中去半夏同治瘧病發渴而此治瘧不去人獲

右七味煮服法同外臺五引仲景下有忌海藻菰菜五字

瘡發渴者主之亦治勞瘡

柴胡加龍〔骨牡〕蠣湯即小柴胡去甘草加龍骨等

柴胡肆兩減肆兩

黃芩一本無黃芩共十一味

人葠

生薑以上各減壹兩半

龍骨

牡蠣煨趙校云成本作熬

桂枝去皮

茯苓

鉛丹各壹兩半

半夏貳合減陸合○翼方作壹合半

大棗陸枚減陸枚

大黃貳兩切如棊子大

右十二味㕮咀以水八升煮取四升是不去滓內大黃更煮一二沸徐云大黃

只煮一二沸取其生而流利也顧云不欲盡出大黃之味按外臺易

引作取二分去滓溫服一升外臺下有忌羊肉

也減陽合病下之匈滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者主

大柴胡湯即小柴胡去人蔘甘草加枳實芍藥大黃○此治

柴胡半斤

半夏半升一作半斤

黃芩

芍藥各叁兩

崔氏用肆兩

枳實肆枚炙

崔氏用捌片

生薑伍兩

大黃貳兩

大黃據金匱腹滿內補傷寒大陽中云此方本有大黃貳

和語柯云條中不言便堅且有下利證仲景不用大黃之意曉然况

柴胡證有云熱結在裏有云心下否堅有云按之心下滿痛一味枳

傷寒雜病論章句

卷十一

柴胡輩

四一中華書局聚

禁用則通因通用有用大承氣者於大黃何有必
以惡叔和之故概加詆斥亦無以服叔和之心也

大棗拾貳枚

右八味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓再煮取三升溫服一升

日三服外臺一引仲景下有忌

少腹陽明病發熱汗出不解心下痞堅噉吐而下利者主之

三陽合病再下之厥不止心下急鬱鬱微煩者與此下之則愈

差後脈沈者內實也宜服
腹滿按之心下滿痛者此為實也當下之宜服

柴胡加芒硝湯徐承云即小柴胡加芒硝分兩各不同迺合用調

氣也皆少陽陽明合治之方按此湯
內不用大黃以其下利無容再通耳

柴胡貳兩拾陸銖減伍兩

黃芩

人蔘

甘草炙

生薑各壹兩

各減貳兩

半夏貳拾銖

外臺一作伍枚

大棗肆枚

減捌枚

芒硝貳兩

右八味咬咀以水四升

減以八分兩輕

煮七味取二升去滓內芒硝更上

火煮一二沸

一作更微沸

分溫再服

○不解

徐云大便不解

更作

謂再服之後也徐云此藥

齊之最輕者以今秤計之約貳兩分二服則一服九字耳○外臺一引仲景下有忌海藻菰菜羊肉錫等

又方

芒硝陸兩

宋本作貳兩

加入小柴胡湯中

右八味煮服法同

傷寒三及十卷用此法趙校云成本無此方

不解更服

林校云金匱玉函方中無芒硝

別一方云以水七升下芒硝貳合大黃肆兩桑螵蛸伍枚煮取二升

半服五合微下即愈本云柴胡再服以解外餘二升加芒硝大黃桑

螵蛸也外臺一注出玉函

經一方芒硝叁合餘同

傷寒雜病論章句

卷十一

柴胡輩

五中華書局聚

少陽陽明病，今反利者，知醫以圓藥下之，非其治也。潮熱者，實也。先
再服小柴胡湯，以解外，後以柴胡加芒硝湯主之。
芒硝桑螵蛸湯亦主之。

柴胡加〔芒〕硝〔大〕黃桑螵蛸湯
林本有本刪

大黃肆兩酒洗

芒硝叁合

桑螵蛸伍枚

加入小柴胡湯中

右十味餘依前法
謂煮服同小柴胡也
微下即愈

又方

以水七升煮芒硝大黃桑螵蛸三味取二升半去滓溫服五合微下

即愈
本云猶言別
小柴胡湯再服以解外餘一服加大黃芒硝桑

螵蛸
疑是以小柴胡本分三服此加入此三味煎成取五合也此又

定法大陽明且過經不解寒漸化熱故可用兩解之法有也讀仲景書死於近

句下者遇溫熱病亦用先表後裏之法則緩不及事矣按仲景自桂枝加大黃湯顧未察也
少陽陽明病中藥證一章見上方下

四時加減柴胡飲子

柴胡

朮各捌分

大腹檳榔肆枚併皮子用

橘皮

生薑各伍分

桔梗柒分

右六味咬咀分爲三貼

貼猶齊也

一貼以水三升煮取二升去滓分溫三

服

此法

如人行四五里進一服△如四體壅

壅腫

添甘草少許

謂不始

可用甘草也

○或每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七合溫服七

二升再合滓

合三小貼煮過之滓

爲一服重煮

不著水數

都成四服

此又法

冬三月柴胡稍多不著

春三月去朮加枳實多不著

夏三月加甘草枳實仍用朮

秋三月橘皮稍多共六

寒熱五藏寒熱此主之

【治中輩】

治中湯 一名人蓐湯

人蓐

乾薑

甘草炙翼方注以上三味一作各壹兩

朮各叁兩

右四味呔咀以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服徐云急則用湯○外

臺三十一引仲景○若齊上築者腎氣動也去朮加桂肆兩也加桂枝

注一作叁兩徐云即欲○吐多者去朮加生薑叁兩注一作貳兩翼方

云有乾薑復加生薑○下多者還用朮翼方注還一作倍○悸者加

茯苓貳兩

徐云悸為心下有水故用茯苓

○渴欲飲水者

翼方作渴者二字外臺作先時渴喜得水者

加

尤壹兩半

外臺作消飲生津

○腹中痛者加人葠合前成肆兩半

亦加壹兩半

徐云此痛因心腹鼓痛

○惡寒者

惡字據外臺補

加乾薑至肆兩

半

至陽虛惡寒與外感別字

○腹滿者去尤加附子壹枚炮去皮破陸

片

徐云此腹滿

○服湯後

加此總論不拘何法減與否皆然也

如食頃飲熱粥一升

許微自溫

助徐云桂枝湯飲熱粥欲其藥力以溫之

勿揭衣被

此微自溫之忌海藻外臺作勿發揭衣被發撥假字

霍亂吐利

霍亂吐利不止者主之

霍亂吐利

霍亂吐利不止者主之

霍亂吐利

霍亂吐利不止者主之

霍亂吐利

霍亂吐利不止者主之

霍亂吐利

霍亂吐利不止者主之

傷寒雜病論章句

傷寒雜病論章句

治中圓

以四物依兩數擣篩為末蜜和圓如雞子黃大以沸湯數合和一圓

研碎溫服日三夜二服○腹中未熱據此知腹中寒益至三四圓以

為然不及湯徐云治中圓及湯本屬一方○外臺三十一引仲景治

度然不及湯中圓作右四味擣篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五

肉忌桃李雀差後喜唾久不了了者胃上有寒飲也當以圓溫之宜此圓

治中去朮加桂〔枝〕湯

桂枝肆兩

加入治中湯中去朮

右四味煮服法同

霍亂不渴者即齊上築齊上築者腎氣動也當先治氣此主之已見上加減法中

桂枝人蔘湯

此治合病與合方通但意重在治中故次於此

桂枝去皮肆兩

翼方作壹兩

加入人蓯湯中

右五味以水九升先煮四味

人蓯乾薑甘草尤

取五升去滓

一無去滓二字

內桂更

煮取三升

徐云桂獨後煮欲其於裏證藥中越出於表以散其邪也

去滓溫服一升日再夜一

服

大陰兼陽經病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下否堅表裏不解者主之

〔厚〕樸〔生〕薑甘〔草半〕夏人蓯湯

徐屬寫心

厚樸炙去皮

生薑切各半斤

甘草炙貳兩

半夏洗半升

人蓯壹兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

二陽併病發汗後腹張滿者主之

枳〔實〕朮湯

枳實柒枚炙

朮貳兩外臺八作叁兩

右二味㕮咀以水五升外臺七作八卷亦作一作一斗煮取三升去滓分溫三服○

腹中輒多一作以濡字代即當散也外臺七字八卷引備急下有忌桃李雀肉等

大夫方蓋姚集驗收此方也氣分心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此主之

枳〔實〕芍〔藥〕散

枳實燒令黑勿大過

芍藥各等分

右二味杵為散服方寸匕日三服○并主癰膿△大麥湯下之此總

言也湯一作粥一無大字

產癰膿主之
後腹痛煩滿不得臥此主之

珍傲宋版印