

太醫院吏目金谿雲龔廷賢子才編

同邑後學國亮登元記

瘧疾

脈瘧脈多弦弦而數者多熱宜汗之弦而遲者多寒宜溫之弦而緊實者宜下之弦而虛細者宜補之弦而實者宜吐之弦短者多食弦滑者多痰瘧脈遲緩者病自愈久瘧不愈者脈必虛宜養正去邪

夫瘧者因外感風寒暑濕內傷飲食勞倦或飢飽色慾過度以致脾胃不和痰留中脘然無痰不成瘧脾胃屬土有信來去不失其時若多時或早或晚者是邪無容地瘧將好也瘧疾來時呵欠怕寒手足冷發寒戰大熱口渴頭痛腰痛膝骨節酸疼或先寒後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或寒少熱多一日一發受病淺也容易治間日發者或二日連發住一日者皆難痊治宜在表無汗者散邪湯為主有汗者正氣湯為主在半表半裏者柴芩湯為主分利陰陽而未已者人參養胃湯加減後方可截之若用截藥吐出黃膠水者瘧自愈也不可一兩日早截早則邪氣閉塞而成壞症又不可遲截遲則元氣衰憊而成虛怯當在三四次就截為好須待熱退身涼方可飲食也切不可帶熱飲食恐不消而成痞一名瘧母痞散成鼓者有之矣

大凡瘧初起者散邪正氣為先也 無汗要有汗散邪為主

○散邪湯 治瘧疾初發增寒壯熱頭痛身痛無汗 川芎 白芷 麻黃 白芍 防風 荊芥 紫蘇 羌活 甘草 右剉一劑生薑三片葱白三根水煎去渣露一宿次早溫服○有痰加 陳皮有濕加蒼

朮○夾食加香附○有汗要無汗正氣為主

○正氣湯 治瘧疾初發增寒壯熱頭痛口乾有汗 柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏 麥門冬 枳榔 草果 青皮 茯苓 桂枝 甘草 右剉一劑生薑三片葱白三根水煎去渣露一宿次早溫服○有痰加 陳皮有濕加蒼

○柴苓湯 治瘧發寒熱病在半表半裏陰陽不分 柴胡 黃芩 人參 半夏 豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂 甘草 右剉一劑生薑三片棗一枚水煎服 無汗加麻黃 有汗加桂枝 寒多加官桂 熱多加黃

芩

虛人患瘧者養正邪自除也

○人參養胃湯

治暴瘧初起服二帖後用人參截瘧飲加減截之

人參 茯苓去皮

陳皮 半夏姜汁

厚朴

姜汁

烏梅一箇

蒼朮浸汁

藿香 當歸

川芎

草果去壳各

甘草三分

右剉一劑生薑三片大棗一

枚水煎溫服 寒多加官桂

熱多加柴胡

汗多去蒼朮藿香川芎加白木黃芪 飽悶加青皮砂仁去人

參 渴加麥門冬知母去半夏

瀉加炒白木芍藥瀉不止加肉豆蔻去厚朴草果 嘔噦加白木山藥炒砂

仁炒米去草果厚朴蒼朮

痰多加貝母竹瀝去半夏草果 內熱盛加炒黃芩去半夏 長夏暑熱盛加香

薤扁豆去半夏藿香

○人參竹瀝飲

治虛瘧昏倦汗多痰盛舌大語言混雜不清脉虛大無力

人參去

白木去

茯苓去

當歸

生地黃 烏梅一箇

酸棗仁炒

麥門冬去

知母

陳皮

芍藥錢一

甘草三分

右剉一劑生薑三片棗

一枚水煎入竹瀝半盞薑汁少許同服

風暑入陰在臟者瘧瘧也

○柴胡芎歸湯

治夜間陰瘧引出陽分則散後服人參截瘧飲止之

柴胡

桔梗去

當歸

川芎

芍藥

人參 厚朴姜汁

白木去

乾葛

茯苓去

陳皮錢一

紅花分

右剉一劑生薑一片棗二枚烏梅一

箇水煎食遠服

人參者截補兼用也

○人參截瘧飲

治虛人截瘧一切瘧疾並可截之

人參

白木去

茯苓去

當歸

青皮去

厚朴姜汁

柴胡 黃芩

知母去毛各

桂枝分

常山浸

草果去壳各

龜甲醋炙

烏梅一箇

甘草分

右剉一

劑生薑一片棗二枚桃腦七箇水煎露一宿臨發日五更空心溫服渣待日午再煎服糖拌烏梅下藥切忌雞魚

豆腐麪食及房勞怒氣戒之即瘥○此方俱照前人參養胃湯後開治加減法相同截瘧飲加酒少許尤妙

人壯盛者宜單截也

○不二飲

治一切新久寒熱瘧疾一劑截住神效

常山

檳榔

要一雄一雌者重

知母

貝母各等

右剉

每八錢酒一鍾煎至八分不可過熟則不致露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎藥

○常山七寶飲 治壯健人瘧疾可截之 常山 草果去殼 檳榔 青皮去穢 厚朴姜汁 知母 蒼朮米泔製

鹽甲錢一 烏梅箇 甘草分三 右剉一劑生薑一片桃腦七箇水煎入酒少許露一宿臨發日五更溫服于間

渣再煎服○汗多加白朮去蒼朮○熱多加柴胡黃芩○寒多加桂枝○口渴加麥門冬天花粉○痰多加貝母

瘧久不止者先截而後補也

○如聖飲 人參錢三 常山錢三 丁香二十箇 甘草分三 右為細末用好酒一鍾烏梅一箇煎熟露一宿臨發日五

更溫服用糖拌烏梅下藥時時可食之

○雄黃截瘧丸 人言錢一 雄黃錢三 辰砂錢三 甘草錢二 萊豆粉一兩 右藥各為細末用萊豆粉打糊為丸如

白豆大外用朱砂為衣臨發日五更并花水吞服二九小兒一九勿多服

瘧已後者須調養血氣也

○參歸養榮丸 治瘧疾截住後日此湯藥調養血氣 人參 當歸 茯苓去皮 白朮去心 陳皮 熟地黃 砂

仁 厚朴姜汁 山藥炒 蓮肉炒 芍藥酒浸 甘草炙各分 右剉一劑大棗二枚水煎溫服○瘧熱虛汗加

黃芪去砂仁

服中有塊者瘧母也 凡瘧發時切不可帶熱飲食恐不消而成痞塊瘧散成鼓者有之矣

○參歸鼈甲湯 治老瘧腹脇有塊成瘧母 人參分五 青皮去穢 黃芪蜜水炒 鼈甲炙醋 當歸酒洗 茯苓 白朮

去蘆 厚朴姜汁 香附 撫芎各八分 砂仁 山查去子 枳實麩炒各五分 甘草分三 右剉一劑生薑一片棗二

枚烏梅一箇水煎食前溫服○如梨丸藥加阿魏醋煮化和前藥末再用水錯少許打糊為丸如梧桐子大每服

三十九空心米湯吞下

○十將軍丸 治久瘧不瘥有瘧母者 三稜炮 莪朮生 青皮去穢 陳皮白 草果去殼 砂仁 檳榔 烏梅

肉 半夏炮七次 常山酒蒸 右先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味

藥同浸至晚入瓦鉢內炭火煮取出晒乾若無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每服三四

十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥酸鹹油膩麪食炙烤諸死毒物服至四兩至八兩即除根凡有積聚及煙瘴濕地方更宜服之一方加白朮香附醋炒各一兩

一平素虛弱兼以勞役內傷夾感寒暑以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣用補中益氣湯加黃芩芍藥半夏有汗及寒重加桂枝焙黃芪熱甚焙柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉

大凡久瘧多屬元氣虛寒益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰

慄泄瀉手足厥冷皆脾胃虛弱但服補中益氣湯其諸症悉愈

方見補益

大抵久瘧氣血俱虛而三日一發者用十全大補湯益邪氣在陽分者淺而易治在陰分者深而難治

方見補益

婦人

瘧後形體骨立發熱惡寒自汗盜汗胸膈痞滿日飲米湯少許服參朮藥益服臥床半年矣余以為陽氣虛寒用大劑補中益氣加附子一錢二劑諸症漸退飲食漸進又二劑全愈

方見補益

痢疾

脉痢脉多滑按之虛絕尺微無陰瀉則少血沈細者生洪弦者死

痢疾不分赤白俱作濕熱治之明矣赤屬血白屬氣赤白相兼膿血雜痢皆因脾胃失調飲食停滯積於腸胃之間多其暑濕傷脾故作痢疾起於肚腹疼痛大便秘急後重小水短赤不長身涼脈緩者易治身熱脈弦急者難治痢疾初起一二日元氣壯實者先用玄白散虛弱者用芍藥湯疎通積滯三四日以後元氣漸弱調和飲食加減治之如不止服參歸芍藥湯調理脾胃補益元氣久不愈方可服真參養臟湯加減治之切不可驟用粟穀等藥止寒太早恐內積氣未盡成休息痢亦恐毒攻上胸腹飽悶作疼惡心嘔噦發呃難治因毒氣攻胃故也先水瀉後膿血者是腎傳脾難愈先膿血後水瀉者是脾傳腎易愈又有痢下鮮血者如屋漏色者如屋漏水者大孔如竹筒者嘔噦發呃煩燥身熱者俱難治也如魚腦髓者身熱脉數大半生半死也大抵治痢疾一二日元氣未虛治宜疎通積滯此通因通用之法三四日後不可疏通恐元氣虛也當清熱解毒調養脾胃為主經云行血則便膿自愈調氣則後重自除若大腸積滯壅實而後重法當疏通之若大腸氣為下陷而後重法當升補之初下痢者不分赤白皆濕熱也壯盛人初痢宜利之

○玄白散 治痢疾初起裏急後重腹痛膿血窘迫壯盛人一劑即愈 牽牛赤利用黑白痢用白赤白相 生地

黃 赤芍 歸尾 枳榔 枳殼去穢 我朮煨 黃連各二錢 大黃二錢 著月加香需炒一錢 右剉一劑水

煎空心溫服以利二三次為度○虛弱人初痢宜清之

○芍藥湯 芍藥錢一 木香錢一 當歸錢一 枳殼去穢 枳榔錢一 黃芩去朽 甘草五分 右剉一劑水煎溫服

下痢稍久者宜調和也○調和飲 白芍錢三 當歸錢一 川芎錢二 黃連錢二 黃芩錢一 桃仁錢一 升麻五分 右剉

一劑水煎空心服○如紅痢依本方○如白痢用吳茱萸一錢茶連用酒炒○赤白痢加白朮茯苓陳皮香附各錢

痢因熱積而氣滯者宜清熱順氣也

○立效散 治赤白痢疾膿血相兼裏急後重疼痛一服立止 淨黃連四兩酒洗吳茱萸三兩同炒去茱萸不用 陳枳殼二兩去穢

右二味為細末服三錢空心黃酒調下瀉瀉米湯下○噤口痢陳倉米湯送下

下痢發熱不退者腸胃中有風邪也

○倉廩散 治痢疾赤白發熱不退腸胃中有風邪熱毒及時行溫疫沿門闔境皆下痢噤口者服之神效 即人參敗毒散加黃連陳倉米三百粒薑棗煎服 如痢後手足痛加枳榔木瓜 噤口痢加陳倉米一撮石蓮肉炒

下痢發熱使閉者表裏有實熱也

○六一順氣湯方見傷寒 治痢不問赤白相雜肚痛裏急後重渾身發熱口乾發渴用此通利即止

下痢噤口不食者脾虛胃熱甚也○參連湯 人參五錢 黃連二兩 右剉一劑水煎終日時呷之如吐再強飲但得

一口呷下咽喉即好加石蓮肉三錢尤效外以田螺搗爛盒臍中引藥下行故也

○開噤湯 治噤口痢疾 徐元濟傳 砂仁錢一 砂糖七錢 細茶錢五 生薑五片 右剉一劑水二鍾煎至八分

露一宿次早面北溫服外用木剉子二錢去殼麝香二分共搗置臍中即思食

一方 治噤口痢米穀不下者神效用石蓮肉為末每服二三錢用陳倉米湯調下即效嘔加生薑汁二三匙

下痢久不止者宜調養氣血兼升滯也

○參歸芍藥湯 治痢久一二十日痢多不止用此調養氣血自愈 人參錢一 當歸酒洗 茯苓 白朮錢一 砂

仁分七 山藥炒 陳皮各一錢 甘草分五 右剉一剉烏梅一箇燈草一團蓮肉七箇水煎溫服晚後加減

噤口痢不食者胃口熱極故也 加炒黃連蓮肉人參炒米烏梅清熱開胃為主

下痢腹痛裏急後重者是熱積氣滯也○又云裏急者腹中不寬快也亦有虛坐而大便不行者皆血虛也血虛則裏急後重如四物湯之類治之加木香檳榔和消積氣則後重自除

久痢後重不除者虛氣墜下也○治痢用下藥揆積仍後重者乃陽不升也用升麻為君 加人參當歸芍藥為君升麻少許提氣

大凡痢作痛者熱流下也 加炒芍藥清之 痢後發熱不止或積少但虛坐努力者俱是血虛故也 倍加當歸芍藥地黃滋養陰血其熱自安

積中有紫血者是瘀血也 加芍藥紅花生血和之則便血自愈 痢下如菰豆汁者是濕也 加蒼朮白朮滲濕利小便

○寶腸散 治久痢去多不分赤白用此末藥換此黃蘗末 乾山藥炒黃色一兩 好蓮肉炒去心一兩 炒黃米一合 右共為細末用砂糖調熱湯和勻前藥末不乾不稀漸漸調服後用清米湯嗽口常服之最效

○湯泡散 治久痢不愈無分赤白俱可服 粟殼蜜水炒三錢 烏梅一箇去核 甘草分三 蜜三匙 右剉碎用滾水一鍾泡浸一時去渣三次服之

○真人養臟湯 治大人小人冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疼痛或脫肛下墜酒毒便血皆治之 肉桂五錢 人參五錢 當歸 訶子微去 木香 甘草炙 肉豆蔻麩裏煨各一錢 芍藥炒 白朮各一錢 枳殼蜜炙 右剉一剉水煎食前溫服○臟寒者加附子一錢製○痢疾日久不愈不能起床不思飲食瘦弱之甚者用補中益氣湯去柴胡加炒芍澤瀉木香砂仁白朮地榆栗殼醋炒

大抵久痢不止多屬血氣虛弱宜用八珍湯若脾氣虛而血弱者用四君子湯皆胃氣虛而血弱者用補中益氣湯大凡此症久而不愈或變症百出俱守前法久之自愈

一血痢及下血久不止用六味丸加地榆阿膠黃連黃芩生地黃已上四方俱是補益

補遺方

○狗皮膏 貼瀉痢如神 乳香錢五 沒藥錢五 木別子十箇 柳枝四十九節 杏仁四十箇 桃枝四十二指 右

用香油七兩將木別子以下四味入油煤浮撈起渣從下好黃丹飛過三兩熬將成膏用槐枝不住手攪滴水成珠退火再入乳香沒藥加麝香一分攪勻退火毒以狗皮攤膏貼臍上

○瀉痢膏 赤石脂兩四 訶子兩四 嬰粟穀兩四 乾薑兩五 右以上為細末用麻油二斤四兩熬去四兩止吊二斤

再熬入上好飛黃丹一斤熬黑色滴水成珠方入後四味藥龍骨二兩乳香五錢沒藥五錢麝香一錢俱為細末入內攪勻退火出火毒攤貼臍上每一箇重三錢冬月可加肉菴五錢

○秘方 治痢久不愈者用白蘿蔔取汁一鍾蜜一鍾共煎滾勻調溫服立止○又方用陰乾陳久蘿蔔葉煎湯服之止痢如神○又方用大團魚一箇水煮去腸甲加生薑七片砂糖一小塊不用鹽醬少入米粉作羹吃一二碗

其痢立止

大司寇春岡劉公年近古稀患痢腹血腹痛諸醫弗效余診六脉微數此肥甘太過內有積熱當服酒蒸大黃一兩

清利之公曰吾衰老恐不能惟滋平和之劑可也余再四寬釋公意始從遂服之適日而愈○一通府竹峰何公患

痢赤白晝夜無度遍身瘙癢心中煩燥予診六脉大數余曰數則心煩邪熱毒也以人參敗毒散加防風荊芥黃

連去人參二服即愈又診六脉仍前大數余曰數則心煩大則病進將來必有痰喘之患不起後適月果如其言

○一人痢後兩足浮腫胸膈脹滿小便短少用分利之劑遍身腫兼氣喘余曰兩足浮腫脾氣下陷也胸膈脹滿

胃虛作痞也小便短少肺氣不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補中益氣加附子而愈半載後因酒食勞

倦兩目浮腫小便短少仍服前藥頓愈方見補益

泄瀉

脉瀉脉自沈沈遲寒侵沈數火熱沈虛滑脫暑淫緩弱多在夏月

泄瀉之症只因脾胃虛弱飢寒飲食過度或為風寒暑濕所傷皆令泄瀉治須分利小便健脾燥濕為主若泄太多

而不止者當用補住為要若瀉不止手足寒脉虛弱煩燥發呃氣短目直視昏冒不識人者皆死症也若泄瀉初

起不可就用補恐寒積氣未盡而成腹疼飽悶惡心煩燥發呃而免直待瀉去四五次方可補佳此大法也
泄瀉清濁不分者瀉多成五瀉也

○胃苓湯 治脾胃不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分 蒼朮米泔 厚朴姜汁 陳皮 猪苓 澤瀉 白朮

去皮 茯苓去 白芍煨各 肉桂 甘草炙各 右剉一劑生姜桑子煎空心溫服○水瀉加滑石○暴痢赤

白相離腹痛裏急後重去肉桂加木香枳榔黃連水煎服○久瀉加升麻○勝濕加防風升麻○食積加神麴麥

芽山查 氣虛加參朮

寒泄者悠悠腹痛瀉無休止色青脉沈遲是也

○理中湯 治寒瀉症 人參 白朮去 乾姜炒各 官桂 甘草炙各 陳皮 藿香 茯苓去 良姜各七

烏梅一 右剉一劑生姜三片棗二枚燈草一團水煎溫服○寒極手足冷脉沈細加附子去良姜官桂○腹

痛加厚朴砂仁木香去人參○嘔噦惡心加丁香香半夏去良姜官桂○瀉不止加蒼朮山藥○瀉多不止加肉蔻

訶子附子去良姜官桂○虛汗加黃芪去藿香官桂○飽悶加厚朴砂仁去人參良姜官桂

火瀉者腹中痛一陣瀉一陣後去如湯後重如滯瀉下赤色小水短赤煩渴脉數是也即火瀉也

○四苓湯 治火瀉熱瀉 茯苓 白朮 猪苓 澤瀉 蒼朮炒 山藥 芍藥 山梔炒 陳皮各一 甘草

分五 烏梅一 右剉一劑燈草一團水煎溫服○飽悶加厚朴砂仁去山藥○腹痛加厚朴砂仁木香茴香去

白朮○嘔噦惡心加藿香烏梅蓮肉砂仁人參○小水短赤加木通車前去澤瀉○口燥煩渴加黃連麥冬蓮肉

烏梅乾姜去澤瀉蒼朮○瀉多元氣虛脫昏倦加人參黃芪去澤瀉蒼朮○夏月暑瀉加香薷扁豆○瀉多煩燥

加炒黃連人參辰砂烏梅去蒼朮澤瀉○瀉多不止加肉蔻烏梅人參去澤瀉山梔○發熱脈數加柴胡炒黃芩

暑瀉者夏月暴瀉如水面垢脉虛煩渴自汗是也

○香薷飲方見 依本方加人參白朮茯苓白芍陳皮甘草炒米一撮烏梅一箇燈草一團煎服

濕瀉者瀉水多而腹不痛腹響雷鳴脉細是也

○五苓散 治濕瀉症 官桂 甘草炙各 茯苓去 白朮去 猪苓 澤瀉 山藥 陳皮 蒼朮米泔 砂

仁炒

肉菴麩炒煨
捶去油

訶子煨去核
各八分

右剉一剉生姜一片烏梅一箇燈心一團水煎溫服照前理中湯同前

風瀉者瀉而便帶血脈浮弦是也

○胃風湯 治風冷乘虛容於腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血並

治有效 當歸 川芎 白芍炒 人參 白朮去 茯苓去 肉桂各等 右剉一剉入粟米一撮水煎溫服

食積瀉者腹疼甚而瀉瀉後痛減脈弦是也 香砂平胃散 依本方去枳殼加白朮茯苓

痰瀉者或多或少或瀉或不瀉脈沈滑是也

二陳湯 治痰瀉症 陳皮 半夏煨汁 茯苓去 白朮去 蒼朮米泔 砂仁 山藥炒 車前 木通

厚朴煨汁 甘草各等 右剉一剉生姜三片烏梅一箇燈草一團水煎溫服○瀉不止加肉菴訶子去厚朴

○照香砂六君子湯加減相同○炙滑瀉不止百會一穴天樞二穴中腕一穴氣海一穴

虛瀉者飲食入胃即瀉水穀不化脈微弱是也

○參苓白朮散 治氣虛泄瀉 肉菴煨去 甘草炙 人參 白朮去 茯苓去 山藥炒 砂仁研 藿香

陳皮 乾姜炒 蓮肉去心 訶子煨各等分 右剉一剉生姜一片燈心一團水煎服○嘔噦惡心加半夏烏梅

若元氣虛脫昏倦加黃芪升麻少許去砂仁藿香○飽悶加厚朴去肉菴訶子○小水短澀加木通車前去乾姜

○瀉甚不止加炒蒼朮烏梅熟附子少許

脾瀉者食後到飽瀉去即寬脈細是也

○香附六君子湯 治脾瀉症 香附炒 砂仁 厚朴煨汁 陳皮 人參 白朮去 芍藥炒 蒼朮炒 山

藥炒 甘草各等 右剉一剉姜一片烏梅一箇水煎溫服○腹痛加木香茴香去人參山藥○渴加乾葛烏

梅○小水赤短加木通車前○嘔噦惡心加藿香烏梅半夏○夏月加炒黃連白扁豆○冬月加煨乾姜去芍藥

滑瀉者日夜無度腸胃虛寒不禁脈沈細是也即滑也

○八柱湯 治腸胃虛寒滑瀉不禁 人參去 白朮去 肉菴煨 乾姜炒 訶子煨 附子麩裏煨
去皮臍 粟殼炒

甘草炙各等分 右剉一剉生姜一片烏梅一箇燈草一團水煎溫服 照前理中湯加減相同

○溫脾散 治久瀉米穀不化水穀入口即時直下元氣冷滑脫 黃芪炒 人參炒 白朮炒 白茯苓皮

山藥炒 乾姜炒 訶子煨 肉蔻煨 粟穀炒 草果炒 丁香 肉桂 大附子蜜 黃連炒 砂

仁 陳皮 厚朴姜汁 甘草炙 右剉一劑姜蜜煎空心服

○八仙糕 治脾胃虛損洩瀉不止理脾胃消飲食最益老人小兒 枳實炒 白朮炒 白茯苓皮

陳皮炒 乾山藥四 蓮肉去心 山查肉 揀參一兩 右為末用白粳米五升糯米

一升半打粉用蜜三斤入藥末和勻如做糕法先就籠中割小塊蒸熟取出火烘乾瓦罐收貯封固取三五斤食

之以白湯嗽口

因內傷勞倦飲食化遲作瀉及脾胃素蘊濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沈困泄瀉者用補中益氣湯去

當歸加芍藥茯苓蒼朮猪苓澤瀉姜朮煎服方見

凡泄瀉病誤服參芪等甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而為疽矣惟用苦寒瀉濕熱苦溫瀉濕寒則

愈泄止後脾胃虛弱方可用參芪等藥補之濕熱宜用茵陳五苓散方見中暑

一腎虛久瀉不止用六味丸加五味子破故紙肉豆蔻吳茱萸若久瀉脾胃虛寒不禁者用六君子湯加炮乾

若命門火衰而脾土氣寒者方見補益 若脾腎氣血俱虛者用十全大補丸 若大便滑利小便閉澀或肢體漸

腫喘嗽唾痰為脾胃虧損用金匱加減腎氣丸方見補益

大抵久瀉多因泛用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久泄若非補中益 瀉四神丸滋其本源後必

胸痞腹脹小便淋漓多致不起

○四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄痢腹痛等症兼治腎泄清晨瀉泄一二次經年不止者破故紙

浸四兩 吳茱萸二兩 肉豆蔻二兩 五味子二兩 右為細末用生薑八兩切片同煮一百粒煮爛去

姜取棗肉為丸如梧桐子大每服一錢半淡鹽湯送下○一方去吳茱萸五味子加木香茴香炒各二兩○治泄瀉三五年不愈者惟灸百會穴五七壯即愈

補遺方

○又方 治瀉痢 蓮肉二兩 為末 五更空心無根水調服忌半日勿飲食仍忌葷醒生冷一切

當歸八分 厚朴去皮姜炒六分 陳皮八分 猪苓 澤瀉各七分 柴胡 升麻各五分 防風去芦六分 甘草炙四分 久

○參朮健脾丸 滋養元氣補理脾胃益腎水溫下元進飲食調中下氣臍腹冷痛泄瀉年久不止此藥補溫脾胃

除寒濕大補諸虛 蒼朮浸二雨醋浸二雨葱白炒 人參 白朮去芦 白茯苓去皮 乾山藥炒 破故紙炒酒

枸杞子去核
兔絲子酒製
蓮肉去心各二兩
川練子肉取
五味子
川牛膝去芦半
川椒炒去目
小茴香炒

陳皮 木香不見火 遠志甘草水去心各五錢 右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服八十丸空心鹽湯送下以乾

物厭之

霍亂

脉霍亂吐瀉滑而不勻或微而濇代伏驚人熱洪滑弦食論

夫霍亂者有濕霍亂有乾霍亂皆是內傷飲食生冷外感風寒暑濕而成濕霍亂者忽時心腹疼痛或上吐或下瀉

或吐瀉齊作攪亂不安四肢厥冷六脉沈欲絕此名濕霍亂俗云虎狼病因風則怕風有汗因寒則怕寒無汗因

暑則熱煩燥悶因濕則身體重著因食則胸腹飽悶治用正氣散加減若吐瀉煩燥不止厥冷痛甚轉筋入腹者

死夏月因伏暑熱伏暑霍亂吐瀉者甚多手足雖厥冷脉雖虛小切不可用姜附熱藥治在暑症香薷飲內治之

有乾霍者亂最難治死在須臾俗云攪腸沙忽然心腹絞痛手足厥冷脉沈細或沈伏欲吐不得吐欲瀉不得瀉陰

陽乖隔升降不通急用鹽湯探吐及刺委中穴出血治用理中湯加減慎勿用米湯補住邪氣難治直待吐瀉後

方可用清米湯補接元氣若吐瀉不出胸腹脹硬面唇青手足冷過肘膝六脉伏絕氣喘急舌短囊縮者死症也

濕霍亂者吐瀉腹痛脉沈伏欲絕也

○藿香正氣散 治四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利中暑胃風吐瀉中濕身重泄

瀉或不服水土脾胃不和飲食停滯復感外寒頭痛增寒或嘔逆惡心胸膈痞悶或發熱無汗者並皆治之

香

紫蘇

陳皮

厚朴

半夏

白朮

茯苓

桔梗

大腹皮

白芷

甘草

一錢

右

一劑

生薑

右判一劑生薑煎溫服○霍亂轉筋加木瓜○腹痛加炒芍藥寒痛加官桂冷甚加乾姜○飲食不化心下痞

悶加香附砂仁米穀不化加神曲麥芽○肉食不化加山楂○心下痞加枳實青皮○中暑胃風加香薷扁豆○

時氣增寒壯熱加柴胡乾葛○發熱加麥門冬淡竹葉○口渴作泄小便不利合五苓散○濕熱相搏霍亂轉筋

煩渴悶亂合黃連香薷散心腹絞痛加水香○若頻欲登圜不通利者加枳殼

夏月暑熱霍亂者吐瀉煩渴自汗脉浮也○香薷飲

方見

夏月暑熱明知多食生冷瓜果麪食却於風涼處坐卧以致飲食停滯胸腹飽脹作痛或吐或瀉手足冷脉沈細

或伏暑是濕霍亂用前正氣散內加減治之不可作夏月伏暑霍亂吐瀉口渴腹脹煩燥自汗面垢脉虛躁不寧

者此是伏暑霍亂也香薷飲加減治之

乾霍亂者心腹飽脹絞痛不吐不瀉脉沈欲絕也

先用鹽湯探

○理中湯 治乾霍亂心腹飽脹絞痛不吐不瀉脉欲絕

藿香

蒼朮

厚朴

砂仁

香附

木香

右

一劑

枳殼

陳皮

甘草

乾姜

官桂

右

一劑

生薑

三片

水煎

磨木香調服

夏月乾霍亂

不吐不瀉

胸腹絞痛煩悶自汗不可用姜桂

○心腹絞痛面唇青手足冷脉伏欲絕加附子茴香去蒼朮

飽悶硬痛結實者加枳榔枳實山查瓜蒌蘿蔔子去甘草枳殼蒼朮○胃寒嘔噦發呃加丁香茴香香附良姜去

官桂甘草蒼朮○虛汗加附子去蒼朮○外用炒生薑渣揉法急用鹽湯探吐得物出為好及刺委中穴血出

霍亂吐瀉止後發熱頭疼身痛口乾脉數者

○參胡三白湯

人參

柴胡

白朮

白茯苓

白芍

當歸

陳皮

麥門冬

五味子

山

梔子

甘草

烏梅

右

判一劑

生薑

煎溫服

有異鄉人初到地方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜服

○加減正氣散

香附

半夏

甘草

藿香

蒼朮

厚朴

陳皮

砂仁

右

判一劑

生薑

煎溫服

有異鄉人初到地方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜服

○加減正氣散

香附

半夏

甘草

藿香

蒼朮

厚朴

陳皮

砂仁

右

判一劑

生薑

煎溫服

有異鄉人初到地方不服水土或吐或瀉胸腹飽悶或腫脹不吐瀉者宜服

○加減正氣散

香附

半夏

甘草

藿香

蒼朮

厚朴

陳皮

砂仁

右

三片棗一枚燈心一團水煎溫服○瀉加白朮炒山藥烏梅炒米○嘔吐同上○服痛加木香茴香○飽悶加益智仁大腹皮○發腫氣喘加蘇子桑白皮木通猪苓大腹皮木香去甘草○小水短赤加木通猪苓山柃車前去甘草半夏○胸腹飽脹或四肢浮腫如不吐瀉者加蘿蔔子枳殼大腹皮木通去半夏甘草○內熱煩渴加葛根黃連山柃烏梅去半夏甘草○內寒手足冷脉沈細加乾姜官桂

補遺方

○治霍亂吐瀉 用菰豆粉和白砂糖少許服之即愈

○乾霍亂不得吐者 用淡湯一碗入皂角末三分盪一撮調服探吐之慎勿與米湯吃反助邪氣則難治矣

○治霍亂吐瀉 乾姜 胡椒 胡黃連各三 菰豆粉五分 右為末每服三分沸湯點服

○陰陽湯 用井水和百沸湯各半碗同服如神

○洗法 治霍亂轉筋蓼一把去兩頭水煎薰洗

○灸法 治霍亂已死腹中有煖氣者用鹽納臍中灸七壯

嘔吐

脉嘔吐無他寸緊滑數微數血虛單浮者薄芤則有瘀最宜濡弱

嘔吐者有聲有物胃氣有所傷也

○保中湯 治嘔吐不止飲食不下 藿香梗 白朮去芦各一錢 陳皮 半夏製 白茯苓去皮各八分 黃連炒土 黃

芩去土炒 山柃子姜汁炒各一錢 砂仁分 甘草分 右剉一劑生姜三片長流水和膠泥澄清二鍾煎至一鍾稍

冷頻服

嘔噦清水冷涎脉沈遲者是寒吐也

○理中湯 治胃寒嘔吐清水冷涎 人參 茯苓去皮 白朮去芦 乾姜炒 陳皮 半夏姜汁炒 丁香 藿香

砂仁炒 官桂各二 右剉一劑生姜三片烏梅一箇水煎徐徐溫服○寒極手足冷脉微吐不出者加附子去官桂

○煩燥加辰砂炒米

煩渴脉數嘔噦者是熱吐也

○黃連竹茹湯 治胃熱煩渴嘔吐 黃連姜汁 山桅炒 竹茹各一錢 人參五 白朮去 茯苓去 陳皮

白芍炒 麥門冬 甘草三 炒米微 發熱加柴胡右判一劑烏梅一箇棗一枚水煎徐徐溫服

嘔噦痰涎者是痰火也

○二陳湯 治痰嘔吐也 陳皮 半夏姜 茯苓去 甘草 加人參 白朮 竹茹 砂仁 山桅炒 麥門

冬 等分 烏梅一 右判一劑姜三片棗一枚水煎不拘時徐徐溫服

水寒停胃嘔吐者宜燥濕也

○茯苓半夏湯 治水寒停胃嘔吐 茯苓去 半夏姜汁 陳皮 蒼朮姜汁 厚朴姜汁 砂仁五 藿香

分 乾姜三 烏梅一 甘草三 右判一劑水一鍾生薑三片煎至六分不拘時徐徐溫服

飽悶作酸嘔吐者是停食吐也○香砂平胃散 治停食嘔吐傷寒

久病嘔吐者胃虛不納穀也

○六君子湯 治久病胃寒嘔吐 半夏姜汁 陳皮各八 甘草三 人參去 白朮去 茯苓去 白芍炒

山藥炒 當歸各一錢 藿香 砂仁各五 蓮肉十 烏梅一 炒米百 右判一劑生薑三片棗一枚水煎

徐徐溫服

惡心者心中兀然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔此為惡心非心經病病在胃口有寒有熱有痰火有胃虛有停食有

水飲與嘔吐同治法○梁太府乃因患頭暈嘔吐聞藥即嘔諸醫束手余以伏龍肝為末水丸塞兩鼻孔用保中湯

以長流水入膠泥攪澄煎稍冷頻服之而安○信陵府桂臺殿下夫人患因性氣不好一怒即便嘔吐胸膈不利

煩燥不睡腹痛便閉食下即吐已經八日心慌喘急垂危後事已備舉家哭泣召余診六脉虛微此血虛胃弱氣

鬱痰火也以二陳湯加姜連酒芩炒桅當歸酒芍香附竹茹白芍入竹瀝姜汁二服而安

翻胃

脉治霍亂吐瀉緊用藁豆粉白砂糖少許服之即愈度浮瀉脾積浮弱虛氣瀉小血弱若瀉而沈七情所搏○夫膈

噎膈胃之症皆由七情太過而動五臟之火薰蒸津液而痰益盛脾胃漸衰飲食不得流行為膈為噎為翻胃也
丹溪云年高者不治蓋年少之人氣血未虛用藥却去痰雖得暫愈其病立復所以然者氣虛則不能運化而生
痰血虛則不能滋潤而生火也又云此症切不可用香燥之藥而厚滋味蓋症屬熱燥故不可用香燥之藥香能
散氣燥能耗血滋味能助火而生痰也粗工不識病原但見斯疾便以峻劑投之而取刻效以圖厚貲不思病危
復而不救可不歎哉○大凡膈噎翻胃不可服辛熱香燥最能耗血糞如羊屎者不治大腸無血故也口吐白沫
者不治氣血俱憊故也

翻胃者胃虛吐食而不納也

○安胃散 人參分五 白朮分三 茯苓去皮 山藥炒 當歸半夏姜汁 藿香各一錢 砂仁分五 黃連姜汁 蓮

肉各八分 陳皮錢一 甘草分三 右剉一劑生薑三片棗一枚烏梅一箇水煎溫服

順氣和中湯 治嘔吐翻胃嘈雜昏酸痞悶噎氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰水 陳皮鹽水浸 半夏姜汁炒 白

茯苓去皮 白朮炒 枳實麩炒 香附醋炒 砂仁炒 連黃姜汁炒 山柘姜汁炒 神

曲炒 甘草分三 右剉一劑生薑三片長流水膠泥攪澄清水一鍾煎至七分入竹瀝童便姜汁不拘時

細細溫服○如氣虛加黃芪人參各八分○如血虛加當歸七分川芎五分○如氣惱或氣不舒暢加烏藥五分

木香三分○如胸膈飽悶加蘿蔔子炒六分○如心下嘈雜醋心加吳茱萸四分焙黃連白朮○如嘔吐不吐加

藿香梗七分

○太倉丸 治噎膈翻胃脾胃虛弱不思飲食 白豆蔻二兩 砂仁二兩 陳倉米一升黃 為細末姜汁為丸如梧

桐子大每服百丸淡姜湯送下

氣血虛而翻胃者宜攻補兼濟也

○王道無憂散 治翻胃膈噎 麥門冬去心 黃柏人乳炒 當歸 白芍炒 川芎 生地黃各八分 赤芍分五

白朮炒 白茯苓錢二分 赤茯苓 砂仁 枳實麩炒 香附 烏藥 陳皮 半夏姜汁 藿香 檳榔

猪苓 木通 天門冬心 知母炒 人乳 黃芩炒 粉甘草分三 右剉一劑水煎溫服

年老之人陰血枯槁火氣結升而不降飲食不下者乃成膈噎之病也

○當歸養血湯 當歸 白芍炒 熟地黃 茯苓去皮各 瓜蒌去殼 枳實炒 陳皮 厚朴姜汁 香附 貝

母去心 撫芎 蘇子炒各 沈香分 黃連用吳茱萸同炒去 右剉一劑生薑一片棗一枚水煎竹瀝磨沈

香調服

年少之人有患膈噎者胃脘血燥不潤便塞閉而食不下也

○生津補血湯 治年少胃脘血燥故塞 當歸 白芍 熟地黃 生地黃 茯苓去皮各 枳實炒 陳皮

黃連炒 蘇子 貝母去心各 砂仁 沈香各五 右剉一劑生薑一片棗一枚水煎竹瀝沈香服

翻胃因氣惱者宜順氣化痰清火也

○四子調中湯 治翻胃或小便赤大便閉及痰氣壅盛者 青皮五分去 陳皮五分 枳實炒 香附炒 黃

連姜汁 半夏姜汁 瓜蒌仁炒 蘇子炒 白芥子炒 桃仁去皮各 茯苓去皮 木通各一 沈香

芒硝各五 右剉一劑生薑五片水煎稍熱服

○五子散 治氣膈鼓脹噎食 白蘿蔔子 紫蘇子 白芥子各五 山查子去核 香附子去毛各 右各為末

合一處作芥末用

秘方神妙不測者有起死回生之功也

○奪命丹 表一分 麝香一分 孩兒茶分二 金絲黃糖分三 朱砂春二分夏四分 右裹乃土糖裹即蜣螂所滾之

彈丸糞土之下皆有用彈中有白虫者如指大與蟬蟪一樣將彈少破一點蓋住火煨過大黃色存性不要燒焦

放入前藥內并彈共為末燒酒調空心服如覺飢用大小米煮粥漸漸少進一日二三次不可多吃一日徐徐進

一碗半足以慎不可多服多則病復不可治矣忌生冷醬炒厚味葱蒜酒麪炙煨等物及氣惱五十以後一二服

即效○二豆回生丹 治翻胃噎食 菹豆九分 百草霜五錢微火 礞砂二錢 雄黃二錢 乳香一錢 朱砂二錢

黑豆九分 右共為細末用烏梅三十箇取肉和丸如指頂大朱砂為衣每嚙化一九良久將麪餅一箇茶泡

爛與食之不吐乃藥之效若吐再嚙化一九忌油膩鹽醋怒氣房勞