

醫統正脈全書

三四

類證活人書目錄

閩間無求子林慕義山人著述

卷一

中風

卷二

中寒 中暑

卷三

濕門 燥門

卷四

火門

卷五

氣門

卷六

血門

卷七

痰飲

鬱門

發熱

惡寒

卷八

冒風

咳嗽

喘門

卷九

內傷

瘧門

卷十

癆門

卷十一

疽門

水腫

膨脹

卷十二

積聚

卷十三

脾胃

泄瀉

傷食

霍亂

卷十四

嘔吐噦

番胃

噎膈

卷十五

痞滿

惡心

中酸

嘈雜

呃門

噯氣

頭痛

頭風

眩暈

卷十六

心胃痛

腹痛

腸痛

卷十七

腰痛

疝氣

腳氣

卷十八

痛風

斑疹

癆風

腸風

脫肛

卷十九

癰症

癩症

怔忪

卷二十

淋濁

瘡瘍

瘻門

卷二十一

厥門

瘡門

虛損

卷二十二

癆瘵

三消

汗門

遺滑

類證活人書卷十四

無求子著

嘔吐噦門

吐症主方

半夏三錢

陳皮一錢

五分

茯苓

厚朴

薑汁
炒

廣藿香

各一錢

甘草三

分

生薑三

水煎不拘時服

二陳加薑和中治吐順氣消痰所必用厚朴溫中下氣而兼消水穀藿香辛溫辛能散寒溫能治吐外感寒邪兼有寒痰宿食者以表散爲主加防風二錢

蘇葉羌活各一錢五分去茯苓服蘇合丸 內傷生

冷飲食外兼寒邪者以溫消理氣爲主加麥芽二錢

神曲一錢五分蘇防各一錢去茯苓服木香荳蔻丸

蘇合丸

見中寒門寒
中太陰條

木香豆蔻丸 脾胃久弱中氣虛寒則寒痰冷飲壅滯
胸中以致否結不舒快快欲嘔及吞酸倒飽噯腐不
思飲食者宜之

白蔻仁

三兩另末良薑各八錢

丁皮

官桂

丁香

木香

檀香

藿香

三稜

蓬术

三柰

各五錢

甘草

炙黃四兩

陳皮

山楂

香附

薑製各二兩五錢

甘松

三錢

自良薑

至甘松共爲細末另以豆蔻
末爲母水疊丸午前午後薑湯吞服二三錢

嘔症主方

半夏

三錢

茯苓

橘紅

各二錢

廣藿香

一錢

厚朴

枳實

各五分

甘草

二分

生薑

三片

水煎不拘時服

二陳加薑治嘔之聖藥藿朴溫中下氣枳實破滯消
食如兼寒熱往來脉見浮弦而滑者熱症也加柴胡

一錢五分炒黃芩一錢乾葛一錢去藿香無食並去朴實有則仍用。如無寒熱脉弦滑者痰症也加炒白术一錢補脾胃之營氣以去痰之本增枳實五分以行痰之標而去藿朴服橘半枳术丸。如食積疑痰作酸而嘔脈見弦滑而數者加山楂三錢神曲二錢五分薑製黃連一錢消食清火去藿朴不用服芩連橘半枳术丸或和中順氣丸。六脉沉濡軟滑素多濕痰鬱氣者加炒白术一錢五分炒蒼术一錢去枳實。六脉沉微細滑本于胃氣虛弱中寒作嘔者

加炒白术二錢人參一錢炒砂仁五分減半夏之半

去藿朴枳實服香砂健脾丸

橘半枳术丸

見痰飲門
五飲條

苓連橘半枳术丸

見鬱門
痰鬱條

和中順氣丸

見內傷門
食物內傷條

香砂健脾丸

蓋脾之本性喜溫惡寒喜燥惡濕喜香惡臭喜通惡滯若或虛寒不能營運濕痰食積稽留則致飲食不思而難進雖進而難消於是嘔惡吞酸倒飽嘔腐腸鳴泄瀉浮黃腫脹諸症悉起是藥甘溫

香燥從其性而啓發營氣脾胃易於容納使脾速于運化凡男婦小兒中氣不和三腕否悶不舒肢體消瘦無力者皆宜常服

白术

炒黃四兩

陳皮

香附二兩

陳黃米

炒二合

神曲

炒兩

麥芽粉

各兩

木香

薑製各二兩

砂仁

炒各五錢

荷葉湯

疊丸空心白滾湯

吞服二三錢

嘯症主方

半夏

二錢

茯苓

一錢

橘紅

各一錢

黃連

薑炒五分

枳實

各一錢

甘草

二分

生薑

三分片

水煎

不拘時服

胃中痰氣火併結爲病以二陳豁痰利氣枳實破結
滯黃連清鬱火服香連枳朮丸 若陽明邪熱不清
身熱煩渴脉有力者加柴胡一錢炒黑山梔竹茹各
一錢

胃虛氣弱脉必無力加炒白朮一錢人參五分減黃
連五分去枳實不用 若陰虛火盛冲逆而噦脈必
微弱虛數無力加人參二錢炒白芍一錢五分竹茹
一錢減黃連五分去枳實不用 服香連丸
香連枳朮丸 或濕熱之氣鬱于胃腑陽明熱毒久服

不清以致否滿嘈雜吞酸吐酸惡心嘔吐

白术

四兩

枳實

麸炒二兩

廣橘紅

半夏

麥芽粉

神曲

各兩

陳黃米

釐三合

木香

五錢

川連

薑炒五錢

荷葉湯疊丸食前空心百滾湯吞服二錢

香連丸 傷寒餘熱及痢後虛火鬱滯胃中不清而乾

噦者宜之

川黃連

五兩

吳茱萸

去枝三兩五錢

木香

另爲細末聽用一兩二錢

先將黃連茱萸二味用水同煮至汁乾去茱萸用連切片炒至紫黃色爲細末約有淨末四兩加木香末一

兩以少醋入濃米飲和丸如桐子大每服二三十丸
薑橘淡烏梅湯吞服虛用人參湯下

胃虛恶心惡食主方

白术三錢 人參 茯苓各一錢 陳皮 半夏各一錢
黃耆炒五分 蕺香 白蔻仁 砂仁炒熟五分 甘草三分
生薑煨焦一斤 水煎早晚空心服

脾胃受病氣必鬱滯滯則否滿雖欲補益元氣必假
芳香之藥醒發胃氣使之進食前方甘溫健脾芳香
開胃不惟從其性而且益其氣也脾不能消胃不能

納而惡心否滿者服香砂健脾丸不思飲食及見食
惡心者服胃愛丸心脾營氣不足精血不充無病而
病者服冲和資生丸

香砂健脾丸

見本門
嘔條

胃愛丸

見氣門
脾嘔條

冲和資生丸

見氣門
脾嘔條