

尤注金匱
四

金匱心典卷中目錄

奔豚氣病脉證治第八

胸痺心痛短氣病脉證治第九

腹滿寒疝宿食病脉證治第十

五臟風寒積聚病脉證治第十一

痰飲欬嗽病脉證治第十二

消渴小便不利淋病脉證治第十三

水氣病脉證并治第十四

○痰飲欬嗽病脉證治第十二

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲

問曰四飲何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間漑漑有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲欬逆倚息不得臥其形如腫謂之支飲

穀入而胃不能散其精則化而爲痰水入而脾不能輸其氣則凝而爲飲其平素飲食所化之精津凝結而不布則爲痰飲痰飲者痰積於中而飲附於外也

素盛今瘦知其精津盡為痰飲故不復外充形體而
反下走腸間也。飲水流溢者水多氣逆。徐氏所謂水
為氣吸不下者是也。其流於脇下者則為懸飲。其歸
於四肢者則為溢飲。懸者懸於一處。溢者溢於四旁。
其偏結而上附心肺者則為支飲。支飲者如水之有
派。木之有枝。附近於臟而不正中也。欬逆倚息不得
臥者上迫肺也。

水在心。心下堅築。短氣。惡水不欲飲。水在肺。吐涎沫。

欲飲水。水在脾。少氣身重。水在肝。脇下支滿。噎而

痛。水在腎。心下悸。

水卽飲也。堅築悸動有力。築築然也。短氣者。心屬火而畏水。水氣上逼。則火氣不伸也。吐涎沫者。氣水相激。而水從氣泛也。欲飲水者。水獨聚肺。而諸經失溉也。脾爲水困。故少氣。水淫肌肉。故身重。土本制水。而水盛。反能制土也。肝脉布脇肋。水在肝。故脇下支滿。支滿。猶偏滿也。嚏出於肺。而肝脉上注肺。故嚏則相引而痛也。心下悸者。腎水盛而上凌心火也。夫心下有留飲。其人背寒冷如掌大。留飲者。脇下痛引缺盆。欬嗽則輒已。胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脉沉者。有留飲。

留飲卽痰飲之留而不去者也。背寒冷如掌外體而留之處陽氣所不入也。魏氏曰背爲太陽在易爲艮止之象。一身皆動背獨常靜。靜處陰邪常客之。所以風寒自外入多中於背而陰寒自內生亦多踞於背也。脇下痛引缺盆者飲留於肝而氣連於肺也。欬嗽則輒已者飲被氣擊而欲移故輒已。一作欬嗽則轉甚亦通。蓋卽水流脇下欬唾引痛之謂。氣爲飲滯故短。飲結者津液不周故渴。四肢歷節痛爲風寒濕在關節若脉不浮而沉而又短氣而渴則知是留飲爲病而非外入之邪矣。

膈上病痰滿喘欬唾發則寒熱背痛腰疼目泣自出其
人振振身瞤劇必有伏飲

伏飲亦卽痰飲之伏而不覺者發則始見也身熱背
痛腰疼有似外感而兼見喘滿欬唾則是活人所謂
痰之爲病能令人憎寒發熱狀類傷寒者也目泣自
出振振身瞤動者飲發而上逼液道外攻經隧也

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者
則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛脉偏弦
者飲也

飲水過多水溢入肺者則爲喘滿水停心下者

水氣凌心而悸。微則氣被飲抑而短也。雙弦者。兩手皆弦。寒氣周體也。偏弦者。一手獨弦。飲氣偏注也。

肺飲不弦。但苦喘短氣。支飲亦喘而不能臥。加短氣。其脈平也。

肺飲。飲之在肺中者。五臟獨有肺飲。以其虛而能受也。肺主氣而司呼吸。苦喘短氣。肺病已著。脈雖不弦。可以知其有飲矣。支飲。上附於肺。卽同肺飲。故亦喘而短氣。其脈亦平而不必弦也。按後第十四條云。欬家其脈弦。爲有水。夫欬爲肺病而水。卽是飲。而其脈弦。此云肺飲不弦。支飲脈平。未詳何謂。

病痰飲者。當以溫藥和之。

心下有痰飲。胸脇支滿目

眩。苓桂朮甘湯主之。

痰飲陰邪也。爲有形。以形礙虛。則滿。以陰冒陽。則眩。苓桂朮甘。溫中去濕。治痰飲之良劑。是卽所謂溫藥也。蓋痰飲爲結邪。溫則易散。內屬脾胃。溫則能運耳。苓桂朮甘湯方

茯苓

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右四味。以水六升。煮取三升。分溫三服。小便則利。

夫短氣有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。

氣爲飲抑則短。欲引其氣必蠲其飲。飲水類也。治水必自小便去之。苓桂朮甘益土氣以行水。腎氣丸養陽氣以化陰。雖所主不同而利小便則一也。

苓桂朮甘湯方 見上

腎氣丸方 見婦人雜病

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之。

脉伏者有留飲也。其人欲自利利反快者所留之飲從利而減也。雖利心下續堅滿者未盡之飲復注心下也。然雖未盡而有欲去之勢故以甘遂半夏因其

勢而導之。甘草與甘遂相反而同用之者。蓋欲其一
戰而留飲盡去。因相激而相成也。芍藥白蜜不特安
中。抑緩藥毒耳。

採見效括

甘遂半夏湯方

甘遂

大者
三枚

半夏

十二枚以水一升
煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

如指大
一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁

煎取八合頓服之

脉浮而細滑傷飲

脉弦數有寒飲冬夏難治

脉沉

而弦者懸飲內痛病懸飲者十棗湯主之

傷飲飲過多也。氣資於飲而飲多反傷氣。故脉浮而細滑則飲之徵也。脉弦數而有寒飲則病與脉相左。魏氏所謂飲自寒而挾自熱是也。夫相左者必相持。冬則時寒助飲欲以熱攻則脉數必甚。夏則時熱助脉欲以寒治則寒飲爲礙故曰難治。脉沉而弦飲氣內聚也。飲內聚而氣擊之則痛。十棗湯蠲飲破癖其力頗猛。三因方以三味爲末棗肉和丸名十棗丸亦良。

十棗湯方

芫花熬

甘遂

大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取八合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快利後糜粥自養

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之

水氣流行歸於四肢當汗出而不汗出身體重痛謂

之溢飲夫四肢陽也水在陰者宜利在陽者宜汗故

以大青龍發汗去水小青龍則兼內飲而治之者耳

徐氏曰大青龍合桂麻而去芍藥加石膏則水氣不

甚而挾熱者宜之倘飲多而寒伏則必小青龍爲當

也

大青龍湯方

麻黃 六兩

桂枝

甘草 各二兩

生薑 三兩

杏仁 四十个

大棗 十二枚

石膏 如雞子大一枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉粉之

小青龍湯方

麻黃 去節 三兩

芍藥 三兩

五味子 半升
乾薑 三兩

甘草 炙

細辛

桂枝 各三兩
半夏 半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈水防已湯主之虛者卽愈實者三日復發復與不愈者宜水防已湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

支飲上爲喘滿而下爲痞堅則不特礙其肺抑且滯其胃矣面色黧黑者胃中成聚榮衛不行也脉浮緊者爲外寒沉緊者爲裏實裏實可下而飲氣之實非常法可下痰飲可吐而飲之在心下者非吐可去宜其得之數十日醫吐下之而不愈也水防已桂枝一

苦一辛。竝能行水氣而散結氣。而痞堅之處。必有伏陽吐下之餘。定無完氣。書不盡言。而意可會也。故又以石膏治熱。人參益虛。於法可謂密矣。其虛者外雖痞堅。而中無結聚。卽水去氣行而愈。其實者中實有物。氣暫行而復聚。故三日復發也。魏氏曰。後方去石膏。加芒硝者。以其旣散復聚。則有堅定之物。留作包囊。故以堅投堅。而不破者。卽以稟投堅。而卽破也。加茯苓者。亦引飲下行之用耳。

水防已湯方

水防已 三兩

石膏

如雞子
大二枚

桂枝

二兩

人參

四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

水防已去石膏加茯苓芒硝湯方

水防已

桂枝各二兩

茯苓

人參各四兩

芒硝三合

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分

溫再服微利則愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

水飲之邪上乘清陽之位則為冒眩冒者昏冒而神

不清如有物冒蔽之也眩者目眩轉而乍見玄黑也

澤瀉瀉水氣白朮補土氣以勝水也高鼓峯云心下