

外科正宗卷五

海甯許

繼華本訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

癰癤類第二十六

夫癰癤者。有風毒熱毒氣毒之異。又有癰癤筋癤痰癤之殊。風毒者。外受風寒。伏於經絡。其患先寒後熱。結核浮腫。熱毒者。天時亢熱。暑中三陽。或內食膏粱厚味。釀結成患。色紅微熱。結核堅腫。氣毒者。四時殺厲。

之氣感冒而成。其患耳項胸腋驟成腫塊。令人寒熱頭眩。項強作痛。瘰癧者。累累如貫珠。連接三五枚。此不作寒熱。其患得於誤食蟲蟻鼠殘不潔之物。及宿茶陳水。或內有汗液。其患先小後大。初不覺疼。久方知痛。筋癭者。憂愁思慮。暴怒傷肝。蓋肝主筋。故令筋縮結。蓄成核。生於項側筋間。形如棋子。堅硬大小不一。或陷或凸。久則虛羸。多生寒熱。勞怒則甚。痰癭者。飲食冷熱不調。饑飽喜怒不常。多致脾氣不能傳運。遂成痰結。初起如梅如李。生及徧身。久則微紅。後必

潰破易於收斂。凡觀此症。分別施治。風毒者。散其風。除其溼。如防風解毒湯之類是也。熱毒者。清其脾。瀉其熱。連翹消毒飲之類是也。氣毒者。調其血。和其氣。藿香正氣散之類是也。癰癤者。散其堅。和其血。散腫潰堅湯之類是也。筋癰者。清其肝。解其鬱。柴胡清肝湯之類是也。痰癰者。豁其痰。行其氣。芩連二陳湯之類是也。又有寡婦尼僧。鰥夫庶妾。志不得發。思不得遂。積想在心。過傷精力。此勞中所得者。往往有之最爲難治。宜先養心血。次開鬱結。益腎安神。疎肝快膈。

如歸脾湯。益氣養榮湯。俱加香附。青皮。山梔。貝母。木香之類是也。又男人不宜太陽。青筋。潮熱。咳嗽。自汗。盜汗。女人又忌眼內紅絲。經閉。骨蒸。五心煩熱。男婦有此。後必變爲癆瘵難治之症。體實者。初起可服散。腫潰堅攻利之藥。得效者十中三四。有不察虛實。盡劑追伐。損傷元氣。致成壞病者。十有八九。此非患者之命。自由誤於醫人之手。予常治初起成核。服前藥未效者。用針刺核內。深入三四分。用冰蠟散撚成條。插入核內。糊紙封上。待至二七後。核子自然落出。隨

用紅黑二膏擦貼。內服補劑。不久便愈。常見有用斑蝥牽牛巴霜大黃等藥追蝕。多致危亡。切宜戒之。

徐曰。此篇論甚詳備。

又曰。實症結痰。乃可用冰蠅散。此方本治此症之藥也。

楣案實症結痰。用冰蠅散。不若用余所製消核膏爲妥。仍須內服子龍丸。

卽控涎丹方見卷二消核膏方見後

瘰癧看法

初起核高腫痛。色紅軟活。微作寒熱。肩項不強者。順已

成根不堅硬。內無小核叢生。脾健氣血不衰者順。已潰
膿稠。肉色紅活。核腫漸消。肩項自便。漸斂者順。潰後易
消。易斂。氣體平和。胸膈寬利。飲食知味者順。未成形體
消瘦。寒熱往來。結核頑硬。痰嗽相兼者險。已成核堅。連
續如珠。大小不等。項強筋急。脈虛者險。已潰膿水清稀。
肌肉消鑠。自汗盜汗。寒熱不睡者逆。潰後陰虛。煩躁作
渴。大便泄。小便秘。男子骨蒸。女人經閉。俱逆。

徐曰。看法與別症同。

瘰癧治法

初起腫痛。憎寒壯熱。四肢拘急。項強頭眩者。表散之。腫
硬發熱。便利口乾。胸膈不利。惡心脈實者。宜利之。膏粱
厚味。醇酒積熱。溼痰凝結而成者。宜化痰降火清中。憂
思過度。鬱怒傷肝。筋縮結核者。宜養血開鬱疎肝。房慾
勞傷。陰虛晡熱。自汗咳嗽。形體消瘦者。滋腎健脾。失利
亡名。懷抱鬱結。積想在心。所如不得。乖隔陰陽。虛熬歲
月而得者。精血俱傷。先養正氣。次治標病。堅而不潰。腐
而潰之。潰而不斂。補而斂之。皆活法也。

瘰癧治驗

一男人項核腫痛。拘急惡寒。用荊防敗毒散二劑。表症悉退。餘核不消。用散腫潰堅湯加川芎香附貝母十餘服。其核漸消。外以琥珀膏貼之。月餘而安。

一男子仲冬渡江。暴冒霧氣。又值驚恐。次日寒熱交作。頭面耳項俱腫。先用藿香正氣散二服。寒熱卽止。面腫漸消。惟項間堅腫不退。紅掀作痛。此毒聚必欲作膿。仍用正氣散加芎歸。臍刺數服。候膿熟針之。腫痛頓退。又用十全大補湯。脾健肌生完口。

徐曰。此風痰之毒。只宜內消。亦不必用十全大補。

湯。

一婦孀居六載子幼未立。憂鬱成核已半年。兼經水不調。寒熱交作。形體消瘦。脈亦弦數。此勞傷氣血。肝火妄動而成。所謂損者益之。不可用追蝕之藥。損而復損。先用逍遙散加香附。牡丹皮。貝母。和其血脈。疎其肝氣。寒熱盡退。次用益氣養榮湯服至月餘。氣血漸

復。經事漸調。元氣漸醒。外用火針。

徐曰

核上點破四

孔。用黃線藥插入五六次。

以上九字徐勒

候至孔大。換用冰

蠟散搽核上封之。至十三日外。其核自落。外搽玉紅

膏生肌收斂。內服人參養榮湯加香附木香三十餘劑。其口自完。此婦慎起居忘七情。戒口味。盡調理。故可得愈。否則必不能矣。

一室女年十七。因父擇婿未遂。就至二旬。懷抱鬱久。項生數核。堅硬如石。此肝經凝結筋縮之病也。兼經水斷絕。寒熱如瘧。咳嗽脈數。惟不顴紅。此陰虛火動。已成勞瘵症也。非藥能愈。視其形狀喜無敗色。余曰。欲治此病。當先治其心。父問曰。何藥治心。余曰。非藥也。易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。此天

地男女生成化育之道也。斯病起於孤陰寡陽不生不化。所謂逆理之病。由於女大失配。是謂當至而不至。漸成失度之候。

此句徐圖

其病不生而自生。故藥不能

挽回。必得陰陽和而雨澤降。

此句徐圖

夫婦和而家道成。

斯時方可用藥。其父始悟。隨卽擇嫁。三月後復請余

視。前症稍定。先用逍遙散加香附、青皮、山梔、丹皮、貝

母十餘劑。開鬱疎肝。寒熱漸止。次以人參養榮湯加

丹皮、紅花。通其血脈。使心血易生。容顏稍澤。又用益

氣養榮湯倍參朮。

徐曰不必

培助脾胃。增進飲食。間用歸

脾湯加麥冬五味遠志沙參收斂神氣寬慰性情。又製參朮地黃膏服至半年精神頓復經事亦通。惟核不能全退。用火針點破一核。火針點破四字徐勒琥珀膏貼之。漸腐爲膿。又兩月而得收斂。尚有三核。亦漸針漸潰。漸斂。首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈。

徐曰。室女患此者。嫁後卽愈。十居五六。此人竟能知之奇哉。

一男子年近三十。項生數核。面白神疲。皮癰脈數。此元氣受傷之症。先當補養氣血。待根本壯實。再治其瘡。

隨用養榮健脾藥十餘劑。未效。彼以爲緩。徐曰此等

又爲方士所惑。冀圖內消。自服斑蝥巴麝之藥。徐曰自取

其死連瀉十數行。後致小便淋漓不已。更增虛熱。飲食

減少。又復請視。形色已敗。辭而不治。又請內科強投

扶助降火之藥。終不應而死。

一婦壯年。性急。夫蕩不爲家。左項生核。半載漸至雞卵

大。堅硬如石。皮外紅絲纏繞。左右脈俱弦數。弦屬肝

火妄動。數乃脾熱之甚。徐曰此本不治之症。以後半

得法尙難收先用梔子清肝湯。平伐肝木。五服而脈

始平。又用清肝解鬱湯數服。散其鬱結。次用益氣養榮湯。調其氣血。間服散腫潰堅湯。軟其堅腫。外以琥珀膏貼之。調理百日。元氣乃復。堅硬已消八九。只存小核。彼以爲愈。止不服藥。後一載。因夫賭訟未勝。暴急驚恐。前腫復作。兩手脈細而多數。此陰血虧損。陽火乘之。非前有餘症也。又兼胸膈不利。飲食無味。經水先期過多。形容憔悴不澤。此神傷於思慮。則肉脫。意傷於憂愁。則肢廢。魂傷於悲哀。則筋攣。魄傷於喜樂。則皮槁。志傷於暴怒。則腰脊不能俯仰。以上俱七

情內損症也。法當滋養氣血。調和脾胃。益腎清心。開鬱散滯。庶保無虞。彼不肯信。仍欲服散腫潰堅之藥。并灸腫處。以圖內消。余辭不治。彼請客醫。仍服前藥。灸腫處。并灸肘尖。真氣虛而益虛。邪氣實而益實。反加發熱自汗。咳嗽項強。四肢不收。灸瘡無膿。血水不絕。腫亦熾盛。致成臟腑已損之候。又傳爲氣急聲啞。痰血交出而歿。余嘗見病家及庸醫。不辨虛實。妄行用藥。多致不救。所當猛省。

楣案中。間引成語爲文。其實此症無喜樂。

瘰癧主治方

防風解毒湯

防風解毒湯荆桔
薄荷枳殼芎蒼朮

牛蒡連翹草石膏
知母燈心共可消

治風毒瘰癧寒暑不調勞傷湊襲多致手足少陽分
耳項結腫或外寒內熱痰凝氣滯者

防風

荆芥

桔梗

牛蒡子

連翹

甘草

石膏

薄荷

枳殼

川芎

蒼朮

知母

各一錢

水二茶鍾燈心二十根煎八分食後服

徐曰此風痰之方