

④ 珍挾微

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

四診抉微卷之七

烏程林之翰憲百父

別字纂述  
慎菴

切診

細

體狀詩

素問謂之小王啓玄言  
如莠蓬狀其柔細也

細來纍纍細如絲應指沉沉無絕期春夏少年俱  
不利秋冬老弱却相宜

相類詩

見微  
濡

春夏之令少壯之人俱忌細脉  
謂其不與時合不與形合也

四診抉微卷之七

斤文堂

主病詩

細脉縈縈血氣衰諸虛勞損七情乖若非濕氣侵  
腰腎卽是傷精汗洩來

滑伯仁曰細者蓋血冷氣虛不足以充故也爲  
內外俱冷痿弱洞泄爲憂勞過度爲傷濕爲積  
爲痛在  
內及下

張路玉曰胃虛少食冷涎泛逆便泄腹痛濕痺  
脚輿自汗失精皆有細脉但以兼浮兼沉在寸  
在尺分別  
而爲裁決

分部詩

寸細應知嘔吐頻八閉腹脹胃虛形尺逢定是丹

田冷洩痢遺精號脫陰

抉微

李士材曰嘗見虛損之人脉已細而身常熱不究其源而以涼劑投之使真陽散敗飲食不進上嘔下泄是速之斃耳經云少火生氣人非此火無以運行三焦熟腐五穀未徹乎此者烏可言

醫哉

巢辨云大都浮而細者屬之陽分則見自汗氣急等症沉而細者屬陰分則見下血血痢等症

病忌

虛勞之脈細數不可並見並見者必死細則氣衰  
數則血敗血氣交窮短期將至吐利失血得  
沉細者生憂勞過度之人脈亦多細爲自殘其  
氣血也

附論小脈

滑伯仁曰小脈非細如髮也浮沉取之悉皆損小在陽

爲氣不足在陰爲血不足前大後小則頭痛日

眩前小後大則胸滿短氣

張路王曰。卽仲景來微去大之變。辭虛中挾實之  
旨。小弱見於人迎。衛氣衰也。見於氣口。肺胃弱  
也。寸小陽不足。尺小陰不足。若小而按之不衰。  
久按有力。又爲實熱固結之象。總由正氣不充  
不能鼓搏熱勢於外。所以隱隱略見滑熱於內也。  
慎菴按。小脉卽細脉之別稱。亦猶大脉之與洪  
脉同一體也。况其主病皆同。故但附見於此。乃  
一脉而異。勿  
岐視之可也。

審疑似

診宗三昧云。小脉者三部皆小而指下顯然不似

微脉之微弱依稀細脉之微細如髮弱脉之奠  
弱不前短脉之首尾不及也

正誤

脉訣言往來極微是微反大於細矣與經旨相

濡陰 卽奠字

體狀詩

濡脉細軟見於浮分舉之乃見按之卽空  
叔和此之編浮水面 時珍比之水上浮漚

皆狀其隨手  
而沒之象也

濡形浮細按須輕水面浮棉力不禁病後產中猶

有藥平人若見是無根

相類詩

浮而柔細知是濡沉細而柔作弱持微則涇微如  
欲絕細來沉細近於微

浮細如綿曰濡  
沉細如綿曰弱

浮而極細如絕曰微  
沉而極細不斷曰細

主病詩

濡爲亡血陰虛病髓海丹田暗已虧汗兩夜來蒸  
人骨血山崩倒濕侵脾

分部詩



寸濡陽微自汗多關中其奈氣虛何尺傷精血虛  
寒溫補真陰可起疴

濡爲少氣爲泄瀉  
爲渴爲痰爲眩暈

### 分部主病

濡主陰虛髓竭精傷左寸濡者健忘驚悸濡在左  
關血不榮筋左尺得濡精血枯損右寸濡者  
虛自汗濡在右關脾虛濕侵左尺得濡火敗命  
乖。

### 抉微

方穀曰輕診不知重按又不可得稍久隱隱而來

少焉又不可得存而診之又復如是此濡脈也  
爲濕傷氣血之候凡形証未見死象不可便斷  
死。

或曰濡脈辨內傷外感氣促力劣恍惚耳鳴此虛  
冷之徵必見於右手氣口若人迎濡而氣口有  
力中氣脹悶腰背痠疼肢體倦怠當作濕治

劉河間曰濡多兼遲。主極冷然熱淺後或熱極將  
死者亦濡弱。

張路玉曰濡爲胃氣不克之象故內傷虛勞泄瀉

少食自汗喘乏精傷痿弱之人。脈雖濡弱乏力。猶堪峻補。峻溫不似陰虛脫血。純見細數弦強。欲求濡弱。絕不可得也。

宜忌

李士材曰。浮主血分。浮取之而可得氣。猶未敗沉主血分。沉按之而如無。此精血衰敗。在久病年老之人。尚未至於必絕。爲其脈與証合也。若平人及少壯暴病見之。名無無根。脈去死不遠矣。

診家正脈云。叔和言。故手相得按之無有僞訣。反  
言按之似有舉之無悖戾。一至此耶。且按之則  
似有舉之則還無。是弱脈而非濡脈矣。濡脈之  
浮軟與虛脈相類。但虛脈形大而濡脈形小也。  
濡脈之細小與弱脈相類。但弱在沉分而濡在  
浮分也。濡脈之無根與散脈相類。但散脈從浮  
大而漸至於沉。濡從浮小而漸至于不見也。從  
大而至沉者全凶。從小而之無者為吉凶相半  
也。又主四體骨蒸。蓋因腎氣衰絕。水不勝火耳。

弱陰

體狀詩

弱脉細小。見於沉。分舉之則無。按之乃得。脉經云弱脉極真而沉細不似微脉之按之欲絕。濡脉之按之若無。細脉之浮沉皆細也。

弱來無力。按之柔柔細而沉不見。浮陽陷八陰精血弱。白頭猶可少年愁。

相類詩

見濡脉

主病詩

弱脉陰虛陽氣衰。惡寒發熱筋骨痠。痿多驚多汗精

神減。益氣調營急早醫。

分部詩

寸弱陽虛病可知。關爲胃弱與脾衰。欲求陽陷陰虛病。須把神門兩部推。

滑伯仁曰。精氣不足。故脈痿弱而不振。爲痼冷。爲關執。爲虛汗。

方穀曰。爲痿痺。爲厥逆。爲血虛。爲氣少。及力乏。爲傷精。及損血。爲耳閉。爲眩運。

分部主病

左寸弱者。驚悸健忘。弱在在關。木枯。

急。左尺得弱。涸流可徵。右寸弱者。自  
汗短氣。弱在右關。水穀之疴。右尺得弱。  
陽陷可陰。

挾微

劉河間曰。弱脈虛冷兼微與遲。然傷風巾暑熱盛  
而自汗大出。則亦緩弱而遲。

李士材曰。浮以候陽。浮取之而如無陽氣。衰微之  
驗也。經云。脈弱與滑。是有胃氣。脈弱與澹。是爲  
久病。愚謂弱甚重。按陰。倘未絕。若兼澹象。則氣

血交敗生理滅絕矣

張路玉曰。傷寒白言弱爲陰脈。卽陽經見之亦弱。陽氣之衰。可見脈弱無陽。必無是熱之理。祇宜辨析真陽之虛。與胃氣之虛。及夏月傷冷水。水行皮中所至耳。在陰經見之。雖爲合脈。然陽氣衰微已極。非峻溫峻補。良難春回寒谷也。

宜忌

診示三昧。云弱脈惟血庫虛勞久嗽失血新產及老人久虛脈宜微弱。然必弱而和滑。可卜胃氣



之未艾若少壯暴病而見脈弱咸非所宜即血  
証虛証脈弱而兼之以瀉爲血氣交敗矣。

### 簡誤

慎菴接脈經云弱脈爲虛熱作病有熱不可太  
攻熱去則寒起然虛熱從無用攻之理攻之不  
但寒起恐元氣亦從此而脫當去此太  
字云有熱不可攻方爲中肯之語。

陰中  
驟之場

### 體狀詩

緊脈有力。左右彈人如絞轉索如切緊繩。  
李頌謂曰緊爲熱爲寒。東之脈故急數如此。

要有初氣素

問得之急